

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ - Έτος Ιδρύσεως 1960

• **WEBINAR**

Ανασκόπηση
ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
EULAR 2021



Προβολή μέσω της ιστοσελίδας
www.livemed.gr

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

• **20:00 - 21:00**

» **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**

meto
/ject®
methotrexate SC 50 mg/ml

forever
and **for all**



yesterday
today
tomorrow



medac
eutoimmune

» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Συντονιστής: Δημήτριος Καρόκης

Σπονδυλαρθρίτιδες
Ρευματοειδής αρθρίτιδα
ΣΕΛ / Αντιφωσφολιπιδικό / Σ. Sjogren
Σκληρόδερμα / Αγγειίτιδες / Μυοσίτιδες

Δημήτριος Δαούσης
Χαράλαμπος Παπαγόρας
Γεώργιος Μπερτσιάς
Θεοφάνης Καράγεωργας

» ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Συντονιστής

Δημήτριος Καρόκης

Ρευματολόγος, MSc, Musculoskeletal Ultrasound Specialist, Στρατιωτικός Ιατρός ε.α., Πάτρα,
Αντιπρόεδρος ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ

Ομιλητές

Δημήτριος Δαούσης

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεοφάνης Καράγεωργας

Ρευματολόγος, Συνεργάτης Μονάδας Ρευματολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας, Δ' Πανεπιστημιακή
Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικών», Αθήνα

Γεώργιος Μπερτσιάς

Ρευματολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ρευματολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας, Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου

Χαράλαμπος Παπαγόρας

Επίκουρος Καθηγητής Ρευματολογίας, Α' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Δ.Π.Θ., Π.Γ.Ν
Αλεξανδρούπολης

» ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Για να παρακολουθήσετε το webinar σε ζωντανή μετάδοση πατήστε **ΕΔΩ**

» ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ



E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.

Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμόρνη, Τηλ.: 210 - 98 80 032 Φαξ: 210-98 81 303

E-mail: ets@otenet.gr, ets@events.gr, Website: www.events.gr



ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΥ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ¹⁻³

1. Stelara® 90 mg και 45 mg Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

2. Stelara® 130 mg Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

3. Kavanaugh A et al. Ann Rheum Dis 2014;73:1000-1006.

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

Λεωφόρος Ειρήνης 56, 151 21, Πεύκη, Αθήνα, Τηλ.: 210 8090000
www.janssen.com.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

janssen  **Immunology**

PHARMACEUTICAL COMPANIES OF **Johnson & Johnson**

abbvie



AstraZeneca

Janssen Oncology
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF Johnson & Johnson



GENESIS
pharma

Hospital
line



Pfizer
Inflammation & Immunology

Roche



ΩΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: STELARA 45 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα.
STELARA 90 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. **ΠΟΙΟΤΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΟΣΗΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ:** STELARA 45 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα: Κάθε προγεμισμένη σύριγγα περιέχει 45 mg ustekinumab σε 0,5 mL STELARA 90 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα: Κάθε προγεμισμένη σύριγγα περιέχει 90 mg ustekinumab σε 1 mL το ustekinumab είναι ένα αντισώμα ενδονημικό μονοκλωνικό IgG1c αντίσωμα έναντι της υπερτελερίνης (IL-23). **ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΑ:** Η δράση του ustekinumab βασίζεται στην παρεμπόδιση της σύνδεσης των υποδοχέων του IL-23 με τον υποδοχέα τους στον συνδυασμένο DNA. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** STELARA 45 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. Ενέσιμο διάλυμα. STELARA 90 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. Ενέσιμο διάλυμα. Το διάλυμα είναι διαυγές ως ελαφρώς θολό, άχρωμο ως ανοικτό χρώμα. **ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** **Θεραπευτικές ενδείξεις:** Ψωρίαση κατά πλάκος. Το STELARA ενδείκνεται για τη θεραπεία της μέτριας ως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκος σε ενήλικες που δεν ανταποκρίθηκαν ή παρουσίασαν ανεπιθύμητες ή έχουν δυσανεμία σε άλλες συστηματικές θεραπείες (π.χ. μεθοτρεξάτη, κυκλοσπορίνη, αιθακυλμάδα, αζιθρομυκίνη, σουλφοναμίδια, πυριβαρόλη, φουμαράτο και υπεριώδη ακτινοβολία A). Παθητική ψωρίαση κατά πλάκος. Το STELARA ενδείκνεται για τη θεραπεία της μέτριας ως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκος σε παιδιά και έφηβους που αντέδρασε από την ηλικία των 6 ετών και άνω, οι οποίοι δεν ελέγχονται επαρκώς με ή έχουν δυσανεμία σε άλλες συστηματικές θεραπείες ή θεωρηθεί. **Ψωρίαση αρθρώσεων (PsA):** Το STELARA, μόνο του ή σε συνδυασμό με MTX, ενδείκνεται για τη θεραπεία της ενεργού ψωριασικής αρθρίτιδας σε ενήλικες ασθενείς στην οποία η ανταπόκριση σε προηγούμενη θεραπεία με ή χωρίς MTX ήταν ανεπαρκής. **Άρθρωση σπονδυλικών σωμάτων (AS):** Το STELARA ενδείκνεται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με μέτριας έως σοβαρά ενεργή νόσο του Crohn, οι οποίοι εμφάνισαν ανεπαρκή ανταπόκριση, απώλεια ανταπόκρισης ή δύσχεση στη συμβατική θεραπεία ή σε αναγωγική θεραπεία ή TNFα ή παρουσίασαν ανεπιθύμητες σε αυτές τις θεραπείες. **Εκδόχως κολλοειδή:** Το STELARA ενδείκνεται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με μέτριες έως σοβαρά ενεργή εκδόχως κολλοειδή, οι οποίοι εμφάνισαν ανεπαρκή ανταπόκριση, απώλεια ανταπόκρισης ή δύσχεση στη συμβατική θεραπεία ή σε θεραπεία με βιομονοκλωνικά αντισώματα ή κάποιο από τα ακόλουθα κλινικά σημαντικά, ενεργά λοιμώδη (ILI, ενεργή ψωριασία). Επέλεξε παράγωγα Ειδικές προετοιμασίες και προφυλάξεις κατά τη χρήση. **Ειδικές προετοιμασίες και προφυλάξεις κατά τη χρήση:**

P-230381/STE/0521/003