

Οργάνωση:
Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων-
Εργαζομένων Ακτινοθεραπείας

Σε συνεργασία:
Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα
Γ.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ

Υπό την αιγίδα:



ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ

Αντιμετώπιση του Καρκίνου

07 - 08 Οκτωβρίου 2022

ΛΑΕΔ

(Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων)

ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Θα χορηγηθούν 16
Μόρια Συνεχιζόμενης
Ιατρικής Εκπαίδευσης
(CME-CPD)

© 2022 E.C.S. EVENTS & TRAVEL SOLUTIONS

**ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΕ
ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΜΕ mHSPC**



**ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΗΤΑΝ ΕΝ ΖΩΗ
ΣΤΑ 4 ΕΤΗ⁶**

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΤΗΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ Η ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ**

**ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ
ΜΕ ΧΤΑΝΔΙ™**



ΧΤΑΝΔΙ 202 2022

Όταν οι ασθενείς σας παρουσιάζουν προχωρημένο καρκίνο του προστάτη είναι καιρός για δράση.

Το **ΧΤΑΝΔΙ™** είναι μια από του στόματος χορηγούμενη θεραπεία με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στην πρώτη γραμμή του mHSPC, του υψηλού κινδύνου nmCRPC και του ασυμπτωματικού / ήπια συμπτωματικού mCRPC.¹⁻⁶

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Η σύνταξη ΠΧΠ του προϊόντος δημοσιεύεται στη σελίδα **26** του παρόντος εντύπου.

Για περαιτέρω πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΠΧΠ που διατίθεται από την Astellas Pharmaceuticals AEBE, κατόπιν αιτήσεως.

Ελλάδα: Νοσοκομειακή τιμή (Κουτί x 112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία - 40 mg /TAB): €2.261,67

Κύπρος: Λιανική τιμή με ΦΠΑ (Κουτί X 112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία - 40mg/TAB): €3.009,25

Οι πλέον συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι εξασθένηση/κόπωση, εξάρσεις, υπέρταση, κατάγματα, και πτώση¹.

mHSPC: μεταστατικός ορμονοεξαρτώμενος καρκίνος του προστάτη, nmCRPC: μη μεταστατικός, ανθεκτικός στον ενοχοισμό, καρκίνος του προστάτη,

mCRPC: μεταστατικός, ανθεκτικός στον ενοχοισμό καρκίνος του προστάτη

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος ΧΤΑΝΔΙ™, 2. Sternberg CN et al. N Engl J Med 2020; 382:2197–206, 3. Beer TM et al. Eur Urol 2017; 71: 151–54, 4. Armstrong AJ et al. J Clin Oncol 2019; 37(32): 2974–86, 5. Hussain M et al. N Engl J Med 2018; 378(26): 2465–74, 6. Armstrong AJ et al. J. Clin Oncol 2022; 40: 1616–22, 7. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Αμπερατερόνης, 8. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Απάλουταμίδης, 9. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Ντορολουταμίδης



Astellas Pharmaceuticals A. E. B. E.
Αγρολιάου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα.
Τηλ. 210 8189 900, Fax: 216 8008 998
www.astellas.com/gr

Τοπικός Αντιπρόσωπος/
Διανομέας προϊόντων Astellas στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Xtandi™
enzalutamide

« ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ »

Σε αυτό το Ογκολογικό συνέδριο-Διημερίδα με θέμα «**Ισχύς εν τη ενώσει - Συνδυασμένη Αντιμετώπιση του Καρκίνου**» θα συζητηθούν συστηματικά σύγχρονες μελέτες σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στη συνδυασμένη αντιμετώπιση του καρκίνου. Επιπρόσθετα, θα συζητηθούν λεπτομερώς οι χαρακτηρισμένες εφαρμογές της πολυπαραγοντικής συνδυασμένης θεραπείας για την υπερνίκηση της αντοχής των καρκινικών κυττάρων στη θεραπεία της υποξίας και της μετάστασης, οι οποίες μπορούν να δώσουν νέους τρόπους για την αποτελεσματική εξάλειψη των καρκινικών όγκων.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η κατανόηση που έχουμε για τον καρκίνο έχει αλλάξει, από την απλουστευμένη άποψη της ομοιόμορφης νόσου σε αυτήν της ετερογενούς, σύνθετης ομάδας νόσων ποικίλης προέλευσης, διαφορετικών γενετικών χαρακτηριστικών και ξεχωριστής κλινικής εικόνας.

Συνακόλουθο αποτέλεσμα αυτής της νέας προσέγγισης αποτελεί η **εξατομικευμένη** θεραπευτική προσέγγιση, η οποία είναι πλέον γεγονός. Κατανοώντας τις διαδικασίες που καθοδηγούν τα διάφορα είδη καρκίνου και στοχεύοντας στα αίτια, μπορούμε να επηρεάσουμε πολύ θετικότερα την πορεία της υγείας περισσότερων ασθενών. Η **εξατομικευμένη** θεραπεία όμως προϋποθέτει από πλευράς του ογκολόγου άριστη γνώση των διαθέσιμων θεραπειών, του αναμενομένου οφέλους και των παρενεργειών τους και από πλευράς του ασθενούς εμπιστοσύνη στον γιατρό του, καλή ψυχολογία και συνεργασία μαζί του.

Η **υποστηρικτική φροντίδα** πλαισιώνει αναπόδραστα την ιατροφαρμακευτική θεραπεία των ογκολογικών ασθενών. Αποτελεί αναγκαιότητα που απορρέει από τον σεβασμό της μοναδικότητας και της αξίας του ασθενή. Παράλληλα, ολοένα και περισσότερο αναγνωρίζεται η ανάγκη να αντιμετωπίζεται ο ογκολογικός ασθενής ολιστικά, υποστηρίζοντας τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του, τόσο ψυχολογικά όσο και διαιτολογικά, καθώς φαίνεται ότι τα αποτελέσματα των θεραπειών ενισχύονται με αυτήν την προσέγγιση.

Επομένως η **εξατομικευμένη** φροντίδα του ασθενή σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα και η παράλληλη **στήριξη του οργανισμού και του ψυχισμού του**, με στόχο την αποκατάσταση και τη λειτουργικότητά του αποτελεί την κύρια επιδίωξη των ειδικοτήτων που εμπλέκονται με τον ογκολογικό ασθενή.

Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα που θα αναλυθούν από έγκριτους επιστήμονες της Ογκολογίας του εσωτερικού και του εξωτερικού, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να τα παρουσιάσουν με απλό και κατανοητό τρόπο, ώστε να μπορέσουν αφενός οι Επαγγελματίες υγείας-σύνεδροι να εφαρμόσουν τις νέες αυτές γνώσεις στην καθημερινή πρακτική τους και αφετέρου το υπόλοιπο μη ειδικό κοινό να ενημερωθεί για τις νέες Αντικαρκινικές Θεραπείες που διαθέτει η χώρα μας.

Οι πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής

Βακάλης Ξενοφών

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος

Ξυνόγαλος Σπυρίδων

Παθολόγος Ογκολόγος


Verzenios®
abemaciclib

Νέα Ένδειξη

ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ HR+, HER2-
ΠΡΩΙΜΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (ΕΒC)
ΜΕ ΘΕΤΙΚΟΥΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ, ΠΟΥ
ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ
ελπίδα του κόσμου
ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ

**ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ
ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ**

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Εταιρεία

Η Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος είναι στη διάθεσή σας.
Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή στον υπερσύνδεσμο
<https://www.lilly.gr/landing-pages/verzenios-2022-kl/> ή σκανάρετε τον κωδικό QR



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15° χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά,
ΤΗΛ.: 210 6294600, **FAX.:** 2106294610
info@lilly.gr, www.lilly.gr

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ
στα κοινωνικά δίκτυα





« ΕΠΙΤΡΟΠΗ

« ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδροι Οργανωτικής Επιτροπής:

ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΑΚΑΛΗΣ (Πρόεδρος ΕΕΕΕΑ)

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΞΥΝΟΓΑΛΟΣ

Μέλη:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

(Αντιπρόεδρος ΕΕΕΕΑ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ

(Γενικός Γραμματέας ΕΕΕΕΑ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ

(Ειδικός Γραμματέας ΕΕΕΕΑ)

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΝΔΟΥΡΑΡΗ

(Ταμίας ΕΕΕΕΑ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΑΚΗΣ

(Μέλος ΕΕΕΕΑ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΙΑΡΗΣ

(Μέλος ΕΕΕΕΑ)

« ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδροι Επιστημονικής Επιτροπής:

ΚΟΣΜΑΣ ΒΕΡΙΓΟΣ

ΖΩΗ ΚΑΛΑΪΤΖΗ

ΜΥΡΣΙΝΗ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑ

ΜΑΡΙΑ ΤΟΛΙΑ

Μέλη:

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΙΓΙΖΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΕΤΗ ΓΚΑΝΤΑΪΦΗ

« ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΦΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΡΑΓΩΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΗΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΥΔΙΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΛΩΝΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΝΙΟΥ

ΑΝΝΑ ΝΤΟΚΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΛΗΚΑΡΩΝΑ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΤΑΡΑΝΤΟ

ΜΑΡΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ

ΜΑΡΘΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Vectibix®

panitumumab



Τρόπος Διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για Νοσοκομειακή Χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

Λιανική τιμή: VECTIBIX C/S.SOL.IN 100MG/5ML VIAL BT x 1 VIAL x 5 ML: 372.35 €
VECTIBIX C/S.SOL.IN 400MG/20ML VIAL BT x 1 VIAL x 20 ML: 1423.46 €

GR-VBX-0521-00001

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα
αναφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενέργειών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
(ΕΟΦ) Τηλ: 2103204030, Fax 2106548585, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας διαδίκτυο
και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ: www.eof.gr για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή
εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 2103447000.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε
την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

AMGEN®

AMGEN HELLAS ΕΠΕ

Αγ. Κωνσταντίνου 59-61

Green Plaza, κτίριο Γ

15 124 Μαρούσι

Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050
Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr



Οργάνωση:
Ελληνική Εταιρεία Επιστημονικών-
Εργαστηρίων Ακτινοθεραπείας

Σε συνεργασία:
Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα
Γ.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΣΑ

Υπό την αιγίδα:



ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

07 - 08 Οκτωβρίου 2022

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ Αντιμετώπιση του Καρκίνου

ΛΑΕΔ
(Λέσχη Αθωματικών Ενόπλων Δυνάμεων)
ΑΘΗΝΑ

« ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

09:00-09:10

Έναρξη Συνεδρίου

09:10-10:50

Στρογγυλό Τραπέζι: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Προεδρείο: **Κ. Μυστακίδου, Κ. Βερίγος, Γ. Παπαδόπουλος**

09:10-09:30

Τρέχουσα αντιμεττική αντιμετώπιση
ασθενών υπό εμετογόνο χημειοθεραπεία

Σ. Χρύσογλου

09:30-09:50

Η σημασία της πρόληψης θρομβοεμβολικών επεισοδίων
σε ασθενείς με νεοπλασμάτα

Δ. Συμεωνίδης

09:50-10:10

Η εκτίμηση της ποιότητας ζωής στους
νεοπλασματικούς ασθενείς

Α. Δημητριάδου

10:10-10:30

Διατροφική υποστήριξη σε ασθενείς
υπό αντινεοπλασματική θεραπεία

Αλ. Τσίγκας

10:30-10:50

Συζήτηση - Σχολιασμός: Γ. Γιαννακούρας, Α. Γιαννοπούλου

10:50-11:10

Διάλειμμα Καφέ

11:10-12:30

Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

Προεδρείο: **Β. Μπαρμπούνης, Ο. Τζάϊδα, Σ. Λανίτης**

11:10-11:30

Προγνωστικά κριτήρια της παθολογοανατομικής
ανταπόκρισης μετά εισαγωγική θεραπεία
σε καρκινώματα μαστού

Ε. Τριχιά

11:30-11:50

Ακτινοθεραπεία μετά από neoadjuvant
χημειοθεραπεία και Χειρουργείο

Ε. Μόσα

11:50-12:10

Επιλογή των ασθενών που απαιτούν επιμηκυσμένη
ορμονική θεραπεία στον καρκίνο του μαστού

Δ. Συμεωνίδης

12:10-12:30

Συζήτηση - Σχολιασμός: Μ. Παντελιάδου, Μ. Χατζηευσταθίου



OPDIVO + **YERVOY**
(nivolumab) (ipilimumab)

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που διατίθεται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως

 **Bristol Myers Squibb™**

Bristol-Myers Squibb A.E.
Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική
ΤΘ 63883 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική
Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400, Φαξ 210 6074333
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

12:30-13:20

Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ II

Προεδρείο: **Δ. Πεκτασίδης, Μ. Λύκκα**

12:30-12:50

Τρέχουσα θεραπευτική προσέγγιση του τριπλά αρνητικού καρκινώματος του μαστού

Ε. Ντουβέλης

12:50-13:10

Νεότερα δεδομένα στο μεταστατικό καρκίνο μαστού HER2(+).
Ο ρόλος των νέας γενιάς Συζευγμάτων Αντισώματος-Φαρμάκου (ADCs)

Ε. Λιανός

Sponsored by **AstraZeneca**

13:10-13:20

Συζήτηση - Σχολιασμός

13:20-15:30

**Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα:
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ**

Προεδρείο: **Α. Ψυρρή, Π. Σαρώφ, Χ. Πανόπουλος**

13:20-13:40

Η χρησιμότητα του PET scan στη διάγνωση και σταδιοποίηση των όγκων κεφαλής και τραχήλου

Λ. Ιορδανίδου

13:40-14:00

Λεμφαδενικός καθαρισμός στους όγκους κεφαλής και τραχήλου

Σ. Λάσκαρης

14:00-14:20

Ακτινοθεραπεία των HPV θετικών καρκίνων του στοματοφάρυγγα

Ι. Γεωργακόπουλος

14:20-14:40

Η φαρμακευτική θεραπεία της υποτροπής των όγκων κεφαλής και τραχήλου

Μ. Θεοχάρη

14:40-15:00

Συζήτηση - Σχολιασμός: Δ. Γαλάνη

15:00 - 16:00

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ - ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

The first and only approved **TROP-2**-directed ADC²

 **TRODELVY**® ▼
sacituzumab govitecan
200 mg κόνις για πυκνό αλάτωμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

For 2L metastatic triple-negative breast cancer

Survival Elevated

**TRODELVY significantly improved survival in
2L and later mTNBC in the Phase 3 ASCENT trial^{*1}**

Median PFS nearly
3x LONGER
than chemotherapy

4.8 months with TRODELVY (95% CI, 4.1–5.8)
vs 1.7 months with single-agent chemotherapy
(95% CI, 1.5–2.5); HR: 0.43 (95% CI, 0.35–0.54)
P<.0001¹¹

Median OS nearly
1 YEAR

11.8 months with TRODELVY (95% CI, 10.5–13.8)
vs 6.9 months with single-agent chemotherapy
(95% CI, 5.9–7.7); HR: 0.51 (95% CI, 0.41–0.62)
P<.0001¹¹

* ASCENT was an international, Phase 3, multicentre, open-label, randomised trial of patients with unresectable locally advanced or metastatic TNBC (N=529). Patients were randomised 1:1 to receive TRODELVY 10 mg/kg IV on Days 1 and 8 every 21 days, or single-agent chemotherapy of the physician's choice (eribulin, vinorelbine, gemcitabine, or capecitabine). The primary endpoint was PFS in patients without brain metastases at baseline (88% of the overall study population), as measured by BICR based on RECIST v1.1 criteria.¹

¹ The improvements in PFS and OS in the primary analysis population were consistent with the ITT population (median PFS: 5.6 months vs 1.7 months; HR: 0.41; P<.0001; median OS: 12.1 months vs 6.7 months; P<.0001).¹

2L, second line; ADC, antibody-drug conjugate; BICR, blinded independent central review; CI, confidence interval; HR, hazard ratio; ITT, intent-to-treat; IV, intravenous; mTNBC, metastatic triple-negative breast cancer; OS, overall survival; PFS, progression-free survival; RECIST, Response Evaluation Criteria in Solid Tumors; TNBC, triple-negative breast cancer; TROP-2, trophoblast cell surface antigen 2.

Βιβλιογραφία:

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Νοέμβριος 2021.

2. Gilead Sciences Press release, November 23, 2021. Trodelvy® (sacituzumab govitecan) Granted European Commission Marketing Authorization for Treatment of Metastatic Triple-Negative Breast Cancer in Second Line.

Για την πλήρη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος αποταθείτε στον ΚΑΚ.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη Ιατρική Συνταγή. Μόνο για Νοσοκομειακή Χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία.

Ενδεικτική τιμή 2022: 1.100€ ανά φιαλίδιο.

Παρακαλείστε να αναφέρετε κάθε εικαζόμενη / πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ, σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



 **GILEAD**
Creating Possible

Υπεύθυνη ως εκπρόσωπος του ΚΑΚ για τη συλλογή ΑΕ:

Gilead Sciences Ελλάς Μ. ΕΠΕ, Εθνάρχου Μακαρίου & Μωραΐτινη 4, 175 64, Παλαιό Φάληρο, Τηλ.: 210 89 30 100

Οι συνταγογραφικές πληροφορίες του προϊόντος βρίσκονται σε άλλη σελίδα του παρόντος.



16:00-18:00

Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: ΟΓΚΟΙ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Προεδρείο: Π. Σιδηρόπουλος, Ν. Κεντεποζίδης, Δ. Μισαηλίδου

16:00-16:20

Από τις νεότερες απεικονιστικές μεθόδους Πυρηνικής
Ιατρικής στα Theranostics του αύριο

Ι. Κούτσικος

16:20-16:40

Ακτινοθεραπεία μετεγχειρητική και διάσωσης
στον καρκίνο του προστάτη

Γ. Μαραβέλης

16:40-17:00

Η θέση της ριζικής προστατεκτομής στον
ολιγομεταστατικό καρκίνο του προστάτη

Π. Σιδηρόπουλος

17:00-17:20

Αντιμετώπιση της ολιγομεταστατικής νόσου
στον καρκίνο του προστάτη με Ακτινοθεραπεία

Κ. Μπόνιου

17:20-17:40

Υποκλασματοποιημένη ακτινοθεραπεία ουροδόχου κύστης

Σ. Κάχρης

17:40-18:00

Συζήτηση - Σχολιασμός: Ι. Κάντζου, Μ. Πρωτόπαπα

18:00-18:10

Διάλειμμα Καφέ

18:10-19:30

Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Προεδρείο: Α. Δημόπουλος, Λ. Γιαννίκος, Μ. Τοπαλίδου

18:10-18:30

Χειρουργική για τον καρκίνο του ενδομητρίου:
Φρουρός λεμφαδένας-Πότε είναι επαρκής
για τη σταδιοποίηση;

Σ. Ίβρος

18:30-18:50

Μετεγχειρητική αντιμετώπιση του καρκίνου
του ενδομητρίου

Μ. Λιόντος

18:50-19:10

Καρκίνος τραχήλου της μήτρας και ακτινοθεραπεία-
Πού βρισκόμαστε;


Π. Καραγιάννη

19:10-19:30

Συζήτηση - Σχολιασμός: Δ. Παπαθεοδώρου, Δ. Χαϊδόπουλος,
Χ. Παπαδημητρίου

ALYMSYS[®]

Bevacizumab



WinMedica
Serving Health for Life

Για περισσότερες πληροφορίες:
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής
Οδού 33-35, 15238 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827
info@winmedica.gr
www.winmedica.gr

Για ενδοφλέβια χρήση μετά από αραίωση

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενο ανεπιθύμητο ενέργειες.

Νοσοκομειακές Τιμές:

ALYMSYS C/S SOLIN 25MG/ML VIAL X 16 ML 728,89 €
ALYMSYS C/S SOLIN 25MG/ML VIAL X 4 ML 186,89 €

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Κάτοχος Άδειας
Κυκλοφορίας

mAbxience
From lab to life

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



19:30- 21:10

Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα:

**Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ**

Προεδρείο: **Μ. Μπαλαφούτα, Π. Παπαβασιλείου, Α. Βαρβέρης**

19:30-19:50

Η απεικόνιση της μήτρας

Μ. Γουγουλάκη

19:50-20:10

Προσλαμβανόμενη από τον θυρεοειδή αδένά δόση
ακτινοθεραπείας σε ασθενείς με καρκίνο μαστού που
υποβάλλονται σε ακτινοβολία υπερκλείδιας χώρας

Κ. Τσακίρη

20:10-20:30

Απεικονιστική επιβεβαίωση τοποθέτησης ασθενών
με εντοπισμένο καρκίνο προστάτη στην ακτινοχειρουργική
αντιμετώπιση, μετά από σχεδιασμό ΑΚΘ με MRI και CT

Α. Θεοδωρόπουλος

20:30-20:50

Ο τεχνολόγος ακτινοθεραπείας μπροστά στην πρόκληση
του Con19 για την προστασία του ασθενούς

Αικ. Ζηδιανάκη

20:50-21:10

Ανάλυση λαθών τοποθέτησης σε MVCT/CBCT IMRT
σε ακτινοθεραπεία προστάτη

Γ. Κοκολάκης

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

09:00-10:40

Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

Προεδρείο: **Ι. Βαρθαλίτης, Π. Μανίκης, Χ. Κοσμάς**

09:00-09:25

Ο ρόλος της εισαγωγικής θεραπείας στα δυνητικά
και οριακά εξαιρέσιμα καρκινώματα του παγκρέατος

Γ. Λαμπροδήμου

09:25-09:50

Ο ρόλος της ανοσοθεραπείας στα καρκινώματα
οισοφάγου και στομάχου

Ευθ. Κωστούρος

09:50-10:15

Προεγχειρητική θεραπεία στο καρκίνωμα του ορθού

Ν. Χαραλαμπίκης

10:15-10:40

Συζήτηση - Σχολιασμός: Α. Καραμπεάλης, Γ. Παπαζοΐνης

10:40-11:00

Δορυφορική Διάλεξη

Sponsored by



Προεδρείο: **Σ. Ξυνόγαλος**

Ο ρόλος της trifluridine/tipiracil στον μεταστατικό καρκίνο
παχέος εντέρου στην καθημερινή κλινική πρακτική

Α. Κουμαριανού


11:00-11:10

Συζήτηση Σχολιασμός

varian

A Siemens Healthineers Company

Intelligent Cancer Care™



HALCYON™

Το Halcyon™ φέρνει την επανάσταση στην ακτινοθεραπεία μέσω της καινοτομίας σε τρεις κρίσιμους πυλώνες: την υψηλή ποιότητα θεραπείας, τη λειτουργική αρτιότητα και τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό του συστήματος, καθιστώντας το έτσι απλό και εύκολο στη χρήση αλλά και φιλικό για τον ασθενή.

- * Βελτιστοποίηση της απεικονιστικά καθοδηγούμενης ογκομετρικής IMRT τεχνικής
- * **ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ MLC** διπλής στρώσης για γρήγορη διαμόρφωση της δέσμης
- * **Αυτοθωράκιση (self-shielding)** που μειώνει τις απαιτήσεις θωράκισης του δωματίου θεραπείας
- * **Μεγάλη ταχύτητα θεραπείας:**
Έως 4 φορές πιο γρήγορη περιστροφή του gantry, γρηγορότερο MLC

- * **Ευκολία στη χρήση:**
Απεικόνιση και θεραπεία σε 9 μόλις βήματα
- * Γρήγορη και υψηλής ποιότητας θεραπεία
- * Άμεση επαφή του ασθενούς με τον τεχνολόγο ακτινοθεραπείας
- * Μειωμένος χρόνος παραμονής του ασθενούς επί της τράπεζας θεραπείας
- * **Εγκατάσταση σε μικρούς χώρους**

PAPAPOSTOLOU

HEALTHCARE TECHNOLOGIES

est. 1914

ΑΘΗΝΑ Εθν. Αντιστάσεως 93 • 154 51 • Νέο Ψυχικό • +30 210 67 90 000

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πλ. Σιντριβανίου 4 • 546 21 • +30 2310 233 251

info@papapostolou.gr

www.papapostolou.gr

ΠΑΤΡΑ • ΙΩΑΝΝΙΝΑ • ΗΡΑΚΛΕΙΟ • ΧΑΝΙΑ • ΛΑΡΙΣΑ • ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ



11:10-11:30

Διάλειμμα Καφέ

11:30-13:00

Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα:
ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ

Προεδρείο: Δ. Μπαφαλούκος, Ζ. Σαριδάκη

11:30-11:55

Βιοψία λεμφαδεύων φρουρού ή
λεμφαδενικός καθαρισμός

Θ. Πετρακοπούλου

11:55-12:20

Επικουρική θεραπεία μελανώματος

Δ. Μπαφαλούκος

12:20-12:45

Νεότερες εξελίξεις στην ανοσοθεραπεία

Α. Κορογιάννης

12:45-13:00

Συζήτηση - Σχολιασμός: Ν. Τσουκαλάς

13:00-15:00

Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: ΟΓΚΟΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Προεδρείο: Γ. Ηλιάδης, Α. Σαμέλης, Α. Μηλιάδου

13:00-13:25

Η θέση της Ακτινοδιάγνωσης στη διάγνωση
και εκτίμηση της θεραπείας στα ενδοκρανιακά
γλοιώματα υψηλής κακοήθειας

Κ. Βαράκη

13:25-13:50

Η χειρουργική αντιμετώπιση των ενδοκρανιακών
γλοιωμάτων υψηλής κακοήθειας

Δ. Μπουράμας

13:50-14:15

Μοριακοί δείκτες στη διάγνωση και στη θεραπεία
των γλοιωμάτων

Γ. Χατσίδης

14:15-14:40

Επαναακτινοβολήση γλοιωμάτων

Γ. Κουκουράκης

14:40-15:00

Συζήτηση - Σχολιασμός: Εμ. Καραβαλάκης, Σ. Στυλιανίδου

15:00-16:00

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ - ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

16:00-17:40

Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ - αρχικό στάδιο

Προεδρείο: Α. Μουζάκα, Μ. Μαρινάκη, Μ. Μαυρουδής

16:00-16:20

Χειρουργική θεραπεία στον πρώιμο καρκίνο του μαστού

Ι. Φλέσσας

16:20-16:40

De-escalation επικουρικής θεραπείας με βάση
τις μοριακές υπογραφές

Ν. Τσουκαλάς

16:40-17:00

Υποκλασματοποιημένη Ακτινοθεραπεία ολόκληρου
του μαστού ή του θωρακικού τοιχώματος

Π. Σκάρλος

17:00-17:20

Εξαίρεση της Ακτινοθεραπείας σε χαμηλού κινδύνου
καρκίνους του μαστού

Κ. Μπόνιου

17:20-17:40

Συζήτηση - Σχολιασμός: Α. Νιώτης



Stivarga®

(regorafenib) tablets

Το Stivarga ενδείκνυται ως μονοθεραπεία για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με:

- μεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο (CRC) οι οποίοι έχουν προηγουμένως λάβει θεραπεία με, ή δεν θεωρούνται υποψήφιοι για, διαθέσιμες θεραπείες. Αυτές συμπεριλαμβάνουν χημειοθεραπεία με βάση φθοριοπυριμιδίνη, θεραπεία με αντι-VEGF και θεραπεία με αντι-EGFR.
- μη χειρουργήσιμους ή μεταστατικούς γαστρεντερικούς στρωματικούς όγκους (GIST) οι οποίοι υποτροπίασαν κατά τη διάρκεια προηγούμενης θεραπείας με ιματινίμη και σουντινίμη ή είναι μη ανεκτικοί στη θεραπεία αυτή.
- ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (HCC) οι οποίοι έχουν προηγουμένως λάβει θεραπεία με σοραφενίμη.

PP-STI-GR-0012-1

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας
κυκλοφορίας στην Ελλάδα: Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι,
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας
κυκλοφορίας στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης
Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία Bayer Hellas.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Οργάνωση:
Ελληνική Εταιρεία Επιστημονικών
Εργαζομένων Ακτινοθεραπείας

Σε συνεργασία:
Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα
ΓΑΝΠ, ΜΕΤΑΣΑ

Υπό την αιγίδα:

ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ

Αντιμετώπιση του Καρκίνου

07 - 08 Οκτωβρίου 2022

ΛΑΕΔ

(Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων)
ΑΘΗΝΑ

17:40-18:00

Διάλειμμα Καφέ

18:00-20:00

Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: **ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ**

Προεδρείο: **Ι. Γκιόζος, Β. Ραμφίδης, Γ. Κύργιας**

18:00-18:20

Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία του πνεύμονα

Ε. Μπερούκας

18:20-18:40

Νεότερα δεδομένα στην ακτινοθεραπεία του
μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα
περιορισμένης νόσου

Ζ. Καλαϊτζή

18:40-19:00

Η χειρουργική αντιμετώπιση του τοπικά προχωρημένου
μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα

Λ. Τουφεκτζιάν

19:00-19:20

Η θέση της ανοσοθεραπείας στον θεραπευτικό
αλγόριθμο του τοπικά προχωρημένου μη
μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα

Β. Ραμφίδης

19:20-19:40

Νέοι θεραπευτικοί ορίζοντες μέσω του διπλού
ανοσοαποκλεισμού στην 1^η γραμμή του
μεταστατικού ΜΜΚΠ

Χ. Εμμανουηλίδης

sponsored by Bristol Myers Squibb

19:40-20:00

Σχολιαστές: **Γ. Μαραβέλης, Α. Μαρκουζίου**

20:00-20:20

ΔΙΑΛΕΞΗ


Προεδρείο: **Α. Κουβέλη, Ε. Μαραγκουδάκης**

Νόστιμες συνταγές που φροντίζουν το έντερο
των ανθρώπων με νεοπλασία

Η. Μαμαλάκης, Μ. Τόλια

20:20-20:30

Συζήτηση - Σχολιασμός: **Β. Τσιούκης**





Akynzeo®

netupitant/palonosetron

Ένα καψάκιο περιέχει 300 mg netupitant και 0,5 mg palonosetron

02.2020/AKYNZE0/adv 01

 **Galenica α.ε.**

Αθήνα: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 145 64, τηλ.: 210 5281700,
Θεσσαλονίκη: Κουντουριώτου & Φασσιανού 2, τηλ.: 2310 542685
Επιστημονικό Τμήμα τηλ.: 210 5281731
Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης τηλ.: 210 5281805
www.galenica.gr

 **HELSINN**
Building quality cancer care together

Διανέμεται κατόπιν αδείας της Helsinn Healthcare S.A, Ελβετία

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Περαιτέρω πληροφορίες περιλαμβάνονται στη
συνοπτική Περιγραφή Χαρακτηριστικών Προϊόντος



« ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ »

Βαράκη Καλλιόπη	MD, PhD, Ακτινοδιαγνώστης - Νευροακτινολόγος, Διευθύντρια Τμήματος Ακτινολογίας, «Metropolitan Hospital»
Βαρβέρης Αντώνιος	Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Πα. Γ.Ν.Η.
Βαρθαλίτης Ιωάννης	Παθολόγος Ογκολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής, Α' Ογκολογική Κλινική, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Βερίγος Κοσμάς	Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Διευθυντής, Ακτινοθεραπευτικό - Ογκολογικό Τμήμα, 401 Γ.Σ.Ν.Α., Συνεργάτης Ακτινοθεραπευτικού Ογκολογικού Τμήματος ΙΑΣΩ, Συνεργάτης Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος CyberKnife Ιατρόπολης
Γαλάνη Δήμητρα	Επιμελήτρια Ακτινοθεραπείας Ογκολόγος, Θεραπευτήριο «Metropolitan»
Γεωργακόπουλος Ιωάννης	Επίκουρος Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α
Γιαννακούρας Γεώργιος	Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, 401 Γ.Σ.Ν.Α.
Γιαννίκος Λάμπρος	Γυναικολόγος, Διευθυντής Γυναικολογικής Κλινικής, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Γιαννοπούλου Αλεξάνδρα	Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, MD, MSc, Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, ΙΑΣΩ
Γκιόζος Ιωάννης	MD, PhD, FCCP, Πνευμονολόγος, Ογκολογική Μονάδα Γ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
Γουγουλάκη Μαρία	Τελειόφοιτος φοιτήτρια ΠαΔΑ, Τομέας Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Δημητριάδου Αρετή	Ειδικός Παθολόγος - Ογκολόγος, Επικουρική Ιατρός, Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Δημόπουλος Αθανάσιος	Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Αν. Καθηγητής (Venia Docendi) Πανεπιστημίου Βιέννης, ESTRO Faculty Member, Διευθυντής Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Metropolitan Hospital
Εμμανουηλίδης Χρήστος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Πρώην Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου UCLA
Ζηδιανάκη Αικατερίνη	Τεχνολόγος Ακτινοθεραπείας ΠΑΓΝΗ
Ηλιάδης Γεώργιος	MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Διευθυντής Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος	Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Υποψήφιος Διδάκτορας ΠΑΔΑ
Θεοχάρη Μαρία	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Α' Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Ίβρος Στυλιανός	Χειρουργός Γυναικολόγος - Μαιευτήρας, Διευθυντής Κλινικής Χειρουργικής Γυναικολογίας, Metropolitan Hospital
Ιορδανίδου Λυδία	MD, MSc, PhD, Διευθύντρια Πυρηνικής Ιατρικής - PET/CT, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Καλαϊτζή Ζωή	Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
Κάντζου Ιωάννα	Ακτινοθεραπεύτρια - Ογκολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιμελήτρια Α', Α' Ακτινοθεραπευτικό - Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»



Οργάνωση:
Ελληνική Εταιρεία Επιστημονικών-
Εργαστηρίων Ακτινοθεραπείας

Σε συνεργασία:
Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα
Γ.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΣΑ

Υπό την αιγίδα:

ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ

Αντιμετώπιση του Καρκίνου

07 - 08 Οκτωβρίου 2022

ΛΑΕΔ

(Λέσχη Αξιοματικών Ενόπλων Δυνάμεων)
ΑΘΗΝΑ

« ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ »

Καραβαλάκης Εμμανουήλ	Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Νοσοκομείο «Ιασώ»
Καραγιάννη Παρασκευή	Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Θεραπευτήριο Μετροπόλιταν
Καραμπεάξης Αθανάσιος	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος NIMTS
Κάχρης Στέφανος	Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Πα.Γ.Ν.Η
Κεντεποζίδης Νικόλαος	Παθολόγος-Ογκολόγος, MD, PhD, MSc, Διευθυντής Δ' Ογκολογικής Κλινικής, Metropolitan General
Κοκολάκης Γεώργιος	MSc Τεχνολόγος Ακτινοθεραπείας, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Κορογιάννος Αθανάσιος	Παθολόγος - Ογκολόγος, «Mediterraneo Hospital», Γλυφάδα, Αθήνα
Κοσμάς Χρήστος	M.D., Διευθυντής - Προϊστάμενος, Ογκολογικό-Παθολογικό Τμήμα & Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά, «Μεταξά»
Κουβέλη Αθηνά	Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ
Κουκουράκης Γεώργιος	Dr, MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Κουμαριανού Άννα	MD, PhD, Διευθύντρια ΕΣΥ, Παθολόγος-Ογκολόγος, Αιματολογική Ογκολογική Μονάδα, Δ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Π.Ν.Α. «Αττικόν»
Κούτσικος Ιωάννης	MD, PhD, Πυρηνικός Ιατρός, Διευθυντής, 401 Γ.Σ.Ν.Α., Ερρίκος Ντυνάν Hospital Centre
Κύργιας Γεώργιος	Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Θεσσαλίας
Κωστούρος Ευθύμιος	Παθολόγος Ογκολόγος, Γ' Παθολογική Κλινική-Ογκολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Λαμπροδήμου Γεωργία	Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο-Τριανταφύλλειο»
Λανίτης Σοφοκλής	MD, PhD, Διευθυντής, Β' Χειρουργική Κλινική Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός»
Λάσκαρης Σπυρίδων	MD, PhD, ΩΡΛ Χειρουργός κεφαλής και τραχήλου, Επιμελητής Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Λιανός Ευάγγελος	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμ. Α' Παθολογικό-Ογκολογικό Τμήμα Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Λιόντος Μιχαήλ	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επικουρικός Επιμελητής, Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Λύκκα Μαρία	Παθολόγος-Ογκολόγος, Αν. Διευθύντρια, Δ' Ογκολογική Κλινική Μονάδα Κλινικών Μελετών, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Μαμαλάκης Ηλίας	Συγγραφέας, Chef



Οργάνωση:
Ελληνική Εταιρεία Επιστημονικών
Εργαζομένων Ακτινοθεραπείας

Σε συνεργασία:
Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα
Γ.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΣΑ

Υπό την αιγίδα:

ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

07 - 08 Οκτωβρίου 2022

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ

Αντιμετώπιση του Καρκίνου

ΛΑΕΔ

(Λέσχη Αθωοματικών Ενόπλων Δυνάμεων)
ΑΘΗΝΑ

« ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ »

Μανίκης Παναγιώτης	Χειρουργός, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Μαραβέλης Γεώργιος	Αναπληρωτής Διευθυντής, Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Θεραπευτήριο Metropolitan
Μαραγκοδάκης Ευάγγελος	Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Διευθυντής στο Ακτινοθεραπευτικό τμήμα, ΙΑΣΩ Μαιευτήριο
Μαρινάκη Μαρία	Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια, Επιστημονικός Συνεργάτης Γ.Κ.Α. "Euromedica"
Μαρκουίζου Αθηνά	MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Διευθύντρια Ακτινοθεραπευτικού Ογκολογικού Τμήματος Γ.Α.Ν.Π. Μεταξά
Μαυρουδής Μιχαήλ	MD PhD Γυναικολόγος - Χειρουργός Μαστού, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Μαστού, Ευρωκλινική Αθηνών
Μηλιάδου Ανθή	Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Διευθύντρια, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Μισαηλίδου Δέσποινα	Ακτινοθεραπεύτρια - Ογκολόγος, Διπλωματούχος AMERICAN BOARD OF RADIOLOGY, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο
Μόσα Ευτυχία	MD, MSc, PhD, Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β, ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας»
Μουζάκα Λυδία	Ε. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Χειρουργός- Γυναικολόγος, Μαστολόγος-Ογκολόγος, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας, Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην ECIBC (European Commission Initiative on Breast Cancer) για τη σύνταξη των κατ
Μπαλαφούτα Μυρσίνη	Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Μπαμπούνης Βασίλειος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Ε' Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Ιασώ
Μπαφαλούκος Δημήτριος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Α' Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Metropolitan
Μπερούκας Ερνέστος	M.D., PhD, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Διευθυντής ΚΑΟ Χανίων Ίασις, Αν. Δ/ντής ΚΑΟ Metropolitan Hospital
Μπόνιου Κωνσταντίνα	Ακτινοθεραπεύτρια-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Μπουράμας Δήμος	Διευθυντής Νευροχειρουργικού Τμήματος Βιοκλινικής Αθηνών
Μυστακίδου Κυριακή	Καθηγήτρια Ανακουφιστικής Αγωγής, Ιατρική Σχολή, Υπεύθυνη Μονάδας Ανακουφιστικής Αγωγής "Τζένη Καρέζη" (Παράρτημα Αρεταίειου Νοσοκομείου), Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Νιώτης Αθανάσιος	Επιμελητής Α, Γ' Χειρουργικής Κλινικής Μαστού ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center
Ντουβέλης Ευάγγελος	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Γενική Κλινική Κέρκυρας
Ξυνόγαλος Σπυρίδων	Παθολόγος-Ογκολόγος, Παθολογική Κλινική, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»



« ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ »

Πανόπουλος Χρήστος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, «Ευρωκλινική» Αθηνών
Παντελιάδου Μαριάνθη	Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Παπαβασιλείου Περικλής	Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Παπαδημητρίου Χρήστος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνος, Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Α. «Αρεταίειο»
Παπαδόπουλος Γεώργιος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Παπαθεοδώρου Δημήτριος	Χειρουργός Γυναικολόγος-Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Γυναικολογικού Τμήματος Γ.Α.Ο.Ν.Α «Ο Άγιος Σάββας»
Παπαξοΐνης Γεώργιος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Β', Β' Παθολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Πεκτασίδης Δημήτριος	Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής, Γ' Ογκολογικό Τμήμα, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Πετρακοπούλου Θεοδώρα	Πλαστικός Χειρουργός, MD, MSc, Επιστημονική Υπεύθυνη Πλαστικής Χειρουργικής, Νοσοκομείο «Ρεα»
Πρωτόπαπα Μαρία	Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Υποψήφια διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.
Ραμφίδης Βασίλειος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
Σαμέλης Απόστολος	Νευροχειρουργός
Σαριδάκη Ζένη	MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Πρόεδρος Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), Διευθύντρια, Α' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan» Αθήνα, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Ογκολογικό Τμήμα, «Ασκληπιός ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ», Ηράκλειο Κρήτης
Σαρώνη Παύλος	Διευθυντής ΩΡΛ, ΩΡΛ Τμήμα, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Σιδηρόπουλος Παρασκευάς	Διευθυντής Β' Ουρολογικής Κλινικής, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center
Σκάρλος Παντελής	MD, PhD Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αν/τής Δ/ντής Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Νοσοκομείο Metropolitan
Στυλιανίδου Στυλιανή	MD, MSc, PhD(c) Ακτινοθεραπεύτρια-Ογκολόγος, MSc Θεολόγος, MSc Βιοηθικής, MSc Νομικής, Α.Π.Θ., MSc(c) Αλγολογίας και Παρηγορικής/Ανακουφιστικής Φροντίδας, Ιατρική Σχολή Θεσσαλίας, Επιμελήτρια Α', Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Συμεωνίδης Δαυίδ	MD, MSc, PhD Ογκολόγος-Παθολόγος, Επιμελητής Α', Β' Ογκολογική κλινική, Metropolitan General Hospital
Τζάιδα Ολυμπία	MD, PhD, Παθολογοανατόμος, Διευθύντρια, Προϊσταμένη του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»



Οργάνωση:
Ελληνική Εταιρεία Επιστημονικών-
Εργαστηρίων Ακτινοθεραπείας

Σε συνεργασία:
Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα
Γ.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΣΑ

Υπό την αιγίδα:

ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

07 - 08 Οκτωβρίου 2022

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ

Αντιμετώπιση του Καρκίνου

ΛΑΕΔ

(Λέσχη Αξιοματικών Ενόπλων Δυνάμεων)
ΑΘΗΝΑ

« ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ »

Τόλια Μαρία

Αναπλ. Καθηγήτρια Ακτινοθεραπείας, Ιατρική Σχολή-Πανεπιστήμιο Κρήτης/
Διευθύντρια Εργαστηρίου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης

Τοπαλίδου Μαρία

Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Διευθύντρια, Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα,
Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

Τουφεκτζιάν Λεβόν

Θωρακοχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Τριχιά Ελένη

MD, MSc, PhD, MBAC, MIAC, MIAP, MESP Παθολογοανατόμος &
Κυτταρολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Γ.Α.Ν.Π.
«Μεταξά»

Τσακίρη Κυριακή

Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Υποψήφια Διδάκτορας ΠΑΔΑ

Τσίγκας Αλέξανδρος

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, MSc Κλινικής Διατροφής, Υπηρεσία
“Orpus Nutrition” Διατροφική φροντίδα ογκολογικών ασθενών

Τσιούκης Βασίλειος

Ειδικευόμενος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Τσουκαλάς Νικόλαος

MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, MSc Βιοπληροφορική, Αναπλ.
Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική 401 ΓΣΝΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης
Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα

Φλέσσας Ιωάννης

Διευθυντής Γ' Χειρουργικής Κλινικής Μαστού ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital
Center

Χαϊδόπουλος Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής Γυναικολογικής Ογκολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Χαραλαμπίδης Νικόλαος

MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος Επιμελητής Β' Παθολογικό-Ογκολογικό
Τμήμα Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Χατζηευσταθίου Μιχαήλ

Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία»-
«Ιασώ»

Χατσίδης Γεώργιος

Παθολόγος Ογκολόγος, Α' Ογκολογική Κλινική, Ερρίκος Ντυνάν Hospital
Center

Χρύσोगλου Σοφία Ιφιγένεια Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Ψυρρή Αμάντα

Καθηγήτρια Παθολογίας - Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.,
Διευθύντρια, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

📌 Οργάνωση:

Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων-Εργαζομένων Ακτινοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Ε.Α.)

www.eeeea.gr

📌 Σε συνεργασία με

Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα ΓΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ

📌 Υπό την Αιγίδα:



📌 Ημερομηνία Διεξαγωγής:

07-08 Οκτωβρίου 2022

📌 Χώρος Διεξαγωγής:

Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ),
Ρηγίλλης 1 & Βασιλίσσης Σοφίας (Πλατεία Παύλου Μελά),
ΑΘΗΝΑ

📌 Εγγραφές:

Η εγγραφή στη Δημερίδα είναι δωρεάν. Η παρακολούθηση επιτρέπεται μόνο σε Επαγγελματίες Υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές.

📌 Οδηγίες Φυσικής Παρακολούθησης:


Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό badge (barcode), το οποίο θα πρέπει να σκανάρουν κατά την είσοδο και έξοδο τους στην αίθουσα.

📌 Οδηγίες Διαδικτυακής Παρακολούθησης:

Εάν είσατε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο www.livemed.gr (πατήστε στο πεδίο **Register/Εγγραφή**). Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε την κατηγορία Live και το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο **Go Live ή Go Virtual**.

Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την «**Αίθουσα Συνεδριάσεων**».

Εάν σας ενδιαφέρει να παραλάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο Σεμινάριο μέσω της Εικονικής Γραμματείας, πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο «**Εγγραφή**», ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος.



➤ Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης:

Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν 16 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits).

➤ Παραλαβή πιστοποιητικού:

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα σταλεί μετά το πέρας των εργασιών της Ημερίδας σε όσους συνέδρους έχουν κάνει εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης της Ημερίδας. Ο αριθμός Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD), θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης που θα καταγραφεί στην πλατφόρμα Livemed για όσους έχουν διαδικτυακή παρουσία και στο σύστημα καταμέτρησης στην είσοδο της αίθουσας για όσους έχουν φυσική παρουσία.

➤ Γραμματεία:



E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.

Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σμύρνη

Τηλ.: 210-98 80 032 Φαξ: 210-98 81 303

E-mail: ets@otenet.gr, ets@events.gr

Website: www.events.gr



Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η Ε.Τ.Σ. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr (πολιτική απορρήτου)



Οργάνωση:
Ελληνική Εταιρεία Επιστημών-
Εργαζομένων Ακτινοθεραπείας

Σε συνεργασία:
Παθολογική Ογκολογική Τμήμα
ΓΑΝΠ, ΜΕΤΑΣΑ

Υπό την αιγίδα:



ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

07 - 08 Οκτωβρίου 2022

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ

Αντιμετώπιση του Καρκίνου

ΛΑΕΔ

(Λέσχη Αξιοματικών Ενόπλων Δυνάμεων)
ΑΘΗΝΑ

« ΧΟΡΗΓΟΙ »



astellas



Bayer



Bristol Myers Squibb



FARAN
ONCOLOGY



GILEAD
Creating Possible



MSD
INVENTING FOR LIFE



Pierre Fabre
FARMAKA S.A.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Xtandi - 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Xtandi - 80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Xtandi - 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 40 mg enzalutamide.

Xtandi - 80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 80 mg enzalutamide

Για τον πλήρη κατάλογο των ενδεδειγμένων, βλ. παράγραφο 6.1.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο.

Xtandi - 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κίτρινα στρογγύλα - επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, χαραγμένα με το E 40.

Xtandi - 80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κίτρινα οβάλ - επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, χαραγμένα με το E 80.

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

Το Xtandi ενδείκνυται για:

- τη θεραπεία του μεταστατικού, ορμονοεξαρτημένου καρκίνου του προστάτη (mHSPC) σε συνδυασμό με θεραπεία στέφανης ανδρογόνων (ADT) σε ενήλικες άνδρες (βλ. παράγραφο 5.1).
- τη θεραπεία του μη μεταστατικού υψηλού κινδύνου ανδρικού στον ευνουχισμό καρκίνου του προστάτη (CRPC) σε ενήλικες άνδρες (βλ. παράγραφο 5.1).
- τη θεραπεία του μεταστατικού CRPC σε ενήλικες άνδρες οι οποίοι είναι συμπτωματικοί ή ήπια συμπτωματικοί έπιστα από ασυμπτια της θεραπείας στέφανης ανδρογόνων και στους οποίους η χημειοθεραπεία δεν ενδείκνυται ακόμα (βλ. παράγραφο 5.1).
- τη θεραπεία του μεταστατικού CRPC σε ενήλικες άνδρες των οποίων η νόσος έχει εξελιχθεί κατά τη διάρκεια ή μετά από θεραπεία με νιτοσεαζόλη.

4.2 Αντενδείξεις

Υπερευαίσθηση στη (στις) δραστική(ές) ουσία(ές) ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.

Γυναίκες που είναι ή μπορεί να μείνουν έγκυες (βλ. παραγράφους 4.6 και 6.6).

4.3 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Κίνδυνος επιπλοκών κρίσεων: Η χρήση της enzalutamide έχει συσχετιστεί με επιληπτικές κρίσεις (βλ. παράγραφο 4.8). Η απόφαση για τη συνέχιση της θεραπείας σε ασθενείς που εμφανίζουν επιληπτικές κρίσεις πρέπει να λαμβάνεται ανά περίπτωση.

Σύνδρομο οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας (Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome-PRES): Έχουν αναφερθεί σπάνιες αναφορές του συνδρόμου οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας (PRES) σε ασθενείς που λαμβάνουν Xtandi (βλέπε παράγραφο 4.8). Το PRES είναι μία σπάνια, αναστρέψιμη, νευρολογική διαταραχή, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί με γρήγορα εξελισσόμενη συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένων σπασμών, κεφαλαλγίας, σύγχυσης, τύφλωσης και άλλων οπτικών και νευρολογικών διαταραχών, ή χωρίς σχετιζόμενη υπέρταση. Η διάγνωση του PRES απαιτεί επιβεβαίωση με απεικονιστικές εξετάσεις του εγκεφάλου, κατά προτίμηση μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου (MRI). Συνιστάται διακοπή του Xtandi σε ασθενείς που αναπτύσσουν PRES.

Δευτερεύουσες Κύριες Κακοήθειες: Έχουν αναφερθεί περιστατικά δευτερογενών κύριων κακοήθειών σε ασθενείς που έλαβαν enzalutamide σε κλινικές μελέτες. Σε κλινικές μελέτες φάσης 3 τα πιο συχνά αναφερόμενα συμβάντα σε ασθενείς που έλαβαν enzalutamide και μεγαλύτερα από το εικονικό φάρμακο, ήταν καρκίνος ουροδόχου κύστης (0,3%), αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου (0,2%), καρκίνωμα από μεταβατικό επιθήλιο (0,2%) και μεταβατικό καρκίνος ουροδόχου κύστης (0,1%). Οι ασθενείς θα πρέπει να συμβουλευτούν άμεσα το γιατρό τους εάν παρατηρήσουν σημάδια γαστρεντερικής αιμορραγίας, μακροσκοπική αιμορραγία ή άλλα συμπτώματα όπως δύσπνοια ή επιτακτική ανάγκη ούρησης κατά τη διάρκεια της θεραπείας με enzalutamide.

Ταυτόχρονη χρήση με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα: Η enzalutamide είναι ένας ισχυρός επαγωγής ενζύμων και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της αποτελεσματικότητας πολλών ενδεδειγμένων φαρμακευτικών προϊόντων (βλ. παραδείγματα στην παράγραφο 4.5). Συνεπώς, μια ανακάλυψη στην συγχρησιμοποιούμενων φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να διεξάγεται κατά την έναρξη της θεραπείας με enzalutamide. Η ταυτόχρονη χρήση της enzalutamide με φαρμακευτικά προϊόντα που είναι ευαίσθητα υποστηρίγματα πολλών μεταβολικών ενζύμων ή μεταφορέων (βλ. παράγραφο 4.5) πρέπει γενικά να αποφεύγεται εάν η θεραπευτική τους δράση είναι μεγάλης σημασίας για τον ασθενή, και εάν οι προσαρμογές της δόσης δεν μπορούν εύκολα να πραγματοποιηθούν βάσει της παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας ή των ανεπιθύμητων στο πλαίσιο. Η συγχρησίση με βαρφαρίνη και αντιπηκτικά ομαζόνης με κομμηρίνη πρέπει να αποφεύγεται. Εάν το Xtandi συγχρησιάζεται με ένα αντιπηκτικό με μεταβολισμό από το CYP2C9 (όπως η βαρφαρίνη ή ο σενοκομαρίνη), πρέπει να διεξαχθεί επιπρόσθετη παρακολούθηση της Διεθνούς Ομοιοποιημένης Σχέσης (International Normalised Ratio-INR) (βλ. παράγραφο 4.5).

Νεφρική δυσλειτουργία: Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία καθώς η enzalutamide δεν έχει μελετηθεί σε αυτό τον πληθυσμό ασθενών.

Σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία: Μια αύξηση του χρόνου ημίσειας ζωής της enzalutamide έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, πιθανά συσχετιζόμενη με την αυξημένη κατανομή στους ιστούς. Η κλινική σημασία αυτής της παρατήρησης παραμένει άγνωστη. Ωστόσο, αναμένεται ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα για να φτάσουν οι συγκεντρώσεις στη σταθεροποιημένη κατάσταση και ο χρόνος μέχρι να επιτευχθεί η μέγιστη φαρμακολογική δράση καθώς και οι χρόνοι για την έναρξη και μείωση της ενζυμικής επαγωγής (βλ. παράγραφο 4.5) μπορεί επίσης να αυξηθούν.

Πρόσφατη καρδιαγγειακή νόσος: Στις μελέτες φάσης 3 αποκλείστηκαν ασθενείς με πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου (κατά τους τελευταίους 6 μήνες) ή ασταθή στήθαγχη (κατά τους τελευταίους 3 μήνες), καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορίας III ή IV κατά New York Heart Association (NYHA) εκτός αν το κλάσμα εξώθησης αρτηρικής κοιλίας (Left Ventricular Ejection Fraction-LVEF) ≥ 45%, βρογχίτιδα ή μη ελεγχόμενη υπέρταση. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αν το Xtandi συνταγογραφείται σε αυτούς τους ασθενείς.

Η θεραπεία ανδρογόνων αποκλεισμού μπορεί να παρατείνει το διάστημα QT: Σε ασθενείς με ιστορικό ή ύπαρξη παραγόντων κινδύνου για παράταση του

διαστήματος QT και σε ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα φαρμακευτικά προϊόντα που ενδέχεται να παρατείνουν το διάστημα QT (βλ. παράγραφο 4.5), οι θεράποντες γιατροί πρέπει να αξιολογούν το ισοζύγιο οφελών κινδύνου συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας για εμφάνιση κολικιακής ταχυκαρδίας διχρήν (Torsade de pointes) πριν την έναρξη του Xtandi.

Χρήση με χημειοθεραπεία: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της ταυτόχρονης χρήσης του Xtandi με κυτταροστατική χημειοθεραπεία δεν έχει τεκμηριωθεί. Η συγχρησίση της enzalutamide δεν έχει καμία κλινικά σημαντική επίδραση στη φαρμακοκινητική της ενδοφλέβιας νιτοσεαζόλης (βλ. παράγραφο 4.5). Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί μια αύξηση εμφάνισης ουδεροτοπενίας επαγόμενης από τη νιτοσεαζόλη.

Αντιδράσεις υπερευαίσθησης: Αντιδράσεις υπερευαίσθησης εκδηλώνονται με συμπτώματα που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται οίδημα προσώπου, γλώσσας, χειλιών ή φάρυγγα, ή εξάνθημα έχουν παρατηρηθεί με enzalutamide (βλέπε παράγραφο 4.8). Έχουν αναφερθεί σοβαρές δερματικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις (SCARs) με την enzalutamide. Κατά τη συνταγογράφηση, οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τα σημεία και τα συμπτώματα και να παρακολουθούνται στενά για δερματικές αντιδράσεις.

Έκδοχα: Το φάρμακο αυτό περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (λιγότερο από 23 mg) ανά επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, είναι αυτό που ονομάζουμε «ελεύθερο νατρίου».

4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες

Περιγραφή του προφίλ ασφαλείας: Οι πλέον συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι εξοδοντική/κόπωση, εξάψεις, υπέρταση, κατάπνηξη, και πτώση. Άλλες σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν ισχυμική καρδιακή νόσο και επιληπτικές κρίσεις. Επιληπτική κρίση παρανοστήσει στο 0,5% των ασθενών που έλαβαν enzalutamide, στο 0,2% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο και στο 0,3% των ασθενών που έλαβαν βλαυταλίνη. Έχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις του συνδρόμου οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας σε ασθενείς που έλαβαν enzalutamide (βλέπε παράγραφο 4.4).

Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών με μορφή πίνακα: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια κλινικών μελετών παρατίθενται παρακάτω ανά κατηγορία συχνότητας εμφάνισης. Οι κατηγορίες συχνότητας εμφάνισης ορίζονται ως ακολούθως: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), σπάνιες (≥ 1/1.000 έως < 1/100), σπάνιες (≥ 1/10.000 έως < 1/1.000), πολύ σπάνιες (< 1/10.000), μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.

Πίνακας 1: Ανεπιθύμητες ενέργειες που αναγνωρίστηκαν σε ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές και μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου

Κατηγορία/οργανικό σύστημα σύμφωνα με το MedDRA	Ανεπιθύμητες ενέργειες και συχνότητα
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος	Οχι συχνές: λευκοπενία, ουδεροπενία Μη γνωστές: θρομβοπενία
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος	Μη γνωστές: οίδημα προσώπου, οίδημα γλώσσας, οίδημα χειλιών, οίδημα φάρυγγα
Ψυχιατρικές διαταραχές	Συχνές: άγχος Οχι συχνές: οπτική ψευδαίσθηση
Διαταραχές του νευρικού συστήματος	Συχνές: κεφαλαλγία, επηρεασμένη μνήμη, αμνησία, διαταραχή στην προσοχή, δυσανεμία, σύνδρομο ανήλικων παιδιών Οχι συχνές: νοητική διαταραχή, επιληπτικές κρίσεις* Μη γνωστές: σύνδρομο οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας
Καρδιακές διαταραχές	Συχνές: ισχυμική καρδιακή νόσος* Μη γνωστές: παράταση του διαστήματος QT (βλ. παραγράφους 4.4 και 4.5)
Αγγειακές διαταραχές	Πολύ συχνές: εξόφληση, υπέρταση
Διαταραχές του γαστρεντερικού	Μη γνωστές: ναυτία, έμετος, διάρροια
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού	Συχνές: ξηροδερμία, κνησμός Μη γνωστές: εξάνθημα
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	Πολύ συχνές: κατάγματα* Μη γνωστές: μυαλγία, μυϊκή σπασμοί, μυϊκή αδυναμία, οστεομυελίτις
Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού	Συχνές: γυναικομαστία
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης	Πολύ συχνές: εξάνθημα, κόπωση
Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές θεραπευτικών χειρισμών	Πολύ συχνές: πτώση

*Αυθόρμητες αναφορές από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου
* Όπως αξιολογήθηκε από τυποποιημένα ερωτήματα MedDRA (SMQs) των "Σπασμών" συμπεριλαμβανομένων των σπασμών, σπασμών γενικευμένης επιληψίας, σύνθετων εστιακών επιληπτικών κρίσεων, εστιακών επιληπτικών κρίσεων και status epilepticus. Αυτό περιλαμβάνει επίσης περιπτώσεις επιληπτικών κρίσεων με επιπλοκές που οδηγούν σε θάνατο.
* Όπως αξιολογήθηκε από τυποποιημένα ερωτήματα MedDRA (SMQs) "Έμφραγμα του μυοκαρδίου" και "Άλλη ισχυμική καρδιακή νόσο", συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων προτιμώμενων όρων που παρατηρήθηκαν σε τουλάχιστον δύο ασθενείς σε τυποποιημένες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες φάσης 3: στήθαγχη, στεφανιαία νόσο, έμφραγμα του μυοκαρδίου, όξι έμφραγμα του μυοκαρδίου, όξι στεφανιαίο σύνδρομο, ασταθής στήθαγχη, ισχυμία του μυοκαρδίου και αρτηριοσκληρωτικό στεφανιαίο αρτηρίδιο.
* Περιλαμβάνει όλους τους προτιμώμενους όρους με τη λέξη «κάταγμα» στα σάτ.

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών

Επιληπτική κρίση

Στις ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, 24 (0,5%) από τους 4.403 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με ημερήσια δόση 160 mg enzalutamide εμφάνισαν επιληπτική κρίση, ενώ τέσσερις ασθενείς (0,2%) που έλαβαν εικονικό φάρμακο και ένας ασθενής (0,3%) που έλαβε βλαυταλίνη εμφάνισαν επιληπτική κρίση. Η δόση φαίνεται να αποτελεί σημαντικό προγνωστικό παράγοντα του κινδύνου εμφάνισης επιληπτικής κρίσης, όπως αντικατοπτρίζεται από τα προκλινικά δεδομένα και από τα δεδομένα από μια μελέτη κλιμακώσης της δόσης. Στις ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, εξαιρέθηκαν οι ασθενείς με προηγούμενη επιληπτική κρίση ή με παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση επιληπτικής κρίσης. Σε μια δοκιμή μονού αδόκου 9785-CL-0403 (UPWARD) για την αξιολόγηση της επίπτωσης των επιληπτικών κρίσεων σε ασθενείς με προδιαθεσικούς παράγοντες για εκδήλωση επιληπτικών κρίσεων (από τους οποίους 1,6% είχαν ιστορικό επιληπτικών κρίσεων), 8 από 366 (2,2%) ασθενείς που έλαβαν enzalutamide με enzalutamide εμφάνισαν μια επιληπτική κρίση. Η διάρκεια διάρκειας της θεραπείας ήταν 9,3 μήνες.

Δεν είναι γνωστός ο μηχανισμός μέσω του οποίου η enzalutamide μπορεί να μειώσει τον ουδό των επιληπτικών κρίσεων, αλλά θα μπορούσε να σχετιστεί με τα δεδομένα από in vitro μελέτες που δείχνουν ότι η enzalutamide και ο ενεργός μεταβολίτης της προδράσονται και μπορεί να αναστέλλουν τη δραστηριότητα των διαύλων των ιόντων γαμβίου και GABA.

Ισχυμική καρδιακή νόσος

Σε τυποποιημένες κλινικές μελέτες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο, η ισχυμική καρδιακή νόσος εμφανίστηκε στο 3,9% των ασθενών που έλαβαν enzalutamide και ADT συγκριτικά με 1,5% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο και ADT. Δεκατέξι (0,4%) ασθενείς που έλαβαν enzalutamide και 2 (0,1%) ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο εμφάνισαν συμβάν ισχυμικής καρδιακής νόσου που οδήγησε σε θάνατο.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών

Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση ενδοκυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπεται τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφελος-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενο ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω:

Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα. Τηλ: + 30 21 32040380/337, Fax: + 30 21 0654985, Ιστοτόπος: <http://www.ewef.gr>

Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-147 Λευκωσία. Τηλ: +357 22608607, Φαξ: +357 22608669
Ιστοτόπος: <http://www.moh.gov.cy/phs>

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΕΙΞΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Astellas Pharma Europe B.V., Sylvisweg 62, 2333 BE Leiden, Ολλανδία

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΔΙΑΔΕΙΞΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

EU/1/13/846/002 (40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία), EU/1/13/846/003 (80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία)

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΕΙΞΗΣ

Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 21 Ιουνίου 2013

Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 8 Φεβρουαρίου 2018

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

24 Μαΐου 2022

Λεπτομέρεις πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: <http://www.ema.europa.eu>.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Ελλάδα*

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΜΕΤΕΓΩΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ
40mg/TAB	Koupi X 112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	€ 2.261,67

Κύπρος*

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΜΕΤΕΓΩΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
40mg/TAB	Koupi X 112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	€ 3.009,25

*Κυκλοφορούν μόνο τα 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπεριλαμβανόντας την «**KITPINH KAPTA**»



Astellas Pharmaceuticals A. E. B. E.
Αγρολίας 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα.
Τηλ. 210 8189900, Fax: 216 8008 998
www.astellas.com/gr

Τομείς Αντιπρόσωποι/
Διανομέες προϊόντων Astellas στην Κύπρο:
Novagrem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

