



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Σύγχρονες Μοριακές Εξελίξεις

Νέα Φάρμακα - Νέες Θεραπείες

11-13 Μαΐου 2023

Crowne Plaza | ΑΘΗΝΑ



Θα χορηγηθούν
20 Μόρια
Συνεχιζόμενης
Ιατρικής
Εκπαίδευσης
(CME-CPD)

Επιστημονικό
Πρόγραμμα

XGEVA[®]

(denosumab)



GR-XGT-0521-00001

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή.

Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Λιανική τιμή: XGEVA INJ.SOL 120MG/1,7ML (70MG/ML) BTx1VIAL: 284,90 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενέργειων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) Τηλ: 2132040380, Fax 2106549585, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας διαβούλευσης και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ: www.eof.gr για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ: +30 2103447000.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

AMGEN[®]

Αγ. Κωνσταντίνου 59-61
Green Plaza, κτίριο Γ, 15 124 Μαρούσι
Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050
Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr



Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2023

15:00 - 15:30 Προσέλευση - Εγγραφές

15:30 - 16:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις

16:00 - 17:00 Η Ογκολογία σε Προπτυχιακό Επίπεδο (Workshop)

Προεδρείο: Ν. Παυλίδης

16:00 - 16:20 European School of Oncology: Μαθήματα για φοιτητές ιατρικής **Ν. Παυλίδης**

16:20 - 16:40 Why to become a medical oncologist? **Α. Κυριαζόγλου**

16:40 - 17:00 Συζήτηση

17:00 - 18:00 Κυτταρικές Θεραπείες

Προεδρείο: Ι. Μπαλταδάκης, Π. Τσιριγώτης

17:00 - 17:30 Μηχανισμοί αντίστασης στα CART-cells **Π. Τσιριγώτης**

17:30 - 18:00 Συζήτηση

18:00 - 18:30 Διάλειμμα καφέ

18:30 - 19:30 Στρογγυλό τραπέζι

Προεδρείο: Κ. Μυστακίδου, Μ. Νικολάου

18:30 - 18:50 Θρόμβωση & καρκίνος **Γ. Καβουράκης**

18:50 - 19:10 Πρόληψη & αντιμετώπιση της ναυτίας **Μ. Αναστασίου**

19:10 - 19:30 Πόνος **Κ. Μυστακίδου**

19:30 - 21:00 Συνεδρία Νέων Ογκολόγων

Προεδρείο: Α. Κυριαζόγλου, Σ. Λέββα

New therapeutic targets

19:30 - 19:50 Bispecific antibodies **Ν. Γαβριελάτου**

19:50 - 20:10 New ADCs **Μ. Μουτάφη**

20:10 - 20:30 Epigenetic regulation **Ε. Ζωγράφου**

20:30 - 20:50 Oncolytic viruses **Μ. Γιαννακάκου**

20:50 - 21:00 Συζήτηση

**ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΕ
ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΜΕ mHSPC**



**ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΗΤΑΝ ΕΝ ΖΩΗ
ΣΤΑ 4 ΕΤΗ⁶**

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΤΗΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ Η ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ**

**ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ
ΜΕ ΧΤΑΝΔΙ™**



Όταν οι ασθενείς σας παρουσιάζουν προχωρημένο καρκίνο του προστάτη είναι καιρός για δράση.

Το **ΧΤΑΝΔΙ™** είναι μια από του στόματος χορηγούμενη θεραπεία με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στην πρώτη γραμμή του mHSPC, του υψηλού κινδύνου nmCRPC και του ασυμπτωματικού / ήπια συμπτωματικού mCRPC.¹⁻⁶

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Η σύντομη ΠΧΠ του προϊόντος δημοσιεύεται στη σελίδα 22 του παρόντος εντύπου. Για περαιτέρω πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΠΧΠ που διατίθεται από την Astellas Pharmaceuticals AEBE, κατόπιν αιτήσεως. Χτandi Ελλάδα: Καύσι x 112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία - 40mg /TAB - Νοσοκομειακή τιμή: €2.287,04, Λιανική τιμή με ΦΠΑ: €2.763,69 Χτandi Κύπρος: Καύσι X 112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία - 40mg/TAB - Λιανική τιμή με ΦΠΑ: €3.015,59

Οι πλέον συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι εξασθένιση/κύπωση, εξόφλες, υπέρταση, κατάγματα, και πτώση¹. mHSPC: μεταστατικός ορμονοεξαρτώμενος καρκίνος του προστάτη, nmCRPC: μη μεταστατικός, ανθεκτικός στον ενδοκρινικό, καρκίνος του προστάτη, mCRPC: μεταστατικός, ανθεκτικός στον ενδοκρινικό καρκίνος του προστάτη

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος ΧΤΑΝΔΙ™. 2. Sternberg CN et al. N Engl J Med 2020; 382:2197-206. 3. Beer TM et al. Eur Urol 2017; 71: 151-54. 4. Armstrong AJ et al. J Clin Oncol 2019; 37(32): 2974-86. 5. Hussain M et al. N Engl J Med 2018; 378(26): 2465-74. 6. Armstrong AJ et al. J. Clin Oncol 2022; 40: 1616-22. 7. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Αμπατερρόνης. 8. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Απαλουταμίδης. 9. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Νταρολουταμίδης.



Astellas Pharmaceuticals A. E. B. E.
Αγινολάου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα.
Τηλ. 210 8189 900, Fax: 216 8008 998
www.astellas.com/gr

Τοπικός Αντιπρόσωπος/
Διανομέας προϊόντων Astellas στην Κύπρο:
Novagrem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Xtandi™
enzalutamide



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΪΟΥ 2023

Επιστημονικό Πρόγραμμα

09:30 - 10:30 Καρκίνος Κεφαλής Τραχήλου

Προεδρείο: **Ε. Κυροδήμος, Α. Ψυρρή**

09:30 - 10:00 Ο ρόλος της ανοσοθεραπείας

Μ. Καραμούζης

10:00 - 10:30 HPV immunotherapy

Α. Ψυρρή

10:30 - 12:00 Μεταβολισμός, Φλεγμονή & Καρκίνος

Προεδρείο: **Ε. Μπουτάτη, Α. Ράπτης, Α. Χριστοπούλου**

10:30 - 11:00 Παχυσαρκία και καρκίνος

Π. Χαλβατσιώτης

11:00 - 11:30 Άσκηση και καρκίνος

Κ. Καλαϊτζή

11:30 - 12:00 Συζήτηση

12:00 - 12:15 Διάλειμμα καφέ

12:15 - 14:15 Θεραπευτικός αλγόριθμος στο μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα

Προεδρείο: **Σ. Αγγελάκη, Ε. Λινάρδου, Ε. Σαμαντάς**

12:15 - 12:45 Νέοι θεραπευτικοί ορίζοντες μέσω του διπλού

ανοσοαποκλεισμού στην 1η γραμμή του μεταστατικού ΜΜΚΠ

Α. Κουμαριανού

Sponsored by Bristol Myers Squibb™

12:45 - 13:15 The most important updates in the therapeutic approach of the 1st line of NSCLC for patients without EGFR, ALK or ROS aberrations

Π. Οικονομοπούλου

Sponsored by **sanofi**

13:15 - 13:45 Στον καρκίνο του πνεύμονα, η στοχευμένη θεραπεία ξεκινά με το testing: Στοχεύοντας τον MET

Ι. Μούντζιος

Sponsored by **MERCK**

13:45 - 14:15 Νεότερες εξελίξεις στην αντιμετώπιση ασθενών με NSCLC πρώιμου σταδίου

Μ. Σκόνδρα

Sponsored by **AstraZeneca**

14:15 - 15:15 Μεσημβρινή διακοπή



OPDIVO + **YERVOY**
(nivolumab) (ipilimumab)

BUILT TO LAST

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος OPDIVO,
Ημερομηνία αναθεώρησης κειμένου, 27 Οκτωβρίου 2022.



Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος YERVOY,
Ημερομηνία αναθεώρησης κειμένου, 27 Οκτωβρίου 2022.



Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών

Ελλάδα
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ. + 30 21 32040380/337
Φαξ + 30 21 06549585
Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>

Κύπρος
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Υγείας
CY-1475 Λευκωσία
Τηλ. +357 22608607
Φαξ + 357 22608669
Ιστοτόπος: www.moh.gov.cy/phs

 **Bristol Myers Squibb™**

Bristol-Myers Squibb A.E.
Αττικής 49-53 & Προποντιδός 2, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική
ΤΘ 63883 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική
Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400, Φαξ 210 6074333
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ **12 ΜΑΪΟΥ** 2023

Επιστημονικό Πρόγραμμα

15:15 - 16:15 **Μελάνωμα**

Προεδρείο: Ε. Γκόγκα, Δ. Μπαφαλούκος

Νεότερες Εξελίξεις στο Μελάνωμα

Ε. Γκόγκα

16:15 - 16:45 **Δορυφορική διάλεξη**

Προεδρείο: Χ. Χριστοδούλου, Ι. Κωτσαντής

Χρήση νεότερων στοχευμένων θεραπειών
σε προηγουμένως θεραπευμένο, ανεγχείρητο τοπικά
προχωρημένο ή μεταστατικό χολαγγειοκαρκίνωμα

Ι. Κωτσαντής

Sponsored by **GENESIS**
pharma

16:45 - 18:45 **Βέλτιστα εργαλεία και μέθοδοι για ανάπτυξη
και εφαρμογή θεραπειών ακριβείας**

Προεδρείο: Ι. Κωτσαντής

16:45 - 17:15 Genomic profiling to expand precision cancer medicine
in the real world: The exotic trial

Ι. Μούντζιος

17:15 - 17:45 Σχεδιασμός Κλινικών Μελετών την Εποχή
της Θεραπευτικής Ακριβείας

Ε. Φούντζηλα

17:45 - 18:15 Ανακάλυψη βιοδεικτών με τεχνητή νοημοσύνη (Horizon)

Ι. Παπανικολάου

18:15 - 18:45 Σχεδιασμός και διεξαγωγή κλινικών μελετών φάσης Ι:
Ώρα για αλλαγή; Οδηγίες MDICT 2022

Π. Οικονομοπούλου

18:45 - 19:15 **Δορυφορική Διάλεξη**

Προεδρείο: Α. Μπάμιας

Η αξία της εξατομίκευσης του θεραπευτικού πλάνου
στο ταξίδι των ασθενών με καρκίνο νεφρού

Α. Κυριαζόγλου

Sponsored by **IPSEN** | ONCOLOGY
Innovation for patient care

19:15 - 19:30 **Διάλειμμα καφέ**

BINOCRIT[®]

epoetin alfa

ZARZIO[®]

filgrastim

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοσήστε
ΟΛΕΣ τις ασυμπτωτικές νόσους για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Πριν τη συνταγογράφηση
συμβουλευθείτε την πλήρη Περίληψη των
Χαρακτηριστικών του κάθε Προϊόντος.

SANDOZ A Novartis
Division

KAK: Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Αυστρία

Στοιχεία επικοινωνίας στην Ελλάδα: Novartis (Hellas) A.E.B.E./Sandoz division

Φραγκοκλησιάς 7B, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα, Τηλ.: 210 2811712, Φαξ: 210 6857655

Πρωτεύεται από την εταιρεία:



DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21^ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας,

145 68 Κρυονέρι, Αττικής, Ελλάδα

T: +30 210 8161802, F: +30 210 8161587



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΪΟΥ 2023

Επιστημονικό Πρόγραμμα

19:30 - 21:15	Opening Ceremony Lifestyle Medicine and Oncology: Better together for cancer prevention & survivorship <i>Chair: A. Trichopoulou, A. Psyrri, A. Christopoulou</i>	
19:30 - 19:50	The international Cancer Foundation	S. Peters
19:50 - 20:10	Promoting Exercise Medicine in Cancer Patients	G. Karanastasis
20:10 - 20:30	Implementing lifestyle medicine in cancer survivors - the COACH approach	B. Frates
20:30 - 20:50	Mediterranean lifestyle and cancer	St. Kales
20:50 - 21:10	Building the first survivorship clinic in Greece using Lifestyle Medicine	K. Kalaitzi
21:10 - 21:15	Discussion	





Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε τις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων οι οποίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήσεως στην εταιρία **Zejula**: Λ.Τ. 4.588,86€, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%, κατόπιν ένταξης του προϊόντος στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η ένταξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού. **Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση**: Το κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει μονοϋδρική τοσουλικά νιραπαρίμπη που ισοδυναμεί προς 100 mg νιραπαρίμπη.

Jemperli: Λ.Τ. 6.463,80€, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%, κατόπιν ένταξης του προϊόντος στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία. **Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση**: Ένα φιαλίδιο πυκνού διαλύματος για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση των 10 ml περιέχει 500 mg dostarlimab.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης της καταχώρησης.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

PM-GR-DST-JRNA-220002 ΙΣΧΥΣ 6/2022- 6/2023

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK.

©2022 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούπαρχος του Ομίλου GSK.



ΣΑΒΒΑΤΟ **13 ΜΑΪΟΥ** 2023

Επιστημονικό Πρόγραμμα

09:30 - 11:30 Καρκίνος Μαστού

Προεδρείο: Α. Κούτρας, Χ. Χριστοδούλου

09:30 - 09:55 Μεταστατικός τριπλά αρνητικός καρκίνος μαστού: ποιος ο θεραπευτικός στόχος και ποια η βέλτιστη θεραπευτική προσέγγιση ανά γραμμή θεραπείας;

Δ. Τρυφωνόπουλος

Sponsored by  **GILEAD**

Oncology

09:55 - 10:15 Νεότερα δεδομένα στον HER2(+) και στον HER2(-) καρκίνο του μαστού.

Γ. Κεσίσης

10:15 - 10:35 CDk4/6 στον καρκίνο μαστού

Ε. Γαλάνη

10:35 - 10:55 Νέες εξελίξεις στην επικουρική αντιμετώπιση ER+ καρκίνου του μαστού

Ν. Σπάθας

10:55 - 11:15 Προεγχειρητική θεραπεία στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού

Η. Κοττάς

11:15 - 11:30 Συζήτηση

11:30-12:00 Δορυφορική διάλεξη

Προεδρείο: Β. Γεωργούλιας, Α. Κωτσάκης

Sponsored by  **MSD**

INVENTING FOR LIFE

Επαναπροσδιορίζοντας το προσδόκιμο επιβίωσης στο Μεταστατικό ΜΜΚΠ

Δ. Ζιώγας

12:00 - 12:30 Διάλειμμα καφέ

12:30 - 14:00 Καρκίνος Γαστρεντερικού

Προεδρείο: Ι. Σουγκλάκος, Ζ. Σαριδάκη

12:30 - 13:00 Νεότερες εξελίξεις στη θεραπεία όγκων του ανώτερου γαστρεντερικού

Ν. Χαραλαμπίδης

13:00 - 13:30 Νεοεπικουρική θεραπεία στον καρκίνο του ορθού

Ι. Σουγκλάκος

13:30 - 14:00 Συζήτηση

14:00 - 15:00 Μεσημβρινή διακοπή

ZIEXTENZO[®] pegfilgrastim

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση

KAK: Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Αυστρία

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή.

Η διάγνωση &/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο & μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Pemetrexed/Ebewe

25mg/ml (BTx1 VIALx20ML, BTx 1 VIALx40ML)

KAK: EBWE Pharma Ges.m.H. Nfg.KG, Mondseestrasse 11,
4866 Unterach am Attersee, Αυστρία

Τρόπος διάθεσης:

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση

Sunitinib/Sandoz

12,5MG / 25,0 MG /50,0MG

KAK: Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, SI-1000 Ljubljana, Σλοβενία

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ιατρού

Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές

Νοσοκομειακές Τιμές:

ZIEXTENZO INJ.SO.PFS 6MG BTx1 PF.SYR 271.64€
PEMETREXED/EBWE C/S.SOL.IN 25MG/ML BTx 1 VIAL x20 ml: 430.00€
PEMETREXED/EBWE C/S.SOL.IN 25MG/ML BTx 1 VIAL x40 ml: 860.01€
SUNITINIB/SANDOZ CAPS 12.5MG/CAP BTx30 CAPS (σε BLISTER Alu-OPA/ALU/PVC): 548.87€
SUNITINIB/SANDOZ CAPS 25.0 MG/CAP BTx30 CAPS (σε BLISTER Alu-OPA/ALU/PVC): 1097.09€
SUNITINIB/SANDOZ CAPS 50.0MG/CAP BTx30 CAPS (σε BLISTER Alu-OPA/ALU/PVC): 2191.10€

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ΣΑΒΒΑΤΟ **13 ΜΑΪΟΥ** 2023

Επιστημονικό Πρόγραμμα

15:00 - 16:00 **Καρκίνος Προστάτη**

Προεδρείο: Ε. Μπουρνάκης, Μ. Λιόντος

15:00 - 15:30 Sequencing

Μ. Λιόντος

15:30 - 16:00 PARP αναστολείς

Ρ. Ζακοπούλου

16:00 - 16:30 **Δορυφορική Διάλεξη**

Sponsored by



Προεδρείο: Α. Κυριαζόγλου

Αγνωστική ως προς τον όγκο θεραπευτική προσέγγιση -
Στοχεύοντας θετικούς σε σύντηξη NTRK συμπαγείς όγκους

Θ. Φλώρος

16:30 - 17:30 **Highlights στο Γυναικολογικό Καρκίνο**

Προεδρείο: Χ. Παπαδημητρίου, Γ. Αραβαντινός, Ε. Τιμοθεάδου

16:30 - 17:00 Ανοσοθεραπεία και νεότερες μελέτες στον καρκίνο ενδομητρίου

Ευ. Λιανός

17:00 - 17:30 Νεότερα δεδομένα στο ρόλο των PARP στον καρκίνο ωοθηκών

Δ. Ματθαίος

17:30 - 19:30 **Managing IO toxicity**

Προεδρείο: Α. Κυριαζόγλου, Π. Οικονομοπούλου

17:30 - 18:00 Diabetes

Κ. Μαρκάκης

18:00 - 18:30 Cutaneous Toxicities

Ε. Παπαδαυίδ

18:30 - 19:00 Endocrine irAE

Μ. Πέππα

19:00 - 19:30 Renal toxicity

Σ. Λιονάκη

19:30 - 20:00 **Palliative Care**

Προεδρείο: Θ. Οικονομόπουλος, Β. Παππά

Νέες Θεραπείες στα λεμφώματα

Σ. Παπαγεωργίου

20:00 - 20:30 **Συμπεράσματα - Λήξη Συνεδρίου**



ZALTRAP[®]

aflibercept

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ την οποία μπορείτε να ζητήσετε από την εταιρία στο τηλ. 210 9001600 ή στο medicalinformation.greece@sanofi.com. Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών παρακαλούμε επικοινωνήστε με: ΙΑΤΡΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ | Τηλ. 210 9001 600, medicalinformation.greece@sanofi.com

Τρόπος Διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή:

Μόνο για Νοσοκομειακή Χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

Νοσοκομειακή τιμή πώλησης ανά συσκευασία: ZALTRAP C/S.SOL.IN 25MG/ML BTx1 VIAL x 4ML: 249,87€

ZALTRAP C/S.SOL.IN 25MG/ML BTx1 VIAL x 8ML: 500,56€

sanofi

Sanofi-aventis Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε. Αθήνα: Λεωφ. Συγγρού 348, Κτίριο Α,
176 74 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 90 01 600, Fax: 210 92 49 129, www.sanofi.gr


Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα
πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ
τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας
την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Κατάλογος Ομιλητών-Προέδρων

Frates Beth	MD, Lifestyle Medicine at Harvard Medical School, Clearing Medical Advisory Board
Kales Stefanos	MD, MPH, FACP, FACOEM, Professor of Medicine, Harvard Medical School Professor & Director, Occupational Medicine Residency, Harvard TH Chan School of Public Health, Division Chief, OEM, Cambridge Health Alliance
Peters Solange	MD, PhD, Professor, Chair Medical Oncology, Oncology Department, CHUV, Lausanne University, ESMO President 2020- 2022, Scientific Coordinator, European Thoracic Oncology Platform (ETOP), Annals of Oncology Associate Editor Lung Cancer Deputy Editor
Αγγελάκη Σοφία	Καθηγήτρια Παθολογικής Ογκολογίας, Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου, Εργαστήριο Μεταφραστικής Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αναστασίου Μαρία	Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, MSc, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικών»
Αραβαντινός Γεράσιμος Γαβριελάτου Νίκη	MD, PhD, Διευθυντής, Παθολόγος - Ογκολόγος, Ευρωκλινική Αθηνών Ογκολογική Μονάδα, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Πανεπιστημιακή Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικών»
Γαλάνη Ελένη	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Αν. Διευθύντρια Β' Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Metropolitan»
Γεωργούλιας Βασίλειος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Γιαννακάκου Μαρία Γκόγκα Ελένη	Ειδικευόμενη Παθολογίας, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι» Παθολόγος Ογκολόγος, Καθηγήτρια Παθολογίας - Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Α' Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Ζακοπούλου Ρουμπίνη	Παθολόγος Ογκολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Β' Π.Π.Κ., Π.Γ.Ν.Α. «Αττικών»
Ζιώγας Δημήτριος	Παθολόγος Ογκολόγος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Επιστημονικός Συνεργάτης Α' Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Ζωγράφου Ελένη	Ιατρός, Βιολόγος, MSc, PhD
Καβουράκης Γεώργιος	Παθολόγος - Ογκολόγος Ογκολογική Μονάδα Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν.Α. «Αττικών»
Καλαϊτζή Καλλιόπη	MD, MSc, Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Lifestyle Medicine & Culinary Coaching certified, Υποψ. Διδάκτορας Ε.Κ.Π.Α.

Το CABOMETYX® ως αναστολέας τυροσινικής κινάσης (TKI) και από του στόματος θεραπεία επέδειξε στατιστικά σημαντική βελτίωση των PFS, OS, ORR² μέσω της αναστολής των παραγόντων MET, AXL, VEGFR³ σε όλες τις κλινικές μελέτες¹



Νεφροκυτταρικό Καρκίνωμα

1^η Γραμμή¹

Σε ενήλικες ασθενείς με προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα ενδιάμεσης ή φτωχής πρόγνωσης, οι οποίοι δεν έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία.

Σε συνδυασμό με νιβολουμάμπη, ενδείκνυται για την θεραπεία πρώτης γραμμής σε ενήλικες ασθενείς με προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα.

2^η Γραμμή¹

Σε ενήλικες ασθενείς με προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα μετά από προηγούμενη στοχεύουσα θεραπεία αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (vascular endothelial growth factor, VEGF).



Ηπατοκυτταρικό Καρκίνωμα

2^η Γραμμή¹

Ενδείκνυται ως μονοθεραπεία για τη θεραπεία του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος σε ενήλικες ασθενείς που έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με σοραφενίμπη.



Διαφοροποιημένο καρκίνωμα θυρεοειδούς

2^η Γραμμή¹

Σε ενήλικες ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό, διαφοροποιημένο καρκίνωμα θυρεοειδούς (DTC)⁴, ανθεκτικό ή μη κατάλληλο για θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο (RAI)⁴, που έχουν παρουσιάσει εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά από προηγούμενη συστηματική θεραπεία.

Το CABOMETYX® έχει ένα διαχειρίσιμο προφίλ ανεκτικότητας και ασφάλειας, το οποίο έχει αποδειχθεί σε όλες τις κλινικές μελέτες προσφέροντας στους ασθενείς ποιότητα ζωής¹

IPSEN MON. ΕΠΕ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63 , 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 9843324, 210 9858930, FAX: 210 9887911
E-mail: ipsenepe@ipsen.com

<http://www.ipsen.gr>

Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930

Σύγχρονες Μοριακές Εξελίξεις

Νέα Φάρμακα - Νέες Θεραπείες

11-13 Μαΐου 2023

Crowne Plaza | ΑΘΗΝΑ



Κατάλογος Ομιλητών-Προέδρων

Καραμούζης Μιχαήλ	Παθολόγος Ογκολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
Καραναστάσης Γεώργιος	B.Sc., M.Sc., Ph.D.(s), Founder/Innovative leader «Olistic.gr», Γυμναστής Κ.Ε.Φ.Ι.
Κεσίσης Γεώργιος	Παθολόγος Ογκολόγος, Κλινική «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη
Κοττέας Ηλίας	MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
Κουμαριανού Άννα	MD, PhD, Διευθύντρια ΕΣΥ, Παθολόγος - Ογκολόγος, Αιματολογική-Ογκολογική Μονάδα, Δ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
Κούτρας Άγγελος	Παθολόγος Ογκολόγος, Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος, Π.Γ.Ν. Πατρών
Κυριαζόγλου Αναστάσιος	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
Κυροδήμος Ευθύμιος	Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου, Αναπληρωτής Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
Κωτσάκης Αθανάσιος	Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας
Κωτσαντής Ιωάννης	Παθολόγος Ογκολόγος, Επικουρικός Επιμελητής Β' Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Λέββα Σοφία	MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο & «Βιοκλινική» Θεσσαλονίκης
Λιανός Ευάγγελος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Παθολογικό - Ογκολογικό Τμήμα, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Λινάρδου Ελένη	MD, PhD, Διδάκτωρ Imperial College London, Διευθύντρια Δ' Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Metropolitan»
Λιονάκη Σοφία	Επίκουρη Καθηγήτρια Νεφρολογίας, Νεφρολογική Μονάδα, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
Λιόντος Μιχαήλ	Παθολόγος Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Θεραπευτικής Ογκολογίας, Ε.Κ.Π.Α., Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Μαρκάκης Κωνσταντίνος	MD, PhD, Επιμελητής Α', Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Μονάδα Έρευνας και Διαβητολογικό Κέντρο, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
Ματθαίος Δημήτριος	Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, MSc, PhD, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Μονάδα Χημειοθεραπείας - Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ρόδου
Μούντζιος Ιωάννης	Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, MSc, PhD, Διευθυντής, Δ' Ογκολογική Κλινική και Μονάδα Κλινικών Μελετών, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Μουτάφη Μυρτώ	MD, PhD(c), Ειδικευόμενη Παθολόγος Ογκολόγος, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν», ESMO YOC Committee



Κατάλογος Ομιλητών-Προέδρων	Μπαλταδάκης Ιωάννης	Αιματολόγος, Διευθυντής, Αιματολογική Κλινική - Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
	Μπάμιας Αριστοτέλης	Καθηγητής Θεραπευτικής - Παθολογίας - Ογκολογίας Ε.Κ.Π.Α, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
	Μπαφαλούκος Δημήτριος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Α' Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Metropolitan», Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δ.Α.
	Μπουρνάκης Ευάγγελος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Κλινική Ογκολογικών Κλινικών Μελετών και Έρευνας, Νοσοκομείο Metropolitan General
	Μπουτάτση Ελένη	Καθηγήτρια Παθολογίας - Σακχαρώδη Διαβήτη, Λοιμωξιολόγος
	Μυστακίδου Κυριακή	Καθηγήτρια Ανακουφιστικής Αγωγής, Ιατρική Σχολή, Υπεύθυνη Μονάδας Ανακουφιστικής Αγωγής "Τζένη Καρέζη" (Παράρτημα Αρεταίειου Νοσοκομείου), Ε.Κ.Π.Α.
	Νικολάου Μιχαήλ	Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Β', Α' Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
	Οικονομόπουλος Θεοφάνης	Παθολόγος Ογκολόγος, Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α
	Οικονομοπούλου Παναγιώτα	Παθολόγος Ογκολόγος, Β' Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
	Παπαγεωργίου Σωτήριος	Αιματολόγος, Επιμελητής Α', Αιματολογική Μονάδα, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
	Παπαδαυίδ Ευαγγελία	Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Β' Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
	Παπαδημητρίου Χρήστος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνος, Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Α. «Αρεταίειο»
	Παπανικολάου Ιωάννης	Λέκτορας Παθολογίας - Γαστρεντερολογίας Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
	Παππά Βασιλική	Καθηγήτρια Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α., Αιματολογική Μονάδα, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
	Παυλίδης Νικόλαος	MD, PhD, FRCP, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, European School of Oncology Coordinator on Career Development
	Πέππα Μελπομένη	Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνη Μονάδος Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Παθήσεων των Οστών, Β' Προπαιδευτική-Παθολογική Κλινική, Μονάδα Έρευνας και Διαβητολογικό Κέντρο, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
	Ράπτης Αθανάσιος	Καθηγητής Παθολογίας-Σακχαρώδη Διαβήτη, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο (Μονάδα Έρευνας) Ε.Κ.Π.Α. και Διαβητολογικό Κέντρο, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
	Σαμαντάς Επαμεινώνδας	Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Β' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan»



Σαριδάκη Ζένια	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια Α' Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Metropolitan» Αθήνα, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ογκολογικού Τμήματος, «Ασκληπιός ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ», Ηράκλειο Κρήτης
Σκόνδρα Μαρία	Παθολόγος Ογκολόγος, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Σουγκλάκος Ιωάννης	Παθολόγος Ογκολόγος, Αν. Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης
Σπάθας Νικόλαος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Νοσοκομείο «Metropolitan»
Τιμοθεάδου Ελένη	Αν. Καθηγήτρια Παθολογίας - Ογκολογίας Α.Π.Θ., Διευθύντρια, Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας, Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Τριχοπούλου Αντωνία	Academician, Emeritus Professor, Medical School at National Kapodistrian University of Athens
Τρυφωνόπουλος Δημήτριος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Β' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Τσιριγώτης Παναγιώτης	Καθηγητής Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α., Αιματολογική Μονάδα - Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α. Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα
Φλώρος Θεοφάνης	MD, Παθολόγος Ογκολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός, Διευθυντής 5 ^{ης} Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Metropolitan General», Αν. Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, τ. ResFac, University of Pittsburgh Cancer Institute (UPCI), University of Pittsburgh School of Medicine (UPSOM)
Φούντζηλα Ελένη	Παθολόγος - Ογκολόγος, Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας «Άγιος Λουκάς», Clinical Associate Professor, European University Cyprus
Χαλβατσιώτης Παναγιώτης	Ιατρός, Αν. Καθηγητής Παθολογίας - Διαβήτη, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Χαραλαμπίδης Νικόλαος	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Β' Παθολογικού-Ογκολογικού Τμήματος, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Χριστοδούλου Χρήστος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Β' Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Metropolitan»
Χριστοπούλου Αθηνά	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια και Υπεύθυνη Ογκολογικής Μονάδας, Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»
Ψυρρή Αμάντα	Καθηγήτρια Παθολογίας-Ογκολογίας Ε.Κ.Π.Α., Διευθύντρια Β' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»



Γενικές Πληροφορίες

Διοργάνωση

Ελληνική Εταιρεία Καρκίνου Κεφαλής & Τραχήλου

Τόπος διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Crowne Plaza

Μιχαλακοπούλου 50

Αθήνα 115 28

Τηλ.: 210-7278000

Ημερομηνία διεξαγωγής

11-13 Μαΐου 2023

Συμμετοχή

Η εγγραφή στο Συνέδριο είναι **δωρεάν**.

Εγγραφές

Η εγγραφή και η παρακολούθηση του Συνεδρίου επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι φοιτητές είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.

Οδηγίες για Παρακολούθηση με Φυσική Παρουσία

Όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία θα πρέπει να προσέλθουν στον χώρο διεξαγωγής για την εγγραφή τους ή να πραγματοποιήσουν την προεγγραφή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.events.gr.

Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό badge (barcode), το οποίο θα πρέπει να σκανάρουν κατά την είσοδο και έξοδό τους στην αίθουσα.

Οδηγίες Διαδικτυακής Παρακολούθησης

Η Επιστημονική Εκδήλωση θα προβάλλεται διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας www.livemed.gr. Εάν είστε **νέος χρήστης** παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο Livemed (πατήστε στο πεδίο **Register / Εγγραφή**). Η δημιουργία λογαριασμού είναι **δωρεάν** και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε από το μενού την κατηγορία **Live**, το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο **Go Live ή Go Virtual**.



Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγете από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την «**Αίθουσα Συνεδριάσεων**».

Σημείωση: Εφόσον θέλετε να παραλάβετε πιστοποιητικό, μετά τη σύνδεσή σας στο Livemed, είναι απαραίτητο να μεταβείτε στην εικονική «**Γραμματεία Συνεδρίου**», πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο και να ολοκληρώσετε την «**Εγγραφή**» σας στην επιστημονική εκδήλωση που επιθυμείτε, ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος παρακολούθησης.

Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν 20 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits).

Παραλαβή Πιστοποιητικού



Στο Συνέδριο θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης του χρόνου παρακολούθησης.



Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα σταλεί μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου σε όσους σύνεδρους έχουν κάνει εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του σεμιναρίου.

Γραμματεία:



Events & Travel Solutions

E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.

Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη, Τηλ.: 210 98 80 032

Fax: 210 98 81 303 , E-mail: ets@otenet.gr , ets@events.gr , Website: www.events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η Ε.Τ.Σ. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Xtandi - 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Xtandi - 80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

2. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΩΤΙΚΑ ΣΥΝΕΤΗ

Xtandi - 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 40 mg enzalutamide.

Xtandi - 80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 80 mg enzalutamide.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόγων, βλ. παράγραφο 6.1.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο.
Xtandi - 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κίτρινα στρογγυλά - επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, χαραγμένα με το E 40.
Xtandi - 80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κίτρινα οβάλ - επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, χαραγμένα με το E 80.

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

- Το Xtandi ενδείκνυται για:
 - η θεραπεία του μεταστατικού, ορμονοεξαρτημένου καρκίνου του προστάτη (mHSPC) σε συνδυασμό με θεραπεία στέρησης ανδρικών (ADT) σε ενήλικες άνδρες (βλ. παράγραφο 5.1).
 - η θεραπεία του μη μεταστατικού υψηλού κινδύνου ανδρικού στον εννοιολογικό καρκίνο του προστάτη (CRPC) σε ενήλικες άνδρες (βλ. παράγραφο 5.1).
 - η θεραπεία του μεταστατικού CRPC σε ενήλικες άνδρες οι οποίοι είναι συμπτωματικοί ή ήπια συμπτωματικοί ήπια από αποτυχία της θεραπείας στέρησης ανδρικών και στους οποίους η χημειοθεραπεία δεν ενδείκνυται ακόμα κλινικά (βλ. παράγραφο 5.1).
 - η θεραπεία του μεταστατικού CRPC σε ενήλικες άνδρες των οποίων η νόσος έχει εξελιχθεί κατά τη διάρκεια ή μετά από θεραπεία με ντοστοαζελή.

4.3 Αντενδείξεις

Υπερευαίσθησία στα (στις) δραστική(ές) συσταί(ε)ς ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στον παράγραφο 6.1.

Γυναίκες που είναι ή μπορεί να είναι έγκυες (βλ. παραγράφους 4.6 και 6.6).

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Κίνδυνος επιληπτικών κρίσεων: Η χρήση της enzalutamide έχει συσχετιστεί με επιληπτικές κρίσεις (βλ. παράγραφο 4.8). Η απόφαση για τη συνέχιση της θεραπείας σε ασθενείς που εμφανίζουν επιληπτικές κρίσεις πρέπει να λαμβάνεται ανά περίπτωση.

Σύνδρομο σπασμών αναρτήσιμης εγκεφαλοπάθειας (Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome-PRES): Έχουν αναφερθεί σπάνιες αναφορές του συνδρόμου σπασμών αναρτήσιμης εγκεφαλοπάθειας (PRES) σε ασθενείς που λαμβάνουν Xtandi (βλ.επίσης παράγραφο 4.8). Το PRES είναι μία σπάνια, αναστρέψιμη, νευρολογική διαταραχή, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί με rapidly εξελισσόμενη συμπτώματα συμπεριλαμβανομένων σπασμών, κεφαλαλγίας, σύγχυσης, πτώσεων και άλλων οπτικών και νευρολογικών διαταραχών, με ή χωρίς σχετιζόμενη υπέρταση. Η διάγνωση του PRES απαιτεί επιβεβαίωση με απεικονιστικές εξετάσεις του εγκεφάλου, κατά προτίμηση μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου (MRI). Συνιστάται διακοπή του Xtandi σε ασθενείς που αναπτύσσουν PRES.

Δευτερογενείς Κανονικοί Κακοήθεις: Έχουν αναφερθεί περιστατικά δευτερογενών κυρίων κακοήθων σε ασθενείς που έλαβαν enzalutamide σε κλινικές μελέτες. Σε κλινικές μελέτες φάσης 3 τα πιο συχνά αναφερόμενα συμβάντα σε ασθενείς που έλαβαν enzalutamide και μεγαλύτερα από το εικονικό φάρμακο, ήταν καρκίνος ουροδόχου κύστης (0,3%), αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου (0,2%), καρκίνος από μεταβατικό επιθήλιο (0,2%) και μεταβατικό καρκίνωμα ουροδόχου κύστης (0,1%). Οι ασθενείς θα πρέπει να συμβουλευθούν άμεσα το γιατρό τους εάν παρατηρήσουν σημεία γαστρεντερικής αμφορμίας, μακροσκοπική αιματοουρία ή άλλα συμπτώματα όπως δυσουρία ή επιτακτική ανάγκη ούρησης κατά τη διάρκεια της θεραπείας με enzalutamide.

Ταυτόχρονη χρήση με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα: Η enzalutamide είναι ένας ισχυρός επαγωγέας ενζύμων και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της αποτελεσματικότητας πολλών ευρέως χρησόμενων φαρμακευτικών προϊόντων (βλ. παραδείγματα στον παράγραφο 4.5). Συνεπώς, μια ανασκόπηση των συγχρονισμένων φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να διεξαχθεί κατά την έναρξη της θεραπείας με enzalutamide. Η ταυτόχρονη χρήση της enzalutamide με φαρμακευτικά προϊόντα που είναι ευαίσθητα υποστήριξη πολλών μεταβολικών ενζύμων ή μεταφορέων (βλ. παράγραφο 4.5) πρέπει γενικά να αποφεύγεται εάν η θεραπευτική τους δράση είναι μεγάλη σημασίας για τον ασθενή, εάν οι προσαρμογές της δόσης δεν μπορούν εύκολα να πραγματοποιηθούν βάσει της παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας ή των ανεπιθύμητων στο πλαίσιο. Η συγχρονισμένη με βαρφαρίνη και αντιπηκτική ομοιοζόντια με κομωρίνη πρέπει να αποφεύγεται. Εάν το Xtandi συγχρονιστεί με ένα αντιπηκτικό που μεταβολίζεται από το CYP2C9 (όπως η βαρφαρίνη ή ασεκνοχολόλη), πρέπει να διεξαχθεί επιπρόσθετη παρακολούθηση της Διεθνούς Ομαλοποιημένης Σχέσης (International Normalised Ratio-INR) (βλ. παράγραφο 4.5).

Νεφρική διαλυτολογία: Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική διαλυτολογία καθώς η enzalutamide δεν έχει μελετηθεί σε αυτό τον πληθυσμό ασθενών.

Σοβαρή ηπατική διαλυτολογία: Μια αύξηση του χρόνου ημίσειας ζωής της enzalutamide έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική διαλυτολογία, πιθανά συσχετιζόμενη με την αυξημένη κατανομή στους ιστούς. Η κλινική σημασία αυτής της παρατήρησης παραμένει άγνωστη. Ωστόσο, ανιχνεύεται ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα για να φτάσουν οι συγκεντρώσεις της σταθεροποιημένης κατάσταση και ο χρόνος μέχρι να επιτευχθεί η μέγιστη φαρμακολογική δράση καθώς και οι χρόνοι για την έναρξη και μείωση της ενζυμικής επαγωγής (βλ. παράγραφο 4.5) μπορεί επίσης να αυξηθούν.

Πρόσφατος καρδιαγγειακός νόσος: Στις μελέτες φάσης 3 αποκλειστικοί ασθενείς με πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου (κατά τους τελευταίους 6 μήνες) ή ασταθή στήθαγχη (κατά τους τελευταίους 3 μήνες), καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορίας III ή IV κατά New York Heart Association (NYHA) εκτός αν το κλάσμα εκκένωσης φρούστερς κολίας (Left Ventricular Ejection Fraction-LVEF) ≥ 45%, βραδυκαρδία ή μη ελεγχόμενη υπέρταση. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη εάν το Xtandi συνταγογραφείται σε αυτούς τους ασθενείς.

Η θεραπεία ανδρικών ορμονικών αποκλεισμού μπορεί να παρατείνει το διάστημα QT: Σε ασθενείς με ιστορικό ή ύπαρξη παραγόντων κινδύνου για παρατάση του

διαστήματος QT και σε ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα φαρμακευτικά προϊόντα που ενδέχεται να παρατείνουν το διάστημα QT (βλ. παράγραφο 4.5), οι θεράποντες γιατροί πρέπει να αξιολογούν το ισόγυιο οφέλους κινδύνου συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας για εμφάνιση κολικής ταχυκαρδίας διηρη ριπίου (Torsade de pointes) πριν την έναρξη του Xtandi.

Χρήση με χημειοθεραπεία: Η ασφαλεία και η αποτελεσματικότητα της ταυτόχρονης χρήσης του Xtandi με κυταροστικές χημειοθεραπείες δεν έχει τεκμηριωθεί. Η συγχρονισμένη χρήση της enzalutamide δεν έχει κλινικά σημαντική επίδραση στη φαρμακοκινητική της ενδοφλέβιας ντοστοαζελής (βλ. παράγραφο 4.5). Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί μια αύξηση εμφάνισης ουδετεροπενίας επαγόμενης από τη ντοστοαζελή.

Αντιδράσεις υπερευαίσθησης: Αντιδράσεις υπερευαίσθησης εκδήλωναν με συμπτώματα που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, οίδημα προσώπου, γλώσσας, χείλους ή φάρυγγα, ή εξάνθημα έχουν παρατηρηθεί με enzalutamide (βλ.επίσης παράγραφο 4.8). Έχουν αναφερθεί σοβαρές δερματικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις (SCARs) με την enzalutamide. Κατά τη συνταγογράφηση, οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τα σημεία και τα συμπτώματα και να παρακολουθούνται στενά για δερματικές αντιδράσεις.

Έκδοχα: Το φάρμακο αυτό περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (λιγότερο από 23 mg) ανά επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, είναι αυτό που αναμειγνύεται «ελεύθερο νατρίου».

4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες

Περιήληψη του προφίλ ασφαλείας: Οι πλέον συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι εξοδοντική/κόπωση, εξόφληση, υπέρταση, κατάπνοια, και πτώση. Άλλες σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβανομένων ισχαιμική καρδιακή νόσο και επιληπτικές κρίσεις. Επιληπτική κρίση παρουσιάστηκε στο 0,5% των ασθενών που έλαβαν enzalutamide, στο 0,2% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο και στο 0,3% των ασθενών που έλαβαν βικαλουταμίδη. Έχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις του συνδρόμου σπασμών αναρτήσιμης εγκεφαλοπάθειας σε ασθενείς που έλαβαν enzalutamide (βλ.επίσης παράγραφο 4.4).

Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια κλινικών μελετών παρατίθενται παρακάτω ανά κατηγορία συχνότητας εμφάνισης. Οι κατηγορίες συχνότητας εμφάνισης ορίζονται ως ακολούθως: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100), σπάνιες (≥ 1/10.000 έως < 1/1.000), πολύ σπάνιες (< 1/10.000), μη γνωστές (δεν υπάρχουν τα εκτιμήθηκαν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Εντός κάθε κατηγορίας συνηθίζεται εμφάνιση, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.

Πίνακας 1: Ανεπιθύμητες ενέργειες που αναγνωρίστηκαν σε ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές και μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου

Κατηγορία/οργανικό σύστημα σύμφωνα με το MedDRA	Ανεπιθύμητες ενέργειες και συχνότητα
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφοειδούς συστήματος	Όχι συχνές: λευκοπενία, ουδετεροπενία Μη γνωστές: θρομβοπενία
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος	Μη γνωστές: οίδημα προσώπου, οίδημα γλώσσας, οίδημα χείλους, οίδημα φάρυγγα
Ψυχιατρικές διαταραχές	Συχνές άγχος Όχι συχνές: οπτική ψευδαίσθηση
Διαταραχές του νευρικού συστήματος	Συχνές: κεφαλαλγία, επιπρεσμένη μνήμη, αμνησία, διαταραχή στην προσοχή, δυσουσία, συνδυασμό ανήσυχων ποδιών Όχι συχνές: νωτική διαταραχή, επιληπτικές κρίσεις* Μη γνωστές: σύνδρομο σπασμών αναρτήσιμης εγκεφαλοπάθειας
Καρδιακές διαταραχές	Συχνές: ισχαιμική καρδιακή νόσος* Μη γνωστές: παρατάση του διαστήματος QT (βλ. παραγράφους 4.4 και 4.5)
Αγγειακές διαταραχές	Πολύ συχνές: εξόφληση, υπέρταση
Διαταραχές του γαστρεντερικού	Μη γνωστές: ναυτία, έμετος, διάρροια
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού	Συχνές: ερυθρότητα, κνησμός Μη γνωστές: εξάνθημα
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	Πολύ συχνές: κατάπνοια* Μη γνωστές: μυαλγία, μυϊκοί σπασμοί, μυϊκή αδυναμία, οστεοαλγία
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος και του μαστού	Συχνές: γυναικομαστία
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης	Πολύ συχνές: εξάνθημα, κόπωση
Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές/θεραπευτικές παρενέργειες	Πολύ συχνές: πτώση

* Ανεπιθύμητες αναφορές από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου

Όπως αξιολογήθηκε από τυποποιημένα ερωτήματα MedDRA (SMQs) των «Σπασμών» συμπεριλαμβανομένων των σπασμών, σπασμών γενικευμένης επιληψίας, σύνθετων εστιακών επιληπτικών κρίσεων, εστιακών επιληπτικών κρίσεων και status epilepticus. Αυτό περιλαμβάνει σπάνιες περιπτώσεις επιληπτικών κρίσεων με επιπλοκές που οδηγούν σε θάνατο.
Όπως αξιολογήθηκε από τυποποιημένα ερωτήματα MedDRA (SMQs) «Εμφραγμα του μυοκαρδίου» και «Άλλη ισχαιμική καρδιακή νόσο», συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων προτιμωμένων όρων που παρατηρήθηκαν σε τουλάχιστον δύο ασθενείς σε τυχαίοποιημένες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες: φάση 3: στήθαγχη, στεφανιαίο νόσο, εμφραγμα του μυοκαρδίου, οξύ εμφραγμα του μυοκαρδίου, οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, ασταθής στήθαγχη, ισχαιμία του μυοκαρδίου και αρτηριοσκληρωτική στεφανιαία αρτηρία.
* Περιλαμβάνει οίδημα του προτιμωμένου όρους με τη λέξη «κάταγμα» στα οστά.

Παραγωγή ελεγχόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών

Επιληπτική κρίση

Στις ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, 24 (0,5%) από τους 4.403 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με ημερήσια δόση 160 mg enzalutamide εμφάνισαν επιληπτική κρίση, ενώ τέσσερις ασθενείς (0,2%) που έλαβαν εικονικό φάρμακο και ένας ασθενής (0,3%) που έλαβε βικαλουταμίδη εμφάνισαν επιληπτική κρίση. Η δόση φαίνεται να αποτελεί σημαντικό προγνωστικό παράγοντα του κινδύνου εμφάνισης επιληπτικής κρίσης, όπως αντικατοπτρίζεται από τα προκλινικά δεδομένα και από τα δεδομένα από μια μελέτη κλίμακωσης της δόσης. Στις ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, εξοδοντική ή εξοδοντική με προηγούμενη επιληπτική κρίση ή με παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση επιληπτικής κρίσης. Σε μια δοκιμή μονού σκέλους 9785-CL-0403 (UPWARD) για την αξιολόγηση της επίπτωσης των επιληπτικών κρίσεων σε ασθενείς με προδιαθεσικούς παράγοντες για εκδήλωση επιληπτικών κρίσεων (από τους οποίους 1,6% είχαν ιστορικό επιληπτικών κρίσεων), 8 από 366 (2,2%) ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με enzalutamide εμφάνισαν μια επιληπτική κρίση. Η διάρκεια διαρκείας της θεραπείας ήταν 9,3 μήνες.

Δεν είναι γνωστές ο μηχανισμός μέσω του οποίου η enzalutamide μπορεί να μειώσει τον αριθμό των επιληπτικών κρίσεων, αλλά θα μπορούσε να σχετιστεί με τα δεδομένα από in vitro μελέτες που δείχνουν ότι η enzalutamide και ο ενεργός μεταβολίτης της προσοδεύονται και μπορεί να αναστέλλουν τη δραστηριότητα των δακτύλων των ιόντων χλωρίου του GABA.

Ισχαιμική καρδιακή νόσος

Σε τυχαίοποιημένες κλινικές μελέτες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο, η ισχαιμική καρδιακή νόσος εμφανίστηκε στο 3,9% των ασθενών που έλαβαν enzalutamide και ADT συγκριτικά με 1,5% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο και ADT. Δεκαπέντε (0,4%) ασθενείς που έλαβαν enzalutamide και 2 (0,1%) ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο εμφάνισαν συμβάν ισχαιμικής καρδιακής νόσου που οδήγησε σε θάνατο.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών

Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση οδών κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιπλέον, η συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω:

Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χαλκιδάς, Αθήνα. Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστοσελίδα: <http://www.eof.gr>

Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία. Τηλ: +357 22606807, Φαξ: +357 22606869, Ιστοσελίδα: <http://www.moh.gov.cy/phs>

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Astellas Pharma Europe BV, Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden, Ολλανδία

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

EU/1/13/846/002 (40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία), EU/1/13/846/003 (80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία)

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΘΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 21 Ιουνίου 2013

Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 8 Φεβρουαρίου 2018

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΕΜΑΤΟΣ

24 Μαΐου 2022

Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: <http://www.ema.europa.eu>.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Ελλάδα*

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΜΕΤΕΩΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΟΠΤΑ
40mg/TAB	Κουτί X 112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	€ 2.287,04	€ 2.763,69

Κύπρος*

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΜΕΤΕΩΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΟΠΤΑ
40mg/TAB	Κουτί X 112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	€ 3.009,25

*Κυκλοφορούν μόνο τα 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Astellas Pharmaceuticals A. E. E. B.
Αγνών 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα.
Τηλ. 210 8189900, Φαξ 216 8008 998
www.astellas.gr

Τοπικός Αντιπρόσωπος/
Διανομέας προϊόντων Astellas στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Σύγχρονες Μοριακές Εξελίξεις

Νέα Φάρμακα - Νέες Θεραπείες

11-13 Μαΐου 2023

Crowne Plaza | ΑΘΗΝΑ

Χορηγοί

AMGEN®

astellas

AstraZeneca

Bristol Myers Squibb™

DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

GENESIS
pharma

GILEAD

Oncology

GSK

IPSEN | ONCOLOGY
Innovation for patient care

janssen Oncology
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF Johnson & Johnson

LEO

Lilly
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

MERCK

MSD
INVENTING FOR LIFE

Pfizer
Oncology

Pierre Fabre
FARMAKA S.A.

Roche

SANDOZ A Novartis
Division

sanofi

theraCell
Laboratories

WinMedica
Serving Health for Life



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Σύγχρονες Μοριακές Εξελίξεις Νέα Φάρμακα - Νέες Θεραπείες

Γραμματεία: E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.

Ελ. Βενιζέλου 154 • 171 22 Ν. Σμύρνη • Τηλ.: 210-98 80 032, Fax: 210-98 81 303

E-mail: ets@otenet.gr, ets@events.gr • Website: www.events.gr