

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ  
(ΕΛ.Ο.Ε.Π.)

# Ιχνηλατώντας τις εξελίξεις της Ογκολογίας

Θα  
16 χορηγηθούν  
Μόρια  
Συνεχιζόμενης  
Ιατρικής  
Εκπαίδευσης  
(CME-CPD)

**10-11**

**Μαΐου 2024**

Larissa Imperial, Λάρισα

## Επιστημονικό Πρόγραμμα

# Υπερβαίνοντας τον Φόβο του Τρυπήματος



PELGRAZ ACC 02\_12/2021

**W**  
**M** **WinMedica**  
Serving Health for Life


Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας  
Accord Healthcare S.L.U.

**accord**  
The Evolution of Generics

Η σύντομη ΠΧΠ του προϊόντος δημοσιεύεται σε άλλη σελίδα του εντύπου.  
Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ από την Win Medica A.E. κατόπιν αιτήσεως.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε  
στην εταιρεία: WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.  
Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35  
15238 Χαλάνδρι  
Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827  
info@winmedica.gr, [www.winmedica.gr](http://www.winmedica.gr)

Βοηθήστε να γίνουν τα  
φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες  
ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την  
«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Orlik G, Vishal V, Cornilewski-Matracka J. Poster Board 071: Can Fear Of Injection Be Managed By Autoinjectors? Internet: Scisearch  
Healthcare Professionals About Neutropenic Patients. European Journal of Oncology Pharmacy. October 2018; Vol. 1 Issue 5: P14-65.



## Επιτροπές \_

### ∞ Οργανωτική Επιτροπή

#### Πρόεδροι:

Λαμπροδήμου Γεωργία, Μαραγκούλη Ελένη

#### Μέλη:

Αρδαβάνης Αλέξανδρος, Μιχαηλίδης Πρόδρομος, Παπατσιμπας Γεώργιος,  
Σιαγκούλη Μαρία, Ριζούλη Βασιλική, Ρούσος Γεώργιος

### ∞ Επιστημονική Επιτροπή

**Πρόεδροι:** Λαμπροδήμου Γεωργία, Μαραγκούλη Ελένη

#### Μέλη:

Αναστασίου Δημήτριος  
Ανδρεάδου Άννα  
Αντωνίου Σωτήριος  
Αργυράκη Αικατερίνη  
Αστάρας Χριστόφορος  
Βαλοτάσιου Βαρβάρα  
Βαλούκας Δημήτριος  
Βλαχοστέργιος Παναγιώτης  
Βούλγαρης Ευάγγελος  
Γαλανούλης Κωνσταντίνος  
Γεωργιάδου Σάρα  
Γιδαροκώστα Πολυξένη  
Γκαμπράνης Ιωάννης  
Γκανάτης Ιωάννης  
Γκιουλμπασάνης Ιωάννης  
Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος  
Ευθυμίου Ματθαίος  
Ζαβός Απόστολος  
Ζαΐρη Ελένη  
Ζαφειρίου Ευτέρπη  
Ζαχαρούλης Δημήτριος  
Ζάχος Ιωάννης  
Ζάχου Καλλιόπη  
Ζήσης Χρήστος  
Θεοχάρη Μαρία  
Καλαθάς Θεόδωρος  
Καλογερίδη Μαρία Αγγελική  
Καναβού Δώρα  
Καναρά Μαρία  
Κάπου Θεοδώρα  
Καρακούσης Κωνσταντίνος  
Κεσίσης Γεώργιος  
Κόκκαλης Λέξανδρος

Κοντοβίνης Λουκάς  
Κοραντζής Ιπποκράτης  
Κορογιάννος Αθανάσιος  
Κοσμά Αικατερίνη  
Κοσμάς Χρήστος  
Κόσσυβα Αικατερίνη  
Κουκούλης Γεώργιος  
Κραβαρίτης Ιωάννης  
Κράτης Κωνσταντίνος  
Κύργιας Γεώργιος  
Κωστούρος Ευθύμιος  
Κωτσάκης Αθανάσιος  
Λαζαρίδης Γεώργιος  
Λάλλας Κωνσταντίνος  
Λαμπροδήμου Γεωργία  
Λιανός Ευάγγελος  
Λίτος Ιωάννης  
Λόγα Κωνσταντίνα  
Μαραγκούλη Ελένη  
Μάρκου Αλεξάνδρα  
Ματθαίος Δημήτριος  
Μιχαηλίδης Πρόδρομος  
Μούντζιος Ιωάννης  
Μπακάλης Αθανάσιος  
Μπόκας Αλέξανδρος  
Μπόνιου Κωνσταντίνα  
Μπουρδάκης Αδαμάντιος  
Μπουρνάκης Ευάγγελος  
Μπούτης Αναστάσιος  
Μυλωνάς Στέφανος  
Νάση Δέσποινα  
Νικολάου Μιχαήλ  
Παπαγόρας Δημήτριος

Παπαδόπουλος Βασίλειος  
Παπακοτούλας Παύλος  
Παπανδρέου Χρήστος  
Παπατσιμπας Γεώργιος  
Πασά Αικατερίνη  
Περδικούρη Ελένη-Ισιδώρα  
Ποιμενίδης Ευστάθιος  
Πουλτσίδα Αντιγόνη  
Ρήγας Γεώργιος  
Ρουπακιά Αλεξάνδρα  
Ρούσος Γεώργιος  
Σαλούστρος Εμμανουήλ  
Σαμαράς Ιωάννης  
Σγάντζου Ιωάννα  
Σιαγκούλη Μαίρη  
Σκριάπας Κωνσταντίνος  
Σόγκα Ελένη  
Σοϊλεμέζη Ελισάβετ  
Στέφος Άγγελος  
Στυλοπούλου Μαρία Ρίτα  
Σωτηριάδου Κωνσταντινί  
Τεπετές Κωνσταντίνος  
Τζωρτζής Βασίλειος  
Τιμοθεάδου Ελένη  
Τόλια Μαρία  
Τσαγκούλη Σοφία  
Τσαουσής Γεώργιος  
Τσιμπόλη Άννα  
Φεργάνης Ευάγγελος-Γεώργιος  
Φωταρέλλη Αγγελική  
Χατζημιχαήλ Μαρία



# Ogivri<sup>®</sup>

## (trastuzumab)

### Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία.

Λ.Τ. σύμφωνα με το Δ.Τ. 12/2023\*

**OGIVRI 150MG BTx1VIAL: 322,59 €**

**OGIVRI 420MG BTx1VIAL: 995,36 €**

\*Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου δελτίου τιμών, θα ισχύουν οι νεότερες τιμές.



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σαρώνοντας τον QR κωδικό.

**Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:**  
BIOSIMILAR COLLABORATIONS  
IRELAND LIMITED, IRELAND  
Unit 35/36, Grange Parade, Baldoyle  
Industrial Estate, Dublin 13, Ireland D13  
R20R

**Τοπ. Αντιπρ. Ελλάδα:**  
BIOCON BIOLOGICS GREECE  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., ΕΛΛΑΔΑ  
Λεωφόρος Κηφισίας 280, 15232 Χαλάνδρι,  
Αθήνα, Ελλάδα.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Ανοφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Πρωτεύεται από την εταιρεία:

**DEMO** ΑΒΕΕ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21<sup>ο</sup> χλμ Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας, Κρυονέρι 145 68, Αττική  
t +30 210 81 61 802, f +30 210 81 61 587, info@demo.gr  
[www.demo.gr](http://www.demo.gr)



Πρόγραμμα \_

Παρασκευή 10 / 05 / 2024

|                                                     |                                                                                                        |                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 10:00-10:30                                         | Προσέλευση - Εγγραφές                                                                                  |                   |
| 10:30-12:00                                         | Στρογγυλό Τραπέζι: Υποστηρικτική Αγωγή I                                                               |                   |
| Προεδρείο: Π. Μιχαηλίδης, Α. Μπουρδάκης, Γ. Ρούσσος |                                                                                                        |                   |
| 10:30-10:50                                         | Οδοντιατρική φροντίδα ογκολογικών ασθενών                                                              | Αικ. Πασσά        |
| 10:50-11:10                                         | Νεότερα δεδομένα πρόληψης και αντιμετώπισης θρομβοεμβολικών επεισοδίων σε ασθενείς με κακοήγη νοσήματα | Χ. Ζήσης          |
| 11:10-11:30                                         | Διατροφή                                                                                               | Ι. Γκιουλμπασάνης |
| 11:30-11:50                                         | Πόνος: Είδη, κλίμακα αντιμετώπισης                                                                     | Μ. Χατζημιχαήλ    |
| 11:50-12:10                                         | Εμβόλια - Πότε και σε ποιους                                                                           | Α. Στέφος         |

12:10-12:40 Διάλειμμα καφέ

|                                                |                                              |                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| 12:40 -14:10                                   | Στρογγυλό Τραπέζι: Υποστηρικτική Αγωγή II    |                          |
| Προεδρείο: Θ. Κάπου, Κ. Καρακούσης, Σ. Μυλωνάς |                                              |                          |
| 12:40-13:00                                    | Αντιμετώπιση τοξικότητας ανοσοθεραπείας      | Α. Κόκκαλης              |
| 13:00-13:20                                    | Αντιμετώπιση επιπλοκών ακτινοθεραπείας       | Μ.Α. Καλογερίδη          |
| 13:20-13:40                                    | Λοιμώξεις σε ογκολογικούς ασθενείς           | Σ. Γεωργιάδου            |
| 13:40-14:00                                    | Σύγχρονη διαχείριση εμπύρετου ουδετεροπενίας | Αικ. Αργυράκη            |
| 14:00-14:10                                    | Σχολιασμός                                   | Ι. Γκαμπράνης, Κ. Κράτης |

14:10-15:30 Μεσημβρινή διακοπή / Γεύμα

# Με το **Arvekap®** μπορείς να αλλάξεις θέμα συζήτησης

 **Arvekap® 22.5mg**  
triptorelin



Έχεις τον **ΕΛΕΓΧΟ**  
του καρκίνου  
του προστάτη



**ΜΙΛΗΣΕ** για όσα  
έχουν αξία  
για τον άνδρα

## **Arvekap®: Προσφέρει τη δυνατότητα υποστήριξης και άλλων αναγκών του άνδρα.\***

Οι περιεκτικότητες 1, 3 και 6 μηνών του Arvekap® ήταν καλά ανεκτές<sup>1-7</sup> και μείωσαν σημαντικά τα συμπτώματα από το Κατώτερο Ουροποιητικό Σύστημα (LUTS) σε διάστημα 48 εβδομάδων.<sup>8</sup>

Η 6μηνη μορφή του Arvekap®, ανταποκρίνεται στη συχνότητα των ενέσεων που προτιμούν οι άνδρες με καρκίνο του προστάτη.<sup>9</sup>

\*Η μείωση του αριθμού των ενέσεων λόγω της πιλοποίησης στην 6μηνη μορφή του Arvekap από σκεύασμα αγωνιστή LHRH μηνιαίας ή 3μηνιαίας διάρκειας, οδήγησε σε εξοικονόμηση χρόνου αντίστοιχου με 35,1 λεπτά ανά ασθενή (n=41).<sup>3</sup>

1. Heyns C, Simonin M, Groscurin P, et al. BJU Int. 2003;92(3):226-231. 2. Teillac P, Heyns C, Kaisary A, et al. Horm Res. 2004;62(5):252-258. 3. Lundström EA, Rencken RK, van Wyk JH, et al. Clin Drug Investig. 2009;29(12):757-765. 4. Arvekap® 22.5 mg. Summary of product characteristics, IPSEN MON. ΕΠΕ. 5. Arvekap® 3.75 mg Summary of product characteristics, IPSEN MON. ΕΠΕ. 6. Arvekap® 11.25 mg Summary of product characteristics, IPSEN MON. ΕΠΕ. 7. Merseburger AS, Hupe MC. Adv Ther. 2016;33(7):1072-1093. 8. Gil T, Aoun F, Cabri P, et al. Ther Adv Urol. 2015;7(3):116-124. 9. Schulman C. BJU Int. 2007;100(Suppl. 1):6-11.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που βρίσκεται σε επόμενες σελίδες.  
• Τ.Π.: 422,24 € • Λ.Τ.: 495,17 € • Δ.Τ.Φ.: 31/12/2023

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

### IPSEN MON.ΕΠΕ

Αγ. Δημητρίου 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ  
Τηλέφωνο: 210 98 43 324, 210 98 58 930 & 210 98 58 940  
Φαξ: 210 98 87 911  
E-mail: [ipsenepe@ipsen.com](mailto:ipsenepe@ipsen.com)  
<http://www.ipsen.gr>

 **IPSEN**  
Innovation for patient care



Παρασκευή 10 / 05 / 2024

15:30-16:40

**Στρογγυλό Τραπέζι:** Νεότερες εξελίξεις στους καρκίνους του ανώτερου ΓΕΣ

Προεδρείο: **Μ. Ευθυμίου, Α. Κωτσάκης, Μ. Σιαγκούλη**

15:30-15:50

Η συμβολή της απεικόνισης στη διάγνωση και σταδιοποίηση των νεοπλασμάτων παγκρέατος

**Ι. Σγάντζου**

15:50-16:10

Χειρουργική αντιμετώπιση νεοπλασμάτων παγκρέατος - χοληφόρων

**Δ. Ζαχαρούλης**

16:10-16:30

Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση της μεταστατικής νόσου παγκρέατος - χοληφόρων

**Ε. Σόγκα**

16:30-16:40

Σχολιασμός

**Α. Μάρκου, Ι. Γκανάπης**

16:40-17:00

**Διάλεξη**

Προεδρείο: **Κ. Ζάχου**

Θεραπευτικός αλγόριθμος ηπατοκυτταρικού καρκινώματος

**Ι. Λίτος**

17:00-17:20

**Διάλειμμα καφέ**

17:20-18:40

**Στρογγυλό Τραπέζι:** Νεότερες εξελίξεις στον καρκίνο του κατώτερου ΓΕΣ

Προεδρείο: **Δ. Παπαγόρας, Κ. Τεπετές, Γ. Τσιαούσης**

17:20-17:40

Επιλογή ακτινοθεραπείας στον καρκίνο του ορθού

**Μ. Τόλια**

17:40-18:00

Μοριακές υπογραφές και κλινικές εφαρμογές

**Μ. Θεοχάρη**

18:00-18:20

Βέλτιστη αντιμετώπιση ολιγομεταστατικής νόσου

**Γ.Κουκούλης**

18:20-18:40

Σχολιασμός

**Ε. Μαραγκούλη, Α. Ρουπακιά**

# Fentanyl/Sandoz

## Fentanyl citrate



Το μέγεθος των δισκίων που απεικονίζονται δεν είναι πραγματικό.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ειδική ιατρική συνταγή του Ν 3459/06 περί ναρκωτικών (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ).

FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 100MCG/TAB BTx30x1 Λ.Τ.: 94,64 €, FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 200MCG/TAB BTx30x1 Λ.Τ.: 99,70 €, FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 300MCG/TAB BTx30x1 Λ.Τ.: 110,97 €, FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 400MCG/TAB BTx30x1 Λ.Τ.: 110,97 €



Για συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάροντας το QR code. Η έντυπη μορφή της Περιλήψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος είναι επίσης διαθέσιμη από την εταιρεία Lavipharm Hellas A.E., τηλ.: 210 6691 000, e-mail: SafetyGreece@lavipharm.com

FENT/SAND/LAV/01.2024

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

### ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Lavipharm Hellas A.E.  
Οδός Αγίας Μαρίνας, 190 02 Παιανία Αττικής  
Τηλ.: 210 6691 000

**SANDOZ** A Novartis  
Division

**ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ**  
Sandoz Pharmaceuticals d.d., Veronškova  
ulica 57, SI-1000 Ljubljana, Σλοβενία.

### ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Novartis (Hellas) A.E.B.E.  
12ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας,  
14451 Μεταμόρφωση Αττικής  
Τηλ.: 210 28 11 712



Lavipharm

ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ, 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 6691 000, [www.lavipharm.com](http://www.lavipharm.com)



Παρασκευή 10 / 05 / 2024

18:40-19:00

Διάλεξη

Προεδρείο: Π. Παπακοτούλας

Μικροβίωμα

Α. Μπόκας

19:00-20:30

Στρογγυλό Τραπέζι: Καρκίνος πνεύμονα

Προεδρείο: Γ. Κύργιας, Γ. Λαζαρίδης

19:00-19:20

Νεότερα δεδομένα στην εισαγωγική θεραπεία του ΜΜΚΠ

Σ. Τσαγκούλη

19:20-19:40

Μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα. Υπάρχει πρόοδος;

Ε. Φεργάδης

19:40-20:00

Θεραπευτικός αλγόριθμος ασθενών με EGFR μεταλλάξεις

Ι. Μούντζιος

20:00-20:20

Στόχευση σπανιότερων μεταλλάξεων στον ΜΜΚΠ

Ι. Κοραντζής

20:20-20:30

Σχολιασμός

Ε. Ζαΐρη, Ι. Σαμαράς

20:30-20:40


Τελετή έναρξης - Χαιρετισμοί

20:40-21:10

Εναρκτήρια ομιλία

Ιστορία της Λάρισας

Αικ. Κόσσυβα



From transformative medicines  
that take on the toughest challenges,  
to biosimilar and supportive care  
outcome-enabling solutions we're

## ADVANCING ALL ANGLES OF CARE

**AMGEN®**

Oncology

GRC-NP-1123-80011

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα  
συμπληρώνοντας την "ΚΥΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα  
αναφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενέργειων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων  
(ΕΟΦ) Τηλ: 2102040380, Fax: 2105540585, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας διαβίβαση  
και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ: [www.eof.gr](http://www.eof.gr) για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή  
εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 2103447000.

**AMGEN HELLAS ΕΠΕ**

Αγ. Κωνσταντίνου 59-61

Green Plaza, κτίριο Γ, 15 124 Μαρούσι

Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050

Email: [info@amgen.gr](mailto:info@amgen.gr), [www.amgen.gr](http://www.amgen.gr)



Σάββατο 11 / 05 / 2024

09:30-10:40

**Στρογγυλό Τραπέζι:** Νεότερες εξελίξεις στον γυναικολογικό καρκίνο

Προεδρείο: Γ. Ρήγας, Ε. Τιμοθεάδου

09:30-09:50

Καρκίνος τραχήλου μήτρας - Μεταστατικής νόσος

Ε. Λιανός

09:50-10:10

Καρκίνος ενδομητρίου - αλγόριθμός θεραπείας

Κ. Λόγα

10:10-10:30

Καρκίνος ωοθηκών - ο ρόλος των PARP αναστολέων

Β. Παπαδόπουλος

10:30-10:40

Σχολιασμός

Δ. Βαλούκας, Ε. Βούλγαρης

10:40-12:10

**Στρογγυλό τραπέζι:** Καρκίνος νεφρού ουροδόχου κύστης

Προεδρείο: Χ. Κοσμάς, Κ. Σκριάπας

10:40-11:00

Νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις  
στον μεταστατικό ουροθηλιακό καρκίνο

Σ. Αντωνίου

11:00-11:20

Μη μυοδιηθητικός ουροθηλιακός καρκίνος - Αντιμετώπιση

Ι. Ζάχος

11:20-11:40

Καρκίνος νεφρού - Νεότερα δεδομένα στη μεταστατική νόσο

Ε. Κωστούρος

11:40-12:00

Καρκίνος νεφρού - Επικουρική θεραπεία

Λ. Κοντοβίνης

12:00-12:10

Σχολιασμός

Κ. Γαλανούλης, Ι. Κραβαρίτης, Δ. Νάση

12:10-12:40

**Δορυφορική Διάλεξη**

sponsored by IPSEN ONCOLOGY

Προεδρείο: Ε. Κωστούρος

Καρκίνος νεφρού: Εστιάζοντας στον βέλτιστο θεραπευτικό αλγόριθμο  
των συστηματικών θεραπειών προς όφελος των ασθενών

Γ. Λαζαρίδης

12:40-13:00

**Διάλειμμα καφέ**

13:00-13:30

**Δορυφορική Διάλεξη**

sponsored by AstraZeneca

Προεδρείο: Δ. Ματθαίος

Ο συνδυασμός των PARP αναστολέων με τους νεότερους  
ορμονικούς παράγοντες για την αντιμετώπιση του mCRPC

Π. Βλαχοστέργιος



**OPDIVO**® + **YERVOY**®  
(nivolumab) (ipilimumab)

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που διατίθεται από τον ΚΑΤΟΧΟ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ κατόπιν αιτήσεως

 **Bristol Myers Squibb**™

Bristol-Myers Squibb A.E.  
Αττικής 49-53 & Προποντιδός 2, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική  
ΤΘ 63883 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική  
Τηλ 210 6074300 & 210 6074400, Φαξ 210 6074333  
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"**



Σάββατο 11 / 05 / 2024

13:30-15:00

Στρογγυλό Τραπέζι: Καρκίνος προστάτη

Προεδρείο: **Β. Βαλοτάσιου, Χ. Παπανδρέου, Β. Τζώρτζης**

13:30-13:50

Πρώτος καρκίνος προστάτη - Βιοχημική υποτροπή

**Ε. Ι. Περδικούρη**

13:50-14:10

Ορμονοευαίσθητος μεταστατικός καρκίνος προστάτη

**Δ. Νάση**

14:10-14:30

Ρόλος PET PSMA στη διάγνωση και θεραπευτική προσέγγιση

**Θ. Καλαθάς**

14:30-14:50

Θεραπευτική χρήση LUTETIUM

**Ε. Μπουρνάκης**

14:50-15:00

Σχολιασμός

**Δ. Αναστασίου, Κ. Δημητρόπουλος, Ε. Κωστούρος**

15:00-16:00

Μεσημβρινή διακοπή / Γεύμα

16:00-17:40

Στρογγυλό Τραπέζι: Καρκίνος δέρματος

Προεδρείο: **Ε. Ζαφειρίου, Μ. Νικολάου**

16:00-16:20

Διάγνωση - Παρακολούθηση ομάδων υψηλού κινδύνου

**Α. Τσιμπόλη**

16:20-16:40

Συστηματική αντιμετώπιση μη μελανοκυτταρικών όγκων δέρματος

**Χ. Αστάρης**

sponsored by 

16:40-17:10

Νεότερες εξελίξεις στην ανοσοθεραπεία - Μελάνωμα

**Κ. Λάλλας**

17:10-17:30

Επικουρική θεραπεία B-RAF μελανώματος - στόχευση ή ανοσοθεραπεία

**Α. Κορογιάννος**

17:30-17:40

Σχολιασμός

**Π. Γιδαροκώστα, Αικ. Κοσμά**

17:40-18:00

Διάλειμμα καφέ



# Lynparza®

## olaparib

tablets 100 mg & 150 mg



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος στο ακόλουθο Link:  
[https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/lynparza-epar-product-information\\_el.pdf](https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/lynparza-epar-product-information_el.pdf)

LYNPARZA F.C.TAB 100MG/TAB BTx56  
σε Alu/Alu Blister: 2.152,23€ (X.T.), 2.349,81€ (Λ.Τ.), 1.935,10€ (Ν.Τ.)  
LYNPARZA F.C.TAB 150MG/TAB BTx56  
σε Alu/Alu Blister: 2.295,78€ (X.T.) 2.500,44€ (Λ.Τ.) 2.064,17€ (Ν.Τ.)

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:  
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ  
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ



Υπεύθυνος συν-προώθησης:  
MSD ΑΦΒΕΕ  
Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος 17456, Αττική  
Αρ. ΓΕΜΗ 121808101000



Τοπικός Αντιπρόσωπος του ΚΑΚ:  
AstraZeneca A.E.  
Αγισσιάνου 6-8, 151 23, Μαρούσι, Αθήνα  
Τηλ: 2106871500  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 000638901000, [www.astrazeneca.gr](http://www.astrazeneca.gr)

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή  
και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες  
ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα.  
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

LYN/00117/1/0324



Σάββατο 11 / 05 / 2024

18:00-19:30

Στρογγυλό Τραπέζι: Καρκίνος μαστού I

Προεδρείο: Μ. Καναρά, Α. Μπούτης, Α. Πουλτσίδη

18:00-18:20

Προσυμπτωματικός έλεγχος - με ποια μέθοδο και σε ποιες ομάδες ασθενών

Δ. Καναβού

18:20-18:40

Διαχείριση μασχάλης- με τη ματιά του χειρουργού

Μ. Στυλοπούλου

18:40-19:00

Ακτινοθεραπεία στον πρώιμο Κ. Μ.  
Πότε το λιγότερο είναι καλύτερο;

Κ. Μπόνιου

19:00-19:20

Φλεγμονώδης καρκίνος μαστού-προκλήσεις και νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις

Γ. Κεσίσης

19:20-19:30

Σχολιασμός

Ε. Σοϊλεμέζη, Κ. Σωτηριάδου

19:30-21:00

Στρογγυλό Τραπέζι: Καρκίνος μαστού II

Προεδρείο: Α. Ζαβός, Γ. Παπασιόμπας

19:30-19:50

Εισαγωγική θεραπεία

Ε. Σαλούστρος

19:50-20:10

Επικουρική θεραπεία μετά από εισαγωγική

Α. Φωταρέλλη

20:10-20:30

Ρόλος των συζευγμένων αντισωμάτων στον μεταστατικό Κ.Μ

Ε. Ποιμενίδης

20:30-20:50

Βιοδείκτες ανταπόκρισης ή αντίστασης στην ER+ νόσο.  
Επιπτώσεις στη θεραπευτική προσέγγιση

Α. Ανδρεάδου

20:50-21:00

Σχολιασμός

Γ. Λαμπροδήμου, Α. Μπακάλης

21:00

Συμπεράσματα / Λήξη



# PADCEV™

## enfortumab vedotin

Injection for IV infusion 20 mg & 30 mg vials



▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέπει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.



**Astellas Pharmaceuticals A. E. B. E.**  
Αιγυπιάου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα.  
Τηλ. 210 8189 900, Fax: 216 8008 998  
[www.astellas.com/gr](http://www.astellas.com/gr)

Τοπικός Αντιπρόσωπος/ Διανομέας  
προϊόντων Astellas στην Κύπρο:  
Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Για περαιτέρω πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΠΧΠ που διατίθεται από την  
Astellas Pharmaceuticals AEBE, κατόπιν αιτήσεως.

|                                                                                             | Νοσοκομειακή<br>Τιμή | Χονδρική<br>Τιμή | Λιανική Τιμή<br>με ΦΠΑ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------|
| PADCEV ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΠΥΚΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ<br>ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ<br>20MG/VIAL 1 VIAL | 569,77€              | 633,71€          | 718,75€                |
| PADCEV ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΠΥΚΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ<br>ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ<br>30MG/VIAL 1 VIAL | 854,65€              | 950,55€          | 1063,00€               |

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ  
ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

MAT-GR-PAD-2022-00010 & PAD/ADV2/1.2023



## Ομιλητές - Πρόεδροι \_

|                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Αναστασίου Δημήτριος</b>       | Ουρολόγος, Λάρισα                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ανδρεάδου Άννα</b>             | Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Γ΄ Ογκολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»                                                                                                                                              |
| <b>Αντωνίου Σωτήριος</b>          | Ειδικευόμενος Ιατρός Εσωτερικής Παθολογίας                                                                                                                                                                                  |
| <b>Αργυράκη Αικατερίνη</b>        | Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Παθολογικής Κλινικής ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», Γενική Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων                                                                                   |
| <b>Αστάρας Χριστόφορος</b>        | MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Α΄ Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας                                                                                                                                 |
| <b>Βαλοτάσιου Βαρβάρα</b>         | Επίκουρη Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής Παν/μίου Θεσσαλίας, Π.Γ.Ν. Λάρισας                                                                                                                                   |
| <b>Βαλούκας Δημήτριος</b>         | Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α΄, Κλινική Παθολογικής Ογκολογία, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»                                                                                                                                    |
| <b>Βλαχοστέργιος Παναγιώτης</b>   | MD, PhD, Επ. Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Cornell, ΗΠΑ, Συνεργάτης, Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Επιστημονικός Συνεργάτης, Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»  |
| <b>Βούλγαρης Ευάγγελος</b>        | MD, PhD, Στρατιωτικός Ιατρός, Παθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογικό Ιατρείο, 404 Γ.Σ.Ν., Λάρισα                                                                                                                                   |
| <b>Γαλανούλης Κωνσταντίνος</b>    | Ουρολόγος, Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο»                                                                                                                                                                    |
| <b>Γεωργιάδου Σάρα</b>            | Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για τα Αυτοάνοσα Νοσήματα του Ήπατος, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας |
| <b>Γιδαροκώστα Πολυξένη</b>       | Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας                                                                                                                         |
| <b>Γκαμπράνης Ιωάννης</b>         | Διευθυντής Παθολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας                                                                                                                                                                             |
| <b>Γκανάπης Ιωάννης</b>           | Χειρουργός, Νοσοκομείο Καρδίτσας                                                                                                                                                                                            |
| <b>Γκιουλμπασάνης Ιωάννης</b>     | MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος                                                                                                                                                                                                |
| <b>Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος</b> | Consultant Urological and Robotic Surgeon, Department of Urology, Aberdeen Royal Infirmary, NHS Grampian, Scotland, UK                                                                                                      |
| <b>Ευθυμίου Ματθαίος</b>          | Χειρουργός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο»                                                                                                                                                |
| <b>Ζαβός Απόστολος</b>            | MD, PhD, Γυναικολόγος Χειρουργός μαστού, Εκπρόσωπος Ελλάδας στην UEMS, Εντεταλμένος διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας                                                                                                     |
| <b>Ζαΐρη Ελένη</b>                | Παθολόγος Ογκολόγος, Κλινική «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη                                                                                                                                                                    |

# Vegzelma™ ▼

## bevacizumab

# Το ταξίδι της ζωής συνεχίζεται

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περιήληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από τον Κ.Α.Κ.

**ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:** Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από ιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία

▼ Αυτό το φάρμακο τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών

**Λιανική τιμή:**

VEGZELMA C/S.SOL.IN 25MG/ML BT X 1 VIAL X 16ML / Λ.Τ.: 610,06 €

VEGZELMA C/S.SOL.IN 25MG/ML BT X 1 VIAL X 4ML / Λ.Τ.: 173,12 €



BIANEX A.E. - Έδρα: Οδός Βαρυμύμνης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά,  
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία, Τηλ.: 210 8009111 • Fax: 210 8071573  
E-mail: [mailbox@vianex.gr](mailto:mailbox@vianex.gr) • WEBSITE: [www.vianex.gr](http://www.vianex.gr) • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113,  
562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης • Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000



Παραίτηση να γίνουν τα φάρμακα που παρήγαγε και  
διανέμει  
ΟΠΕΕ τις κατασκευασμένες ενέσεις που  
έλα τα φάρμακα  
Συμπληρώστετες τηγ. «61771004 KAP73»



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ζαφειρίου Ευτέρπη</b>         | Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δερματολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας                                                                                                                  |
| <b>Ζαχαρούλης Δημήτριος</b>      | Καθηγητής Χειρουργικής Παν/μίου Θεσσαλίας                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ζάχος Ιωάννης</b>             | Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας, Λάρισα                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ζάχου Καλλιόπη</b>            | Αν. Καθηγήτρια Παθολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για τα Αυτοάνοσα Νοσήματα Ήπατος, Πλήρες Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου ERN-RARE LIVER, Π.Γ.Ν. Λάρισας |
| <b>Ζήσης Χρήστος</b>             | Παθολόγος Διευθυντής στη Μεσογειακή αναιμία στο Γ.Ν. Τρικάλων                                                                                                                                                                                         |
| <b>Θεοχάρη Μαρία</b>             | Παθολόγος - Ογκολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»                                                                                                                                                               |
| <b>Καλαθάς Θεόδωρος</b>          | MD, MSc, Πυρηνικός Ιατρός, Επιμ. Α΄, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»                                                                                                                                                                     |
| <b>Καλογερίδη Μαρία Αγγελική</b> | Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος MD, MSc, PhD, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»                                                                                                                                                                       |
| <b>Καναβού Δώρα</b>              | MD, PhD, European Board of Breast Imaging (EBBI), Ειδική Ακτινολόγος Μαστού, Διαγνωστική Μαστού, Λάρισα                                                                                                                                               |
| <b>Καναρά Μαρία</b>              | Χειρουργός Μαστού, Νοσοκομείο Τρικάλων                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Κάπου Θεοδώρα</b>             | Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Λαμίας                                                                                                                                                                                    |
| <b>Καρακούσης Κωνσταντίνος</b>   | Διευθυντής Παθολογικής - Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, Γ.Ν. Λάρισας                                                                                                                                                                                  |
| <b>Κεσίσης Γεώργιος</b>          | Παθολόγος-Ογκολόγος, Κλινική «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη                                                                                                                                                                                              |
| <b>Κόκκαλης Λέξανδρος</b>        | Παθολόγος Ογκολόγος, MSc, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας                                                                                                                                                                                    |
| <b>Κοντοβίνης Λουκάς</b>         | Παθολόγος Ογκολόγος, ONCOMEDICARE, Θεσσαλονίκη                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Κοραντζής Ιπποκράτης</b>      | Παθολόγος Ογκολόγος, Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη                                                                                                                                                                                                |
| <b>Κορογιάννος Αθανάσιος</b>     | Παθολόγος Ογκολόγος, «Mediterraneo Hospital»                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Κοσμά Αικατερίνη</b>          | Ειδικευόμενη Ογκολογίας                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Κοσμάς Χρήστος</b>            | Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής & Επιστημονικά Υπεύθυνος, Παθολογικό-Ογκολογικό Τμήμα & Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»                                                                                                |
| <b>Κόσσυβα Αικατερίνη</b>        | Φιλόλογος, Αντιπρόεδρος Δημοτικής Πινακοθήκης Μουσείου Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ                                                                                                                                                                                  |
| <b>Κουκούλης Γεώργιος</b>        | Χειρουργός, Επιμελητής β΄, Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Λάρισας                                                                                                                                                                                          |
| <b>Κραβαρίτης Ιωάννης</b>        | Διευθυντής Ουρολογικής, Γ.Ν. Τρικάλων                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Κράπης Κωνσταντίνος</b>       | Παθολόγος, Διευθυντής, Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας                                                                                                                                                                                  |

Το **Jemperli** ενδείκνυται:

- ▶ σε συνδυασμό με καρβοπλατίνη και πακλιταξέλη για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με πρωτοπαθή προχωρημένο ή υποτροπιάζοντα καρκίνο του ενδομητρίου (ΚΕ) με ανεπαρκή επιδιόρθωση αναντιστοιχιών (dMMR)/ υψηλού βαθμού μικροδορυφορική αστάθεια MSI-H, οι οποίες είναι υποψήφιες για συστηματική θεραπεία.<sup>1</sup>
- ▶ και ως μονοθεραπεία ενήλικων ασθενών με υποτροπιάζοντα ή προχωρημένο ΚΕ με dMMR/MSI H, ο οποίος έχει παρουσιάσει εξέλιξη κατά τη διάρκεια προηγούμενης θεραπείας με πλατινούχο σχήμα ή μετά από αυτή.<sup>1</sup>



**JEMPERLI:** Α.Τ. 6.011,33€, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%, κατόπιν ένταξης του προϊόντος στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία. Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση: Ένα φιαλίδιο πυκνού διαλύματος για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση των 10 ml περιέχει 500 mg dostarlimab.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης της καταχώρησης.

**Βιβλιογραφία:** 1. Jemperli Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος. Δεκέμβριος 2023

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρους ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100. Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρετε το QR code. Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK. ©2024 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούπαρχος του Ομίλου GSK.





**Κύργιας Γεώργιος**

Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

**Κωστούρος Ευθύμιος**

Παθολόγος Ογκολόγος, Γ' Παθολογική Κλινική-Ογκολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

**Κωτσάκης Αθανάσιος**

Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

**Λαζαρίδης Γεώργιος**

Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Πανεπιστημιακή Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας, Α.Π.Θ, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

**Λάλλας Κωνσταντίνος**

MD, MSc, Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, «Παπαγεωργίου», Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ.

**Λαμπροδήμου Γεωργία**

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο-Τριανταφύλλειο»

**Λιανός Ευάγγελος**

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α' Παθολογικού-Ογκολογικού Τμήματος, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

**Λίτος Ιωάννης**

MD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Σύγχρονη Πολυκλινική Λάρισας

**Λόγα Κωνσταντίνα**

Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Πανεπιστημιακή Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

**Μαραγκούλη Ελένη**

Παθολόγος – Ογκολόγος, Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Τρικάλων

**Μάρκου Αλεξάνδρα**

Παθολόγος -Ογκολόγος , Επιμελήτρια Β' ΠΓΝΛ.

**Ματθαίος Δημήτριος**

Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, MSc, PhD, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Μονάδα Χημειοθεραπείας - Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ρόδου

**Μιχαηλίδης Πρόδρομος**

Παθολόγος Ογκολόγος, Γ.Ν. Βόλου

**Μούντζιος Ιωάννης**

MD, MSc, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Δ' Ογκολογικής Κλινικής και Μονάδας Κλινικών Μελετών, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

**Μπακάλης Αθανάσιος**

Γενικός Χειρουργός - Χειρουργός Μαστού, MD, MSc, FEBS (Breast Surgery), Επιμελητής Α' Χειρουργικής Κλινικής Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο»

**Μπόκας Αλέξανδρος**

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Β' Α' Χημειοθεραπευτικού-Ογκολογικού Τμήματος, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

**Μπόνιου Κωνσταντίνα**

Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Διευθύντρια Ακτινοθεραπευτικού Ογκολογικού Τμήματος, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

**Μπουρδάκης Αδαμάντιος**

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Β' Παθολογική Κλινική, Διαβητολογικό Ιατρείο & Ιατρείο Λιπιδίων και Παχυσαρκίας, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων



# Akynzeo<sup>®</sup>

## netupitant/palonosetron

Ένα καψάκιο περιέχει 300 mg netupitant και 0,5 mg palonosetron

02.2020/AKYNZE0/adv 01

 **Galenica α.ε.**

Αθήνα: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 145 64, τηλ.: 210 5281700,  
Θεσσαλονίκη: Κουντουριώτου & Φασιανού 2, τηλ.: 2310 542685  
**Επιστημονικό Τμήμα** τηλ.: 210 5281731  
**Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης** τηλ.: 210 5281805  
[www.galenica.gr](http://www.galenica.gr)

 **HELSINN**  
Building quality cancer care together

Διανέμεται κατόπιν αδείας της Helsinn Healthcare S.A, Ελβετία

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Περαιτέρω πληροφορίες περιλαμβάνονται στη  
συνοπτική Περιγραφή Χαρακτηριστικών Προϊόντος



|                                 |                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Μπουρνάκης Ευάγγελος</b>     | Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Κλινικής Ογκολογικών Κλινικών Μελετών και Έρευνας, «Metropolitan General»          |
| <b>Μπούτης Αναστάσιος</b>       | Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»                                                         |
| <b>Μυλωνάς Στέφανος</b>         | Διευθυντής, Β' Παθολογικής Τρικάλων                                                                                |
| <b>Νάση Δέσποινα</b>            | Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β' Β' Παθολογικής-Ογκολογικής Κλινικής, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»             |
| <b>Νικολάου Μιχαήλ</b>          | MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Α' Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»  |
| <b>Παπαγόρας Δημήτριος</b>      | Χειρουργός, MD, MSc, PhD, FEBS, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γ.Ν. Τρικάλων                                                   |
| <b>Παπαδόπουλος Βασίλειος</b>   | Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Β' Ογκολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Λάρισας                                            |
| <b>Παπακοτούλας Παύλος</b>      | Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Α' Χημειοθεραπευτικό - Ογκολογικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»                     |
| <b>Παπανδρέου Χρήστος</b>       | Ομ. Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας, Α.Π.Θ.                                                                      |
| <b>Παπατσιμπίας Γεώργιος</b>    | Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας, «ΙΑΣΩ» Θεσσαλίας                               |
| <b>Πασσά Αικατερίνη</b>         | Οδοντίατρος Ειδικής Φροντίδας - Στοματολόγος, Διευθύντρια Οδοντιατρικού Τμήματος Γ.Ν. Λάρισας                      |
| <b>Περδικούρη Ελένη-Ισιδώρα</b> | MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»                                    |
| <b>Ποιμενίδης Ευστάθιος</b>     | Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»                 |
| <b>Πουλτσίδα Αντιγόνη</b>       | Επίκουρος Καθηγήτρια - Μόνιμη Γενικής Χειρουργικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
| <b>Ρήγας Γεώργιος</b>           | Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Παθολογικού Ογκολογικού Τμήματος Κλινική «ΑΝΑΣΣΑ» Βόλος             |
| <b>Ρουπακιά Αλεξάνδρα</b>       | Ακτινοθεραπεύτρια - Ογκολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. Λάρισας                         |
| <b>Ρούσσος Γεώργιος</b>         | Διευθυντής Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής                                                                          |
| <b>Σαλούστρος Εμμανουήλ</b>     | Αν. Καθηγητής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας                           |
| <b>Σαμαράς Ιωάννης</b>          | Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Β', Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας                        |
| <b>Σγάντζου Ιωάννα</b>          | Επικουρικός Επιμελήτρια, Ακτινοδιαγνωστική, Γ.Ν. Λάρισας                                                           |

  
**Verzenios**<sup>®</sup>  
abemaciclib

**Νέα Ένδειξη**

**ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ HR+, HER2-  
ΠΡΩΙΜΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (EBC)  
ΜΕ ΘΕΤΙΚΟΥΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ, ΠΟΥ  
ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΥΠΟΤΡΟΦΗΣ**

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ  
*ελπίδα του κόσμου*  
ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ

**ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ  
ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ**

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



**Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Εταιρεία**

Η Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος είναι στη διάθεσή σας.  
Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή στον υπερασύνδεσμο  
<https://www.lilly.gr/landing-pages/verzenios-2022-kk/> ή σκανάρετε τον κωδικό QR



**ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.**

15° χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά,

**ΤΗΛ.:** 210 6294600, **FAX.:** 2106294610

[info@lilly.gr](mailto:info@lilly.gr), [www.lilly.gr](http://www.lilly.gr)

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ  
στα κοινωνικά δίκτυα





|                                        |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Σιαγκούλη Μαίρη</b>                 | Παθολόγος - Ογκολόγος, Γ.Ν. Λάρισας                                                                                                                   |
| <b>Σκριάπας Κωνσταντίνος</b>           | Χειρουργός Ουρολόγος, Διευθυντής, Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν. Λάρισας<br>«Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο»                                                |
| <b>Σόγκα Ελένη</b>                     | Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»                                                                                          |
| <b>Σοϊλεμέζη Ελισσάβετ</b>             | Ακτινοδιαγνώστης, Λάρισα                                                                                                                              |
| <b>Στέφος Άγγελος</b>                  | Παθολόγος, Λοιμωξιολόγος Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας                                                                                     |
| <b>Στυλοπούλου Μαρία Ρίτα</b>          | Εξειδικευμένη Μαστολόγος DKG, Λάρισα, Kliniken Essen Mitte, Γερμανία                                                                                  |
| <b>Σωτηριάδου Κωνσταντινιά</b>         | Ακτινοθεραπεύτρια - Ογκολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Π.Γ.Ν. Λάρισας                                                                                     |
| <b>Τεπετές Κωνσταντίνος</b>            | MD,ScD, FACS, EBSQ Surgical Oncology Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής<br>Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Διευθυντής του Τομέα<br>Χειρουργικής |
| <b>Τζώρτζης Βασίλειος</b>              | Καθηγητής Ουρολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας                                                                                                          |
| <b>Τιμοθεάδου Ελένη</b>                | Αν. Καθηγήτρια, Διευθύντρια, Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας Α.Π.Θ.,<br>Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»                                                          |
| <b>Τόλια Μαρία</b>                     | Αν. Καθηγήτρια Ακτινοθεραπείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης,<br>Διευθύντρια Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου           |
| <b>Τσαγκούλη Σοφία</b>                 | MD, Πνευμονολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.,<br>Επιμελήτρια, Ογκολογική Κλινική, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών                        |
| <b>Τσιαούσης Γεώργιος</b>              | Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Λάρισας                                                                                                  |
| <b>Τσιμπόλη Άννα</b>                   | Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, MD, MSc, Επιμελήτρια Β', Γ.Ν. Λάρισας<br>«Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο»                                              |
| <b>Φεργάδης<br/>Ευάγγελος-Γεώργιος</b> | Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Β' Παθολογικής - Ογκολογικής Κλινικής,<br>Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»                                                         |
| <b>Φωταρέλλη Αγγελική</b>              | Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β' Γ' Τμήματος Κλινικής Ογκολογίας-<br>Χημειοθεραπείας, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»                                         |
| <b>Χατζημιχαήλ Μαρία</b>               | Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Β', Γ.Ν.Λάρισας                                                                                                          |

# ΟΥΑΒΑΣ®

## bevacizumab



ΟΥΑΒΑΣ 367/1 06/2022

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή  
και Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε  
την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος



KAK: STADA Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2-18  
61118 Bad Vilbel, Germany



Πρωτεύεται από την εταιρία:

21<sup>ο</sup> χλμ Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας,  
145 68 Κρουσέρι, Αττικής, Ελλάδα  
Τ: +30 210 8161802, F: +30 210 8161587



## Γενικές Πληροφορίες \_

### \\ Οργάνωση:

Ελληνική Ογκολογική Εκπαίδευση και Πράξη (ΕΛ.Ο.Ε.Π.)

### \\ Ημερομηνία Διεξαγωγής:

10 - 11 Μαΐου 2024

### \\ Τόπος Διεξαγωγής:

Ξενοδοχείο Larissa Imperial  
Φαρσάλων 182  
413 35 Λάρισα  
Τηλ. +30 2410 687600

### \\ Εγγραφές:

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, με διαδικτυακή και φυσική συμμετοχή. Η εγγραφή στο Συνέδριο είναι δωρεάν. Η παρακολούθηση επιτρέπεται μόνο σε Επαγγελματίες Υγείας και σε προπτυχιακούς/ μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι φοιτητές είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.

### \\ Οδηγίες για παρακολούθηση με φυσική συμμετοχή:

Όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία, θα πρέπει να προσέλθουν στον χώρο διεξαγωγής για την εγγραφή τους ή να πραγματοποιήσουν την προεγγραφή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας [www.livemed.gr](http://www.livemed.gr). Κατόπιν της εγγραφής, θα τους αποσταλεί ηλεκτρονικό barcode μέσω email, το οποίο θα σαρώνουν κατά την είσοδο και έξοδο τους στην αίθουσα.

### \\ Οδηγίες Διαδικτυακής Παρακολούθησης:

Η Επιστημονική Εκδήλωση θα βιντεοσκοπείται και θα προβάλλεται ταυτόχρονα διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας [www.livemed.gr](http://www.livemed.gr)

Εάν είσατε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο [www.livemed.gr](http://www.livemed.gr) (πατήστε στο πεδίο **Register/Εγγραφή**). Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών.

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε την κατηγορία Live και το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο **Go Live ή Go Virtual**.




# TECENTRIQ®

atezolizumab



## CONNECT WITH PURPOSE



**TECENTRIQ® (ατεζολιζουμάμπη)**

**TECENTRIQ® 1.200 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.**

TECENTRIQ® 1.200 mg: • Ελλάδα N.T.: 3.063,17€ - Α.Τ.: 3.683,52€ • Κύπρος: Μ.Α.Τ.: 4.234,47€

**TECENTRIQ® 840 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.**

TECENTRIQ® 840 mg: • Ελλάδα: N.T.: 2.092,64€ - Α.Τ.: 2.534,94€ • Κύπρος: Μ.Α.Τ.: 2.968,80€

**Τρόπος Διάθεσης TECENTRIQ®:**

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή:

Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

**PRIX GALIEN GREECE**  
*Αθήνα 2019*

**ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ**

[www.prixgalien.gr](http://www.prixgalien.gr)

TECENTRIQ® 02\_03/24

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή  
και  
Αναφέρετε:  
τις ανεπιθύμητες ενέργειες για τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

**Ελλάδα: Roche (Hellas) A.E.**

Αλαμάνας 4 & Δελφών, 151 25 Μαρούσι, Αττική  
τηλ: 210 6166100, email: hellas.medinfo@roche.com  
800 111 93 00 (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)

**Κύπρος: Γ.Α. Σταμάτης & Σία Λτδ.**

τηλ: +357 - 22 76 62 76



Για περισσότερες  
πληροφορίες  
παρακαλούμε όπως  
ανατρέξετε στην  
Περίληψη Χαρακτηριστικών  
του Προϊόντος (ΠΧΠ).



Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την «Αίθουσα Συνεδριάσεων».

Εάν σας ενδιαφέρει να παραλάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο Συνέδριο μέσω της Εικονικής Γραμματείας, πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο «Εγγραφή», ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος.

#### **\\ Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης:**

Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν 16 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits).

#### **\\ Παραλαβή πιστοποιητικού:**

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου, σε όσους συνέδρους παρακολούθησαν το 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος. Ο αριθμός Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD), θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης που θα καταγραφεί στο σύστημα καταμέτρησης, τόσο στην είσοδο της αίθουσας για όσους έχουν φυσική παρουσία, όσο και στην πλατφόρμα Livemed για όσους παρακολουθήσουν διαδικτυακά. Πιστοποιητικό δεν μπορεί να δοθεί για την on-demand παρακολούθηση.

#### **\\ Γραμματεία Συνεδρίου:**



#### **E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.**

Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη | Τηλ.: 2109880032


Website: [www.events.gr](http://www.events.gr) | Email: [ets@events.gr](mailto:ets@events.gr)

**Απαγορεύεται ρητά** η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η E.T.S. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το [www.events.gr](http://www.events.gr)



# FULVESTRANT INNOVIS

FULVESTRANT



Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή  
Λιανική τιμή: 284,42€ Δ.Τ: 12/2023

FULVESTRANT/INNOVIS INJ.SO.PFS 250MG/5ML  
BT X 2 P.F.SYR X 5 ML

Σε περίπτωση έκδοσης νέου δελτίου τιμών, ισχύουν οι νεότερες τιμές.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή  
και Αναφέρετε

**ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
**ΟΛΑ** τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «**Κίτρινη Κάρτα**»

Ful-KB03-0124

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την  
ΠΧΠ του προϊόντος η οποία υπάρχει διαθέσιμη  
από την εταιρεία, εφόσον ζητηθεί.

  
**innovis**  
Future health today

INNOVIS PHARMA A.E.B.E.

Λεωφ. Κηφισίας 44  
Μαρούσι, 15125

T: +30 2162005600

F: +30 2106664804

[www.innovispharma.gr](http://www.innovispharma.gr)



Χορηγοί \_





\*Αυτή η συχνότητα βασίζεται σε συχνότητες της κατηγορίας αυτής των φαρμάκων (class-effect), κοινές για όλους τους GnRH αγωνιστές

| Κατηγορία Οργανικού Συστήματος                                           | Πολύ Συχνές                                                                                                                                                                           | Συχνές                                                                                  | Όχι συχνές                      | Επιδόλεον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος Μη γνωστής συχνότητας |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Οφθαλμικές διαταραχές                                                    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                         | Επιπρεσμένη όραση               | Διαταραχές όρασης                                                 |
| Διαταραχές του γαστρεντερικού                                            |                                                                                                                                                                                       | Κολικός άλγος                                                                           | Έμετος, δυσκοιλιότητα, διάρροια |                                                                   |
| Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης                    |                                                                                                                                                                                       | Αντίδραση στο σημείο της ένεσης (παραλαβώνονται πόνος, οίδημα, ερυθρότητα και φλεγμονή) | Κακουχία                        |                                                                   |
| Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος                                 |                                                                                                                                                                                       | Αντίδραση υπερευαίσθησης                                                                |                                 | Ανοφελκτικό σοκ                                                   |
| Παρακλινικές εξετάσεις                                                   |                                                                                                                                                                                       | Βάρος αυξημένο                                                                          |                                 | Αρτηριακή πίεση αυξημένη, Προεκτική αιμάτος αυχενική              |
| Διαταραχές του μεταβολισμού και της θέρμης                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                         | Παρορρακία                      |                                                                   |
| Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                         | Πόνος στον αυχένα               | Μυαλγία                                                           |
| Διαταραχές του νευρικού συστήματος                                       |                                                                                                                                                                                       | Κεφαλαλγία                                                                              |                                 |                                                                   |
| Ψυχιατρικές διαταραχές                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                         | Μεταβολή διάθεσης               | Ευμεταβολιότητα, Κατάθλιψη, Νευρωτικότητα                         |
| Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος και του ματού                    | Ασμογρίνα από τον κόλπο (παραλαβώνονται Κολμική ασμογρίνα, Ασμογρίνα από απόσυρση, Ασμογρίνα μήτρας, Κολμική έκκριση, Κολμική ασμογρίνα παραλαβώνομένης της σταγονοειδούς ασμογρίνης) |                                                                                         | Πόνος μαστιών                   |                                                                   |
| Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου |                                                                                                                                                                                       |                                                                                         | Επιταξή                         |                                                                   |
| Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού                          |                                                                                                                                                                                       | Ακμή                                                                                    | Κνηγισμός, Ερύθημα, Κνίδωση     | Αγγειονευρωτικό οίδημα                                            |
| Αγγειακές διαταραχές                                                     |                                                                                                                                                                                       | Εξάνθημα                                                                                |                                 | Υπέρταση                                                          |

[illegible]

**IPSEN MON.ΕΠΕ**  
Αγ. Δημητρίου 63, 174 56 ΑΝΙΜΟΣ  
Τηλ: 210 98 43 324, 210 98 58 930 & 210 98 58 940, Φαξ: 210 98 87 911  
E-mail: [ipsenpe@ipsen.com](mailto:ipsenpe@ipsen.com), <http://www.ipsen.gr>  
Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930

**1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ** Περίλα 6 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένο εγχυτήρα 2. **ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΣΙΤΗΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ** Περίλα 6 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένο εγχυτήρα. Κάθε προγεμισμένο εγχυτήρα περιέχει περίπου 6 mg (περίπου 0,6 ml) ενέσιμου διαλύματος. Η συσκευασία, βάσει μολύ του προϊόντος, είναι 10 μολύ\*\*\*.

\*Παράγωγοι του κυττάρου Escherichia coli, με εφαρμογή τεχνολογίας αναδιονομούμενου DNA, ακολουθούνται από σύνθεση με πολυμεριστικό μέσο (PEG). \*\*\* Η συσκευασία είναι 20 μολύτη εάν συμπεριληφθεί το τύγμα PEG. 3. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ** Ενέσιμο διάλυμα. Διαλυτός, άχρωμο ενέσιμο διάλυμα. 4. **ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις:** Μείωση της διάρκειας της ουδερεπρωτεϊνικής και της συγγενικής εμφάνισης της εμφάνισης ουδερεπρωτεϊνικής σε ενήλικες ασθενείς που ακολουθούν καταπολέμηση χημειοθεραπείας για την αντιμετώπιση καρκίνου νώτου (με εξαίρεση τη χρόνια μελανώδη λευχαιμία) και τα μελανώδη λευχαιμία (σύνδρομα). 4.2 **Αντενδείξεις:** Υπεραισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα εφόδια. 4.3 **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση (βλ. παραρτήματα).** Προκειμένου να βελτιωθεί η ανγνωστότητα των βιολογικών φαρμακευτικών προϊόντων, η εμπορική ονομασία του χορηγούμενου προϊόντος θα πρέπει να καταγράφεται με ευκρίνεια. **Οξεία μελανώδης λευχαιμία (AML):** Περιορισμένη κλινικά δεδομένα υποδεικνύουν παρόμοια επίδραση της pegfilgrastim έναντι της filgrastim στον χρόνο ανάκτησης από σοβαρή ουδερεπρωτεϊνική σε ασθενείς με de novo AML (βλ. παράρτημα 5.1). Ωστόσο, τα μεμονωμένα αποτελέσματα της pegfilgrastim στην AML δεν έχουν τεκμηριωθεί και ανενήκε θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε αυτή την ομάδα ασθενών. Ο G-CSF μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη μελανωδών κυττάρων in vitro και παρόμοια μπορεί να παρατηρηθεί σε ορισμένα μη μελανώδη κυττάρω in vitro. Η ασφαλεία και η αποτελεσματικότητα της pegfilgrastim δεν έχουν διερευνηθεί σε ασθενείς με μελανωδολογικό σύνδρομο, χρόνια μελανώδη λευχαιμία και σε ασθενείς με δευτεροπαθή AML. Συνεπώς δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτούς τους ασθενείς. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται προκειμένου να γίνει διάκριση της διάλυσης του μεταμοσχευμένου των βλαστών της χρόνιας μελανωδούς λευχαιμίας από την AML. Η ασφαλεία και η αποτελεσματικότητα της χορήγησης pegfilgrastim σε ασθενείς με de novo οξεία μελανώδη λευχαιμία ηλικίας < 55 ετών με κυτταρογενετική t(15;17) δεν έχει τεκμηριωθεί. Η ασφαλεία και η αποτελεσματικότητα της pegfilgrastim σε ασθενείς που υποβάλλονται σε υψηλές δόσεις χημειοθεραπείας δεν έχουν διερευνηθεί. Από το φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για αύξηση της δόσης κυτταροτοξικής χημειοθεραπείας, πέρα από τα καθορισμένα ορίσματα δόσεων. **Πνευμονικές ανεπιθύμητες ενέργειες:** Πνευμονικές ανεπιθύμητες ενέργειες, συγκεκριμένα βλάβες πνευμονία, έχουν αναφερθεί μετά τη χορήγηση G-CSF. Ασθενείς με πρόσφατο ιστορικό πνευμονικών βλαβών ή πνευμονίας ενδέχεται να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο (βλ. παράρτημα 4.8). Η εμφάνιση πνευμονικών σημείων, όπως βήχας, πυρετός και δύσπνοια, σε συνδυασμό με ακτινολογικά σημεία πνευμονικών βλαβών, και η επίδειξη της πνευμονικής λειτουργίας σε συνδυασμό με αυξημένο αριθμό ουδερεπρωτεϊνικών ενδέχεται να αποτελούν πρώιμες ενδείξεις συνδρόμου αναπνευστικής δυσχέρειας ενήλικων (ARDS). Σε τέτοιες συνθήκες, θα πρέπει να διακοπεί η χορήγηση της pegfilgrastim, κατά την κρίση του ιατρού, και να δοθεί κατάλληλη αγωγή (βλ. παράρτημα 4.8). Συστατικά της παρασκευαστικής διαδικασίας, έχουν αναφερθεί να λαμβάνουν filgrastim και pegfilgrastim. Γενικά, τα περιστατικά υπεραισθησιακής αντίδρασης μετά τη μείωση της δόσης ή τη διακοπή χορήγησης filgrastim και pegfilgrastim. Συνιστάται η παρακολούθηση με ανάληψη ούρων. **Σύνδρομο διαφύσης τριχοειδών:** Έχει αναφερθεί συνδρόμο διαφύσης τριχοειδών έπειτα από χορήγηση G-CSF και το οποίο χαρακτηρίζεται από υπόταση, υπολευκοκυτταραιμία, οίδημα και αιμορραγική. Οι ασθενείς που εμφανίζουν συμπτώματα συνδρόμου διαφύσης τριχοειδών θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά και να λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή συμπτωματική θεραπεία, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει την αγωγή με στεφανιαία φροντίδα (βλ. παράρτημα 4.8). Στεφανιαία και εστιακή σπληνίτις. Γενικά συμπτωματικά περιστατικά σπληνίτις γλυκός και περιστατικά ρήξης σπλήνις, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων περιστατικών με θάνατο, καταλήγει, έχουν αναφερθεί μετά από χορήγηση pegfilgrastim (βλ. παράρτημα 4.8). Επομένως, το μέγεθος του σπλήνις θα πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά (ή, κλινική εξέταση, υπερήχους). Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο ρήξης σπλήνις σε ασθενείς που αναφέρονται νόσο στο πάνω αριστερό μέρος της κοιλιακής χώρας ή στο άκρο του ώμου. **Θρομβωτικά και αιματώδη:** Η θεραπεία μόνο με pegfilgrastim δεν αποκλείει τη θρομβωτική και την αιματώδη από τη χρήση διαλυμάτων χημειοθεραπείας. Διαταραχές διαταραχές στο αγγειακό σύστημα. Συνιστάται παύση παρακολούθηση του αγγείου αυστηρώς και του αιματοκρίτη. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την χορήγηση επανήρ ή συνδυασμό χημειοθεραπευτικών φαρμακευτικών προϊόντων τα οποία είναι γνωστό ότι προκαλούν σοβαρή θρομβωτική. **Μελανωδολογικό σύνδρομο και οξεία μελανώδης λευχαιμία:** σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού και καρκίνο του πνεύμονα. Το πλάσμα μελέτης παρατήρησης μετά την κυκλοφορία, η pegfilgrastim σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία ή και ακτινοθεραπεία έχει συσχετιστεί με αντίστροφη μελανωδολογική οντολογία (MDS) και οξεία μελανώδης λευχαιμία (AML) σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού και καρκίνο του πνεύμονα (βλ. παράρτημα 4.8). Τα αποτελέσματα τους ασθενείς με καρκίνο του μαστού και του πνεύμονα για σημεία και συμπτώματα MDS/AML. **Διαταραχές καρδιακής αγωγής:** Διαταραχές καρδιακής αγωγής σχετίζονται με τη χρήση pegfilgrastim σε ασθενείς με σοβαρά θρομβωτικά και αιματώδη νόσο (βλ. παράρτημα 4.8). Για τον λόγο αυτό, οι ιατροί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη συνταγογράφηση της pegfilgrastim σε ασθενείς με σημεία θρομβωτικών και αιματωδών ή θρομβωτικών νόσων, θα πρέπει να παρακολουθούν τη κλινική παραμέτρους και τις εργαστηριακές αναλύσεις και θα πρέπει να προσέχουν την πιθανή σύλληψη του φαρμακευτικού προϊόντος αυτού με διάφορα σπληνίτις και υπεραισθησιακές κρίσεις. **Λευκοκυτταραιμία:** Έχουν παρατηρηθεί οξεία λευκοκυτταραιμία (WBC 100 <10<sup>9</sup>/l) αιματοκρίτη, σε λιγότερους από το 1% των ασθενών που έλαβαν pegfilgrastim. Δεν έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες ενέργειες που να αποδίδονται άμεσα σε αυτόν τον βαθμό λευκοκυτταραιμίας. Αυτή η αύξηση των WBC είναι παροδική, εμφανίζεται συνήθως 24 με 48 ώρες από τη χορήγηση και συμβαίνει με τις φαρμακοδυναμικές επιδράσεις του φαρμακευτικού αυτού προϊόντος. Σύμφωνα με τις κλινικές επιδόσεις και την πιθανότητα λευκοκυτταραιμίας, θα πρέπει να πραγματοποιείται έλεγχος του αριθμού των λευκοκυττάρων και του αιματοκρίτη κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Αν οι ασθενείς έχουν λευκοκυτταραιμία > 50 x 10<sup>9</sup>/l μετά από το ανεπιθύμητο νόση, το φαρμακευτικό προϊόν αυτό θα πρέπει να διακοπεί άμεσα. **Υπεραισθησία:** Σε ασθενείς υπό θεραπεία με pegfilgrastim έχει αναφερθεί υπεραισθησία, συμπεριλαμβανομένων αναφυλακτικών αντιδράσεων, που παρουσιάζονται κατά την αρχή ή την επανόληψη της θεραπείας. Η pegfilgrastim πρέπει να διακοπεί μόλις σε ασθενείς με κλινικά συμπτώματα υπεραισθησίας. Μη χορηγείται pegfilgrastim σε ασθενείς με ιστορικό υπεραισθησίας στην pegfilgrastim ή στη filgrastim. Στην περίπτωση εμφάνισης σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης, θα πρέπει να χορηγηθεί κατάλληλη θεραπεία και να παρακολουθείται στενά να αφεθείς πρώτες. **Σύνδρομο Stevens-Johnson:** Σύνδρομο Stevens-Johnson (SJS), το οποίο μπορεί να είναι απειλητικό για τη ζωή ή θάνατος, έχει σημειωθεί αναφέρεται σε σχέση με τη θεραπεία με pegfilgrastim. Αν οι ασθενείς έχει αναφέρεται SJS με τη χρήση της pegfilgrastim, η θεραπεία με pegfilgrastim δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεκινήσει εκ νέου στον συγκεκριμένο ασθενή. **Ανοσογενετική:** Όπως συμβαίνει με όλες τις θεραπευτικές πρωτεΐνες, υπάρχει πιθανότητα ανοσογονικότητας. Οι οίδημα παρόμοιας αιτιολογίας αυτών της pegfilgrastim είναι γενικά ήπιες. Εμφανίζονται θεραπευτικό αποτέλεσμα σχετικά αναμένεται με όλα τα εφόδια. Ωστόσο, δεν έχουν συσχετιστεί επί του παρόντος με βλάβες πνευμονία, διαφύσης τριχοειδών, έχουν αναφερθεί μετά τη χορήγηση filgrastim. Η pegfilgrastim σε υψηλή δόση και σε ασθενείς με καρκίνο. Στα συμπτώματα που παρουσιάζονται αναλογούντα συμπτώματα πυρετός, κολικός πόνος, οίδημα κατώτερης, σφαγγίτις και αυξημένα δείκτες φλεγμονής (ή, C-αντιδρώσα πρωτεΐνη και αριθμός WBC). Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αγωγή διακοπεί με άμεση ταμνοθεραπεία και γενικά υποχώρησε μετά τη διακοπή της χορήγησης filgrastim ή pegfilgrastim. Βλέπε επίσης παράρτημα 4.8. **Κυτταροπενία (PBC):** Η ασφαλεία και η αποτελεσματικότητα του Περίλα στην αντιμετώπιση των πρόβλημων αιματολογικών ασθενών σε ασθενείς ή σε αυτές βλάβες δεν έχουν διαφανθεί επαρκώς. Άλλες ειδικές προειδοποιήσεις: Αύξηση αιματολογική διαταραχή του μυελού των οστών ως αποτέλεσμα στη θεραπεία με pegfilgrastim μπορεί να σχετίζεται με παροδικές βλάβες αλλαγής της απώλειας των οστών. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν αξιολογούνται τα αποτελέσματα της απώλειας των οστών. **Εξέλιξη με γνωστή δόση:** Σοβαρότητα. Η αβίαση επίδραση της ταυτόχρονης χορήγησης προϊόντων που περιέχουν σοφουβίρη (ή φουροβουβίρη) και τη με διαφορά λήψη σοφουβίρη (ή φουροβουβίρη) είναι να λαμβάνονται αυξημένα, πόσιμο. Το Περίλα περιέχει λιγότερο από 1 mmol ιωδίου (22 mg) ανά δόση 6 mg, είναι δηλαδή ουσιαστικά "ελεύθερο ιωδίου". **Ιατρικά αφέλιμα:** Το κάλυμμα της βέλους της προγεμισμένης σύριγγας περιέχει έναν φυσικό ελαστικό (ένα παράγωγο του λατέξ), το οποίο μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 4.8 **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Σύντομη του προφίλ ασφαλείας. Όχι μόνο αναμενόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται συχνότερα πριν πόνος στα πόδια (πολύ συχνός (> 10%) και μυοσκελετικές πόνος (συχνός > 1/100 έως < 1/10). Ο πόνος στα πόδια είναι κατά κανόνα ήπιος έως μέτρια ένταση, πριν παροδικός και μπορεί να αντιμετωπιστεί με κοινά αναλγητικά στον περισσότερο ασθενείς. Αντιδράσεις τύπου υπεραισθησίας, συμπεριλαμβανομένων διαταραχών καρδιακής αγωγής, γαστρεντερικών διαταραχών, αναφυλακτικών αντιδράσεων, έχουν αναφερθεί κατά την αρχή ή την επανόληψη χορήγησης με pegfilgrastim (ή συχνός > 1/100 έως < 1/100). Σημαντικές αλλεργικές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένης της αναφυλαξίας μπορεί να εμφανισθούν σε ασθενείς που λαμβάνουν pegfilgrastim (ή συχνός) (βλ. παράρτημα 4.4). Το σύνδρομο διαφύσης τριχοειδών, το οποίο ενδέχεται να είναι απειλητικό για την ζωή εάν καθυστερήσει η θεραπεία του, έχει αναφερθεί (ή συχνός > 1/100 έως < 1/100) σε ασθενείς με καρκίνο που λαμβάνουν χημειοθεραπεία έπειτα από χορήγηση G-CSF. Βλ. παράρτημα 4.4 και την παράρτημα «Παραγωγή επιπλοκών ανεπιθύμητων ενεργειών» παρατίθεται. Η επανόληψη της γενικά συμπτωματική είναι (ή συχνή) Η ήπια σπληνίτις, συμπεριλαμβανομένων μερικών θανατηφόρων περιπτώσεων δεν αναφέρεται συχνά μετά τη χορήγηση με pegfilgrastim (βλ. παράρτημα 4.4). Οι ανεπιθύμητες ανεπιθύμητες αντιδράσεις συμπεριλαμβανομένης της βλάβης πνευμονίας, του πνευμονικού οίδηματος, των πνευμονικών βλαβών και της πνευμονικής ιστικής έχουν αναφερθεί. Οι συχνές περιπτώσεις είναι οι ασθενείς απώλειας αναπνευστική ανεπάρκεια ή ARDS, τα οποία μπορεί να έχουν θανατηφόρο κατάληξη (βλ. παράρτημα 4.4). Μερώνων περιπτώσεων θρομβωτικών διαταραχών έχουν αναφερθεί σε ασθενείς με στήνα θρομβωτικών και αιματωδών ή θρομβωτικών νόσων (βλ. συχνός σε ασθενείς με θρομβωτικών και αιματωδών νόσων). Παραρτήματα συμπεριλαμβανομένων ανεπιθύμητων ενεργειών: Όχι συχνά περιστατικά συνδρόμου Stevens-Johnson έχουν αναφερθεί, αν και οι ασθενείς περιπτώσεις, υποκειμενικά αιματολογικές καρκίνους μπορεί να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο. Οι συχνά περιστατικά διαταραχών αγγειακών έχουν αναφερθεί σε ασθενείς που έλαβαν pegfilgrastim με pegfilgrastim. Ο μηχανισμός της αγγειακής τους ασθενείς που λαμβάνουν pegfilgrastim είναι άγνωστος. Αντιδράσεις της βόθης έντασης, συμπεριλαμβανομένων του ερυθρίτη της βόθης έντασης (ή συχνός) καθώς και άμεσης επί της βόθης της έντασης (σπάνια σπάνια) έχουν παρατηρηθεί στην αρχή ή σε επανόληψη της θεραπείας με pegfilgrastim. Έχουν αναφερθεί συχνά παρανοήματα (συχνός > 1/10 < 10%) (βλ. παράρτημα 4.4). Αναμενόμενες ήπιες έως μέτριες αύξεις του επιπέδου του ουρικού οξέος και της αλκαλικής φωσφατάσης, χωρίς σχετιζόμενες κλινικές επιδράσεις, πριν (ή συχνές) Αναμενόμενες ήπιες έως μέτριες αύξεις του επιπέδου της γαλακτικής αφαιρούμενης, χωρίς σχετιζόμενες κλινικές επιδράσεις, πριν (ή συχνές σε ασθενείς που έλαβαν pegfilgrastim μετά από καταπολέμηση χημειοθεραπείας. Σε ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθεραπεία, παρατηρήθηκε πολύ συ

## ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

**Πίνακας λίστες ανεπιθύμητων ενεργειών:** Τα δεδομένα στον παρακάτω πίνακα περιγράφουν ανεπιθύμητες αντιδράσεις που αναφέρονται σε κλινικές δοκιμές και συλλεγμένες αναφορές. Σε κάθε κατηγορία εμφάνισης συχνότητας, οι ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.

| Κατηγορία/οργανικό σύστημα σύμφωνα με το MedDRA                                            | Ανεπιθύμητες ενέργειες          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                            | Πολύ συχνές (≥ 1/10 έως < 1/10) | Συχνές (≥ 1/100 έως < 1/100)                                                                                                                         | Όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100)                                                                                                                                                                | Σπάνιες (≥ 1/10.000 έως < 1/1.000) | Πολύ σπάνιες (< 1/10.000) |
| Μελανωδολογικό καλοήγη, κακοήγη και μη καθορισμένα (περιλαμβανομένων κύστες και πολυπόδες) |                                 |                                                                                                                                                      | Μελανωδολογικό σύνδρομο <sup>1</sup><br>Οξεία μελανωδής λευχαιμία <sup>1</sup>                                                                                                                    |                                    |                           |
| Διαταραχές του αναπνευστικού και του λεμφικού συστήματος                                   |                                 | Θρομβοπενία <sup>1</sup><br>Λευκοκυτταραιμία <sup>1</sup>                                                                                            | Δρεπανοκυτταρική αναιμία με κρίση <sup>1</sup><br>Σπληνμεγαλία <sup>1</sup><br>Ρήξη σπλήνις <sup>1</sup>                                                                                          |                                    |                           |
| Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος                                                   |                                 |                                                                                                                                                      | Αντιδράσεις υπεραισθησιακής, αναφυλαξία                                                                                                                                                           |                                    |                           |
| Διαταραχές του μεταβολισμού και της θέρμανσης                                              |                                 |                                                                                                                                                      | Αύξηση των επιπέδων του ουρικού οξέος                                                                                                                                                             |                                    |                           |
| Διαταραχές του νεφρικού συστήματος                                                         | Κεφαλαλγία <sup>1</sup>         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                    |                           |
| Αγγειακές διαταραχές                                                                       |                                 |                                                                                                                                                      | Σύνδρομο διαφύσης τριχοειδών <sup>1</sup>                                                                                                                                                         | Ασπρίτιδα                          |                           |
| Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωρακίου                   |                                 |                                                                                                                                                      | Σύνδρομο αναπνευστικής διαφύσης ενήλικων (ARDS) <sup>1</sup><br>Πνευμονικές ανεπιθύμητες ενέργειες (βλάβες πνευμονία, πνευμονικό οίδημα, πνευμονικές διαταραχές και πνευμονική ίνωση)<br>Αιματώδη | Πνευμονική αμφορίνη                |                           |
| Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος                                                   | Ναυτία <sup>1</sup>             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                    |                           |
| Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού                                            |                                 |                                                                                                                                                      | Σύνδρομο Sweet (οξεία εμφάνιση υπεραισθησιακής δερματίτιδας) <sup>1</sup><br>Δερματίτις αγγειόλη <sup>1,2</sup>                                                                                   | Σύνδρομο Stevens-Johnson           |                           |
| Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού                           | Οστικός πόνος.                  | Μυοσκελετικός πόνος (μυαλγία, αρθραλγία, πόνος στα άκρα, σφαγγίτις, μυοσκελετικός πόνος, σκελετογόνος πόνος, σκελετογόνος πόνος, σκελετογόνος πόνος) |                                                                                                                                                                                                   |                                    |                           |
| Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών                                               |                                 |                                                                                                                                                      | Στεφανιοκαρδιοπάθεια <sup>2</sup>                                                                                                                                                                 |                                    |                           |
| Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της όλης χορήγησης                                      |                                 | Πόνος στη βόθρη της έντασης <sup>1</sup><br>Η ήπια σπληνίτις, συμπεριλαμβανομένων μερικών θανατηφόρων περιπτώσεων                                    | Αντιδράσεις στη θέση της έντασης <sup>1</sup>                                                                                                                                                     |                                    |                           |
| Παρακλινικές εξετάσεις                                                                     |                                 |                                                                                                                                                      | Αύξησης της γαλακτικής αφαιρούμενης και της αλκαλικής φωσφατάσης <sup>1</sup><br>Παροδικές αυξήσεις της ALT ή της AST στις δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας <sup>1</sup>                           |                                    |                           |

<sup>1</sup> Βλ. παράρτημα «Παραγωγή επιπλοκών ανεπιθύμητων ενεργειών» παρατίθεται.  
<sup>2</sup> Αυτή η ανεπιθύμητη ενέργεια προκύπτει από την παρακολούθηση μετά την κυκλοφορία αλλά δεν παρατηρήθηκε σε τυποποιημένες, ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές σε ενήλικες. Η κατηγορία συχνότητας προορίζεται από ένα στατιστικό υπολογισμό με βάση 1.576 ασθενείς που έλαβαν pegfilgrastim σε ενήλικα τυποποιημένες κλινικές δοκιμές.

χρήσιμα και κεφαλαλγία. Οι συχνές αύξεις της αιμορροαγωγής της αλκαλικής (ALT) ή της αιπατικής αιμορροαγωγής (AST) σε δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς μετά τη λήψη pegfilgrastim ύστερα από καταπολέμηση χημειοθεραπείας. Οι αυξήσεις στην παροδικές και επείγουσες στις αρθικές τιμές. Αύξησης κίνδυνος MDS/AML έπειτα από θεραπεία με το Περίλα σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία ή και ακτινοθεραπεία έχει παρατηρηθεί σε μια επιπλοκή μελέτη σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού και καρκίνο του πνεύμονα (βλ. παράρτημα 4.4). Έχουν αναφερθεί συχνά περιστατικά θρομβωτικών. Περιστατικά συνδρόμου διαφύσης τριχοειδών έχουν αναφερθεί μετά την έγχυση του φαρμάκου με τη χρήση G-CSF. Τα περιστατικά αυτά έχουν γενικά συμβεί σε ασθενείς με προγεμισμένο κακοήγη νόση, στήνη, σε ασθενείς που λαμβάνουν πολλαπλά χημειοθεραπευτικά φαρμακευτικά προϊόντα ή υποβάλλονται σε αφαίρεση (βλ. παράρτημα 4.4). **Παθολογικές πληροφορίες:** Η εμφάνιση στα παύδα είναι περιορισμένη. Έχει παρατηρηθεί υψηλή συχνότητα συνδρόμου ανεπιθύμητων ενεργειών σε μικροβιακά παύδα ηλικίας 0-5 ετών (92%) συγκριτικά με μεγαλύτερα παύδα ηλικίας 6-11 και 12-21 ετών (80% και 67% αντίστοιχα) και ενήλικες. Η πιο συχνά αναφερόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια που αναφέρεται πριν από την έγχυση είναι πόνος (βλ. παράρτημα 5.1 και 5.2). Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: **ΕΛΛΑΔΑ:** Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15502 Λαυρέα, Αθήνα Τηλ: +30 21 32040380/337, Φαξ: +30 21 06545955, Ιστοσελίδα: <http://www.emea.europa.eu>. **ΤΑΙΩΑΝ:** **THE AEMEA CYKLOPHARM:** Accord Healthcare S.L.U., World Trade Center, Mol de Barcelona, s/n, Edifici Estíbar, 08033 Barcelona, Ισπανία. **ΑΡΙΩΜΟΙ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** EU/118/131/009. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ** Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 21 Σεπτεμβρίου 2018. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΝΕΩΡΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 15 Ιουλίου 2021. **Λεπτομέρειες πληροφορίες:** για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στο δικτυακό του του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων <http://www.ema.europa.eu> **ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, Η ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ'Η ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ.**

| Ελλάδα                             |                                                                        |                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Περιεκτικότητα 6MG/0,6ML (10MG/ML) | Μεγάλες συσκευασίες 1 προγεμισμένο εγχυτήρας + 1 λυόφιλο με ονιόντευμα | Νοσοκομιακή τιμή 375,37€ |

Η ονίσηση ΓΠΤ του προϊόντος δημοσιεύεται επί τη ονίσηση του παρόντος εντύπου. Για περαιτέρω πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΓΠΤ που διαθέσιμη από την VHN MEDICA A.E., κατόπιν αιτήσεως.

**Βοήθησε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναμενόμενες**  
**ΟΔΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

