

Διοργάνωση:



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
& ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

5th

WEB SCIENTIFIC EVENT

PAVING INNOVATION

in Cancer Treatment

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

στην Ογκολογία

27
28

Σεπτεμβρίου 2024

Χορηγούνται 16 Μόρια Συνεχιζόμενης
Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD)
από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Watch live on
www.livemed.gr

WEB
ONLY

Επιστημονικό Πρόγραμμα



LUMYKRAS®
(sotorasib)

LUMYKRAS®[▼]: Στοχεύοντας τη μετάλλαξη KRASG12C στον προχωρημένο ΜΜΚΠ

Για ασθενείς με προχωρημένο ΜΜΚΠ και τη μετάλλαξη KRASG12C που έχουν λάβει 1 προηγούμενη γραμμή συστηματικής θεραπείας¹

Το LUMYKRAS®[▼] ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) με μετάλλαξη KRASG12C και οι οποίοι παρουσίασαν εξέλιξη της νόσου μετά από τουλάχιστον μία προηγούμενη γραμμή συστηματικής θεραπείας.

*Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέπει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Συντμήσεις

ΜΜΚΠ = μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα, KRAS = Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog

Παραπομπές

1. Lumykras ΠΧΠ

ΠΧΠ

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής. Το προϊόν δεν είναι τιμολογημένο στην Ελλάδα, αναφέρεται ενδεικτική τιμή 6.458€

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΝΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΗ το φάρμακο
Ευχαριστούμε στην "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"
Αναφέρετε κάθε άμεση ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με τη εθνική σύσταση αναφοράς στα Έγγραφα Αυτοελέγχου Ασφαλείας του Φαρμάκου (Σύστημα Φαρμάκων ΕΟΦ) Τηλ: 2102442300 Fax: 2106040465, ή τη γραμμή της Κίτρινης Κάρτας, διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα www.ema.europa.eu, με έντονο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακείο. Ε.Π.Ε. Τηλ: +30 212 3447000

GRC-511-0624-80002

AMGEN

AMGEN Hellas, Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, Κτίριο C
151 24 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα, +302103447000

ONCE-DAILY ORAL

LUMYKRAS®
(sotorasib) 120 mg tablets

Χαιρετισμός

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο Μαρσέλ Προύστ είχε πει κάποτε ότι **«Το ταξίδι της ανακάλυψης δεν σημαίνει να ψάχνεις καινούργια μέρη αλλά να έχεις καινούργια μάτια»**.

Σας καλούμε λοιπόν και φέτος στο **5^ο Innovation in Oncology-Καινοτομία στην Ογκολογία**, για να δούμε και φέτος, μαζί με μια άλλη ματιά, τις ραγδαίες και συναρπαστικές εξελίξεις που ζούμε στην Ογκολογία.

Η ανοσοθεραπεία, η πληθώρα των μοριακά στοχευμένων θεραπειών μαζί με τη χημειοθεραπεία, τα ADCs και τις κλασικές θεραπείες, ανοίγουν νέους δρόμους στην καθημερινή μας κλινική πράξη.

Ταυτόχρονα, η πληθώρα των θεραπευτικών επιλογών γεννά καθημερινά ερωτήματα για τον τρόπο και τη σειρά που αυτές θα χρησιμοποιηθούν.

Το τοπίο περιπλέκεται ακόμα πιο πολύ με τις εξελίξεις στον τεχνολογικό τομέα που βιώνει η Χειρουργική Ογκολογία με τη Ρομποτική Χειρουργική, τις εξελίξεις στην Απεικόνιση και η Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία. Νέοι δρόμοι ανοίγονται που απαιτούν την διατομεακή και πολυπρισματική προσέγγιση μεταξύ των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων. Την καθημέρα ογκολογική πράξη έρχεται να επηρεάσει και η έλευση της τεχνητής νοημοσύνης.

Μετά την εξαιρετική απήχηση και επιτυχία που είχαν τα τέσσερα προηγούμενα συνέδρια «Innovation in Oncology-Καινοτομία στην Ογκολογία», προχωρούμε φέτος στην διοργάνωση του 5^{ου} «Paving Innovation in Cancer Treatment-Καινοτομία στην Ογκολογία», ώστε η ώσμωση μεταξύ των ειδικοτήτων πάνω σε θέματα αιχμής στην Ογκολογία, να μας οδηγήσει σε γόνιμα συμπεράσματα και προοπτικές.

Με τιμή,

Οι Πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής

Δημήτριος Ματθαίος

Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής
Ογκολογίας Δ.Π.Θ.

Μιχαήλ Καραμούζης

Παθολόγος - Ογκολόγος,
MD, PhD, Καθηγητής,
Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α



Βιβλιογραφικές αναφορές: NUBEQA Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (τελευταία πρόσβαση 22/5/2024)

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

- Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 300 mg δαρολουταμίδης.
- Έκδοχο με γνωστή δράση
- Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 186 mg μονοδρικής λακτόζης

Ενδεικτική Λ.Τ 3.063,82€

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας:
Bayer AG 51368, Leverkusen, Γερμανία

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας
Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αγησιόλαου 6-8, 15123 Μαρούσι

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος στο QRC και στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/nubeqa-epar-product-information_el.pdf



PP-NUB-GR-0079-1 (IOYN2024)

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ:00357 22483858

Τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης
Τηλ: +30 210 6187742, Φαξ: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2024

09:00-10:30 Στρογγυλή Τράπεζα Μοριακής Βιολογίας

Προεδρείο: Α. Γαλάνης, Δ. Μπουζαρέλου, Ε. Λιανίδου

- 09:00-09:20 Υγρή Βιοψία, εφαρμογές και προοπτικές **Ι. Μπαλγκουρανίδου**
- 09:20-09:40 Μοριακά τεστ ανίχνευσης καρκίνου σε ασυμπτωματικό πληθυσμό, που βρισκόμαστε; **Γ. Καπέτσης**
- 09:40-10:10 Single-molecule and single-cell epigenetics: Decoding the epigenome for cancer research and diagnostics **E. Shema**
- 10:10-10:30 Συζήτηση

10:30-11:20 Διάλειμμα

11:20-12:15 Διαλέξεις

Προεδρείο: Ζ. Σαριδάκη, Α. Χριστοπούλου, Α. Βαγιωνάς

- 11:20-11:40 Πρόγραμμα ΟΙΚΟΘΕΝ και προοπτικές εφαρμογής Του σε πανελλαδική κλίμακα **Μ. Νικολάου**
- 11:40-12:00 Η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην έρευνα και ανάπτυξη της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας **Χ. Αντωνόπουλος**
- 12:00-12:15 Συζήτηση

12:15-12:30 Διάλειμμα

12:30-13:00 Lecture

Chairs: D. Matthaios, I. Maroulakou

Tips and tricks στη διαχείριση του κληρονομούμενου καρκίνου

Γ. Λύπας

13:00-13:15 Διάλειμμα

13:15-14:30 Σαρκώματα-NETs-Μελάνωμα

Προεδρείο: Α. Κυριαζόγλου, Α. Κουμαριανού, Β. Ραμφίδης

- 13:15-13:35 State of the art θεραπευτικός αλγόριθμος στην αντιμετώπιση των NETs **Μ. Τσώλη**
- 13:35-13:55 Νεότερες εξελίξεις στη θεραπεία των σαρκωμάτων **Σ. Κόκκαλη**
- 13:55-14:15 Σύγχρονη διαχείριση του μεταστατικού μελανώματος με συνδυασμούς ανοσοθεραπείας **Δ. Ζιώγας**

14:15-14:30 Συζήτηση

14:30-15:00 Μεσημβρινή Διακοπή

sponsored by  Bristol Myers Squibb

ΟΥΑΒΑΣ®

bevacizumab

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.
Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή έναρξη θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Λιανική τιμή σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών 12/2023

ΟΥΑΒΑΣ C/S.SOL.IN 25MG/ML 1 VIAL x 4 ML 231,91 €

ΟΥΑΒΑΣ C/S.SOL.IN 25MG/ML VIAL x 16 ML 810,88 €

*Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου δελτίου τιμών, θα ισχύουν οι νεότερες τιμές.

ΟΥΑΒΑΣ/497/1 06/2024



DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21^ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας, Κρυσσινί 145 68, Αττική
t +30 210 81 61 802, f +30 210 81 61 587, info@demo.gr
www.demo.gr

Always >> Forward



KAK: STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel, Germany

Αναζητήστε την ΠΧΠ
από εκπρόσωπο της
εταιρείας ή σαρώνοντας
τον QR κωδικό.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

15:00-16:15 Στρογγυλή Τράπεζα Ακτινοθεραπείας

Προεδρείο: Μ. Κουκουράκης, Β. Κουλουλίας

15:00-15:20 Ολιγομεταστατική νόσος δεδομένα και κλινική πρακτική

Α. Ζυγογιάννη

15:20- 15:40 Flash radiotherapy, ενδείξεις και προοπτικές

Π. Σκάρλος

15:40- 16:00 Ανοσοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Συνέργεια και προοπτικές

Κ. Φιλιππάτος

16:00-16:15 Συζήτηση

16:15-16:45 Διάλειμμα

16:45-17:30 Στρογγυλή Τράπεζα Υποστηρικτική Φροντίδα

Προεδρείο: Γ. Ρήγας, Ν. Μαλλιάρου

16:45-17:05 Προγράμματα άσκησης ενταγμένα στην καθημέρα Ογκολογική πράξη

Α. Φιλίππου

17:05-17:30 Συζήτηση

17:30-19:00 Διαλέξεις

Προεδρείο: Γ. Λαζαρίδης, Ε. Λιανός

17:30-18:00 Προσεγγίζοντας τον θεραπευτικό αλγόριθμο στην 1^η γραμμή του μεταστατικού νεφροκυτταρικού καρκινώματος

Ρ. Ζακοπούλου

18:00-18:20 ASCO 2024 updates

Σ. Ταλαγάνη

18:20-18:50 Ανοσοθεραπεία: συνέργεια με άλλες κατηγορίες φαρμάκων με υποσχόμενη αποτελεσματικότητα

Μ. Ροβίθη

18:50-19:00 Συζήτηση

19:00-20:10 Διαλέξεις

Προεδρείο: Κ. Ρωμανίδης, Μ. Καραμούζης, Γ. Λαμπροδήμου

19:00-19:20 Νεότερα δεδομένα στον ηπατοκυτταρικό καρκίνο και καρκίνο χοληφόρων

Μ. Καραμούζης

19:20-19:40 Ο θεραπευτικός αλγόριθμος στον οισοφαγογαστικό καρκίνο, πρώιμη και μεταστατική νόσος

Κ. Λόγα

19:40-20:00 mRNA εμβόλια στο μελάνωμα

Ι. Γαζούλη

20:00-20:10 Συζήτηση

20:10-21:00 Πώς η Ανοσοθεραπεία αλλάζει το τοπίο στις Γυναικολογικές Κακοήθειες

Προεδρείο: Θ. Τέγος, Σ. Χαλκικιάς

20:10-20:30 Στον καρκίνο του ενδομητρίου

Μ. Θεοχάρη

20:30-20:50 Στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Α. Ανδρεάδου

20:50-21:00 Συζήτηση



- Το LIBTAYO® σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση πρώτης γραμμής του NSCLC σε ενήλικες ασθενείς που εκφράζουν PD-L1 (σε $\geq 1\%$ των νεοπλασματικών κυττάρων), χωρίς ανωμαλίες EGFR, ALK ή ROS1, οι οποίοι έχουν:
 - Τοπικά προχωρημένο NSCLC, οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για οριστική χημειοακτινοθεραπεία, ή Μεταστατικό NSCLC¹
- Το LIBTAYO® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση πρώτης γραμμής του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (NSCLC) σε ενήλικες ασθενείς που εκφράζουν PD-L1 (σε $\geq 50\%$ των νεοπλασματικών κυττάρων), χωρίς ανωμαλίες EGFR, ALK ή ROS1, οι οποίοι έχουν:
 - Τοπικά προχωρημένο NSCLC, οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για οριστική χημειοακτινοθεραπεία, ή Μεταστατικό NSCLC¹
- Το LIBTAYO® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του μεταστατικού ή τοπικά προχωρημένου πλακώδους καρκινώματος του δέρματος (mSCC ή IaCSCC) σε ενήλικες ασθενείς, οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση ή ακτινοθεραπεία, που έχουν στόχο την ίαση.¹
- Το LIBTAYO® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού βασικοκυτταρικού καρκινώματος (IaBCC ή mBCC) σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν εμφανίσει εξέλιξη της νόσου ή έχουν δυσανοχή σε αναστολείς του μονοπατιού Hedgehog (HHI).¹
- Το LIBTAYO® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του υποτροπιάζοντος ή μεταστατικού καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε ενήλικες ασθενείς που παρουσιάζουν εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά από χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα.¹

M.M.K.Π=μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα, NSCLC=Non Small Cell Lung Cancer, μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα, EGFR=υποδοχέας του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, ALK=κινάση του αναπλάστικού λεμφώματος, ROS1=ROS πρωτο-ονκογενικό 1, υποδοχέας τυροσινικής κινάσης, CSCC=cutaneous squamous cell carcinoma, Πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος, BCC=basal cell carcinoma, βασικοκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος.

Μπορεί να εμφανιστούν ανοσομεσολαβούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες με το cemiplimab.

Οι περισσότερες από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών, υποχώρησαν μετά από την έναρξη κατάλληλης ιατρικής θεραπείας ή τη διακοπή του cemiplimab.¹

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από την Γένεσις Φάρμα Α.Ε.

Τρόπος Διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.

Ενδεικτική τιμή (N.T.): Φιαλίδιο 350mg/ 7ml 4.302,41€

1. Περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος LIBTAYO®

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



Για την ΓΚΠ
ακανόνατε
τον κωδικό QR

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2024

09:00-10:15 Ανοσοθεραπεία και Εξελίξεις στην Επικουρική Θεραπεία

Προεδρείο: Κ. Νεανίδης, Ι. Κωτσαντής

- 09:00-09:20 Επικουρική θεραπεία καρκίνου πνεύμονα **Γ. Ρίζος**
- 09:20-09:40 Επικουρική θεραπεία καρκίνου νεφρού και ουροδόχου κύστης **Π. Κουτουκόγλου**
- 09:40-10:00 Θεραπευτικές επιλογές σε ασθενείς υψηλού κινδύνου καρκίνου μαστού **Ε. Αραβαντινού**
- 10:00-10:15 Συζήτηση

10:15-11:30 Εξελίξεις στον Καρκίνο του Μαστού

Προεδρείο: Α. Μπούτης, Β. Μπαρμούνης, Ε. Τιμοθεάδου

- 10:15-10:35 2024: New concepts and strategies on breast cancer treatment **A. Gennari**
- 10:35-10:55 Πώς διαμορφώνεται ο θεραπευτικός αλγόριθμος στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού **Α. Άσση**
- 10:55-11:15 Anti HER θεραπεία στον μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Νεότερα δεδομένα **Α. Φωταρέλλη**
- 11:15-11:30 Συζήτηση

11:30-12:00 Διάλειμμα

12:00-13:00 Εξελίξεις στον Καρκίνο των Ωοθηκών

Προεδρείο: Γ. Κεσίσσης, Ν. Κεντεποζίδης

- 12:00-12:20 Νεότερα δεδομένα στην χρήση των PARP αναστολέων στον καρκίνο των ωοθηκών **Ι. Λίτος**
- 12:20-12:40 Νέα Μόρια στον καρκίνο των ωοθηκών **Α. Σιμάτου**
- 12:40-13:00 Συζήτηση

13:00-13:15 Διάλειμμα

13:15-14:15 Διαλέξεις

Προεδρείο: Χ. Εμμανουηλίδης, Κ. Αμαραντίδης


- 13:15-13:35 Πώς διαμορφώνεται ο θεραπευτικός αλγόριθμος του κολορθηκού καρκίνου εν έτει 2024 **Κ. Καμποσιώρας**
- 13:35-13:55 Καρκίνος ορθού: Νεοεπικουρική και επικουρική θεραπεία. Πού βρισκόμαστε; **Ε. Κοντοπόδης**
- 13:55-14:15 Συζήτηση

14:15-15:30 Μεσημβρινή Διακοπή

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ. ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ.^{1,2}

**ΣΕ ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ mHSPC ΑΣΘΕΝΩΝ
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ERLEADA® + ADT:**


Συνολική Επιβίωση (OS)



**Μείωση κινδύνου θανάτου
έναντι μονοθεραπείας με ADT**
 HR: 0,54 (95% CI: 0,42-0,71)

CI μικρότερο της μονάδας, στατιστικά σημαντικό

**Σε ασθενείς με >10 οστικές μεταστάσεις
κατά τη διάγνωση³**



Μείωση κινδύνου θανάτου
 HR: 0,35 (95% CI: 0,25-0,48)
 p<0,0001

**Σε mHSPC ασθενείς που έλαβαν ERLEADA® + ADT
και πέτυχαν μείωση PSA90 στους 3 μήνες
σε σχέση με τους ασθενείς που δεν πέτυχαν
τη μείωση PSA90⁴**



**Σταθερό και τεκμηριωμένο προφίλ ασφάλειας, έπειτα από σχεδόν 4 έτη
διάμεση παρακολούθησης, διατηρώντας παράλληλα σταθερή την HRQoL³**

ADT=Θεραπεία στήρησης ανδρογόνων, CI=Διάστημα Εμπιστοσύνης, HR=Αναλογία κινδύνου, mHSPC=Μεταστατικός, ορμονοευαίσθητος καρκίνος του προστάτη, OS=Συνολική επιβίωση, PS=Λειτουργική κατάσταση, PSA=Ειδικό προστατικό αντιγόνο, PSA90=Μείωση του PSA κατά 90% από την αρχική τιμή, HRQoL=Health Related Quality of Life, rPFS= Επιβίωση χωρίς ακτινολογική εξέλιξη, ECOG=Eastern Cooperative Oncology Group.

Η TITAN είναι μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης III στην οποία εντάχθηκαν ασθενείς με mHSPC και είχαν βαθμολογία ECOG 0 ή 1. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν άπαξ ημερησίως 240mg ERLEADA® + ADT (n=525) ή εικονικό φάρμακο + ADT (n=527). Διπλό πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν η OS και rPFS.

Το ERLEADA® ενδείκνυται:¹

- για τη θεραπεία του μη μεταστατικού, ανθεκτικού στον ευνουχισμό καρκίνου του προστάτη (nmCRPC) σε ενήλικους άνδρες, οι οποίοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν μεταστατική νόσο (χρόνος διπλασιασμού του PSA ≤10 μήνες).
- σε ενήλικους άνδρες για τη θεραπεία του μεταστατικού, ορμονοευαίσθητου καρκίνου του προστάτη (mHSPC) σε συνδυασμό με θεραπεία στήρησης ανδρογόνων (ADT).

Βιβλιογραφία: 1. ERLEADA® Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

2. Chi KN, et al. N Engl J Med. 2019;381(1):13–24. 3. Chi KN, et al. J Clin Oncol 2021;39:2294–2303.

4. Chowdhury S, et al Ann Oncol. 2023 Feb 27;S0923-7534(23)00086-8.

• **Περιεκτικότητα:** F.C.TAB 60MG/TAB • **Συσκευασία:** BTx112 δισκία σε blisters PVC/PCTFE/alu

• **Νοσοκομειακή Τιμή:** 2.197,35 € • **Λιανική Τιμή:** 2.661,79 €

Για την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος σκανάρετε εδώ



Μάθετε περισσότερα
στο Janssen
Medical Cloud



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

Λεωφόρος Ειρήνης 56, 151 21, Πεύκη, Αθήνα, Τηλ.: 210 8090000
www.janssen.com.gr

janssen Oncology

PHARMACEUTICAL COMPANIES OF Janssen-Ελλάδα

15:30-17:00 Ουρογενετικός Καρκίνος

Προεδρείο: Α. Μπάμιας, Ε. Μαραγκούλη, Α. Ζησιμόπουλος

- 15:30-15:50 Ουροθηλιακός Καρκίνος-αναδυόμενες θεραπείες **Ε. Περδικούρη**
15:50-16:10 Επιλογή ασθενών για μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία **Μ. Τριχάς**
16:10-16:30 Νεότερα δεδομένα στη διαχείριση του μεταστατικού ορμονοάνητοχου καρκίνου του προστάτη **Π. Βλαχοστέργιος**
16:30-17:00 Συζήτηση

17:00-17:15 Διάλειμμα

17:15-18:30 Καρκίνος Πνεύμονα

Προεδρείο: Σ. Αγγελάκη, Μ. Παντελιάδου, Π. Στειρόπουλος

- 17:15-17:35 Περιεγχειρητική χημειοανοσοθεραπεία **Α. Χαρπίδου**
17:35-17:55 Θεραπευτικός αλγόριθμος SCLC και νέα μόρια **Ν. Παυλίδης**
17:55-18:15 Διαχείριση N2/stage 3 NSCL **Ν. Καποδίστριας**
18:15-18:30 Συζήτηση

18:30-19:30 New molecules and compounds

Chairs: A. Psyrri, D. Matthaïos

- 18:30-18:50 Advances in Emerging Therapies to Overcome CPI Resistance in NSCLC **Ε. Onesti**
18:50-19:10 How to convert non-MSI-H metastatic colorectal cancer tumors to immunoresponsive **Γ. Argiles**
19:10-19:30 Discussion

19:30-20:15 Τελετή Λήξης - Διάλεξη

Προεδρείο: Δ. Ματθαίος, Α. Φίσκα

Η συμβολή του ΕΟΦ στο διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο της ενσωμάτωσης των νέων Ογκολογικών φαρμάκων στην Ελλάδα **Ε. Μανωλόπουλος**

Fentanyl/Sandoz

Fentanyl citrate



100 µg



200 µg



300 µg



400 µg

Το μέγεθος των δισκίων που απεικονίζονται δεν είναι πραγματικό.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ειδική ιατρική συνταγή του Ν 3459/06 περί ναρκωτικών (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ).

FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 100MCG/TAB BTx30x1 Λ.Τ.: 94,64 €, FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 200MCG/TAB BTx30x1 Λ.Τ.: 99,70 €, FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 300MCG/TAB BTx30x1 Λ.Τ.: 110,97 €, FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 400MCG/TAB BTx30x1 Λ.Τ.: 110,97 €



Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του

Προϊόντος σκανάροντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

Η έντυπη μορφή της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του

Προϊόντος είναι επίσης διαθέσιμη από την εταιρεία Lavipharm Hellas A.E.,

τηλ.: 210 6691 000, e-mail: SafetyGreece@lavipharm.com

FENT/SAND/LAV/04.2024

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΩΤΩΗΣΗΣ

Lavipharm Hellas A.E.

Οδός Αγίας Μαρίνας, 190 02 Παιανία Αττικής

Τηλ.: 210 6691 000

www.lavipharm.com

SANDOZ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Sandoz Pharmaceuticals d.d., Veronškova

ulica 57, SI-1000 Ljubljana, Σλοβενία.

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Φραγκοκκλησιάς 7B, 151 25 Μαρούσι

Τηλ: +30 216 600 5000



Κατάλογος Ομιλητών - Προέδρων

Argiles Guillem	MD, Senior Researcher, Luis Diaz Laboratory, MSKCC I Sloan Kettering Institute, New York, United States of America
Gennari Alessandra	MD, PhD, Professor of Oncology, University of Piemonte Orientale; Maggiore della Carità Hospital, Italy
Onesti Elisa	Medical Oncologist at IRCCS «Regina Elena» National Cancer Institute, Rome, Italy
Shema Efrat	Principal Investigator, Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel
Αγγελάκη Σοφία	Καθηγήτρια Παθολογικής Ογκολογίας, Παθολογική- Ογκολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Ηρακλείου, Εργαστήριο Μεταφραστικής Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Κρήτη
Αμαραντίδης Κυριάκος	Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, Διευθυντής ΕΣΥ, Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη
Ανδρεάδου Άννα	Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Γ' Ογκολογική Κλινική, Ν.Θ.«Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη
Αντωνόπουλος Χρήστος	MD, PhD, EMBA, Διευθυντής Τμήματος Ογκολογίας\ Αιματολογίας, Μέλος ΔΣ, AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου
Αραβαντινού Φατώρου Ελένη	Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, MSc, Β' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan»
Άσση Αβράαμ	Παθολόγος-Ογκολόγος, Α' Ογκολογική Κλινική, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center, Αθήνα
Βαγιωνάς Αναστάσιος	MD, MSc, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.
Βλαχοστέργιος Παναγιώτης	MD, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Cornell, ΗΠΑ - Επιμελητής Ογκολογικής Κλινικής, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Θεσσαλία
Γαζούλη Ιωάννα	Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια, Α' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan», Αθήνα
Γαλάνης Αλέξιος	Αναπληρωτής Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Δ.Π.Θ., Αλεξανδρούπολη



Verzenios[®]
abemaciclib

Νέα Ένδειξη

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ HR+, HER2-
ΠΡΩΙΜΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (EBC)
ΜΕ ΘΕΤΙΚΟΥΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ, ΠΟΥ
ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ

ελπίδα του κόσμου

ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ

**ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ
ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ**

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Εταιρεία

Η Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος είναι στη διάθεσή σας.
Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή στον υπερασύνδεσμο
<https://www.lilly.gr/landing-pages/verzenios-2022-kk/> ή σκανάρετε τον κωδικό QR



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

15° χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά,
ΤΗΛ.: 210 6294600, **FAX.:** 2106294610
info@lilly.gr, www.lilly.gr

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ
στα κοινωνικά δίκτυα



Εμμανουηλίδης Χρήστος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Πρώην Αν. Καθηγητής
Πανεπιστημίου UCLA, Διαβαλκανικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Ζακοπούλου Ρουμπίνη

Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, Β' Π.Π.Κ., Ιατρική
Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα

Ζησιμόπουλος Αθανάσιος

Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής
Δ.Π.Θ., Διευθυντής, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Π.Γ.Ν.
Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη

Ζιώγας Δημήτριος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Πανεπιστημιακός
Υπότροφος, Επιστημονικός Συνεργάτης,
Α' Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα

Ζυγογιάννη Άννα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν.
«Αρεταίειο», Αθήνα

Θεοχάρη Μαρία

Παθολόγος - Ογκολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια,
Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Αθήνα

Καμποσιώρας Κωνσταντίνος

MD, FRCP, PhD, Consultant in Medical Oncology,
NHS Foundation Trust, UK

Καπέτσης Γεώργιος

Medical Manager, Genekor Medical S.A.

Καποδίστριας Νικόλαος

Παθολόγος - Ογκολόγος, PhD, Επιμελητής Β',
Ογκολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. Πατρών, Πάτρα

Καραμούζης Μιχαήλ

Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, Καθηγητής,
Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα

Κεντεποζίδης Νικόλαος

Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, MSc,
Διευθυντής, Δ' Ογκολογική Κλινική, «Metropolitan
General», Αθήνα

Κεσίσης Γεώργιος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Κλινική «Άγιος Λουκάς»,
Θεσσαλονίκη

Κόκκαλη Στεφανία

Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, MSc, Επιμελήτρια Α',
Β' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο,
Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Αθήνα

Κοντοπόδης Εμμανουήλ

Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α',
Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο», Ηράκλειο

Κουκουράκης Μιχαήλ

Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρική
Σχολή, Δ.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

SUOMICON®

Dexamethasone

10mg/5ml, ποσ. διάλ., 50ml

20mg/5ml, ποσ. διάλ., 30ml

Με ιατρική συνταγή

NEO

PRELOCORTIL®

Prednisolone

5mg/tab, διαλυτά δισκία x30

20mg/tab, διαλυτά δισκία x30



Με ιατρική συνταγή

PIRVER®

Prednisolone

5mg/ml, ποσ. διάλ., 60ml

10mg/ml, ποσ. διάλ., 60ml

Με ιατρική συνταγή

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για

ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Συν-προώθηση SUOMICON & PIRVER
Medicair Bioscience Laboratories CY LTD

Συν-προώθηση PRELOCORTIL
S.J.A. PHARM E.Π.Ε.

Υπεύθυνος Ιατρικής Ενημέρωσης

Medicair Bioscience Laboratories S.A.

Λαρίσιος 10, 15351 Παλλήνη, Αθήνα,

τ-φ 210 6669 603, e info@medicair.gr

www.medicair.gr

Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών των Προϊόντων,
επικοινωνήστε με τον επιστημονικά υπεύθυνο

της ιατρικής ενημέρωσης,

τηλ. επικοινωνίας: 210 669603,

e-mail: pharmacovigilance@medicair.gr, www.medicair.gr

PRELOCORTIL® SOLU.TAB 5MG/TAB BT x 30

18,30€

PRELOCORTIL® SOLU.TAB 20MG/TAB BT x 30

73,17€

PIRVER ORAL.SOL 5MG/ML BTx BOTTLE x 60ml

29,93€

PIRVER ORAL.SOL 10MG/ML BTx BOTTLE x 60ml

59,89€

SUOMICON ORAL.SOL 10MG/5ML BOTTLE x 50ml

49,44€

SUOMICON ORAL.SOL 20MG/5ML BOTTLE x 30ml

59,19€

Κουλουλίας Βασίλειος

Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνος, Μονάδα Ακτινοθεραπείας, Β' Εργαστήριο Ακτινοθεραπείας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα

Κουμαριανού Άννα

MD, PhD, Διευθύντρια ΕΣΥ, Παθολόγος - Ογκολόγος, Αιματολογική-Ογκολογική Μονάδα, Δ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Π.Ν.Α. «Αττικόν», Αθήνα

Κουτουκόγλου Πρόδρομος

Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, M.D., M.Sc., Α' Ογκολογικό Χημειοθεραπευτικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη

Κυριαζόγλου Αναστάσιος

Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, Β' ΠΠΚ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα

Κωτσαντής Ιωάννης

Παθολόγος-Ογκολόγος, Επικουρικός Επιμελητής Β', Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα

Λαζαρίδης Γεώργιος

Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, Επιμελητής Α', Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας, Α.Π.Θ, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

Λαμπροδήμου Γεωργία

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο-Τριανταφύλλειο», Λάρισα

Λιανίδου Έυη

Καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας και Κλινικής Χημείας, PhD, Τμήμα Χημείας, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα

Λιανός Ευάγγελος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Παθολογικό - Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά», Αθήνα

Λίτος Ιωάννης

Παθολόγος Ογκολόγος, Σύγχρονη Πολυκλινική Λάρισας Α.Ε., Συνεργάτης, Δ' Ογκολογική Κλινική «Metropolitan General»

Λόγα Κωνσταντίνα

Παθολόγος - Ογκολόγος, Πανεπιστημιακή Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

Λύπας Γεώργιος

Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής, Τμήμα Γενετικής Ογκολογίας, Νοσοκομείο «Υγεία», Αθήνα

Μαλλιάρου Νικολέτα

Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Γ.Ν. Καβάλας, Καβάλα

Μανωλόπουλος Ευάγγελος

Πρόεδρος ΕΟΦ, Καθηγητής Φαρμακολογίας Ιατρική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης



Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

στη θεραπευτική επιλογή ασθενών
με HR+/HER2- mBC¹

✓ Κλινική Αποτελεσματικότητα¹⁻⁴

✓ Δεδομένα Κλινικής Πρακτικής⁵⁻⁷

✓ Δεδομένα έκβασης από αναφορές ασθενών (PRO)^{8,9}

✓ Καθιερωμένο Προφίλ Ασφάλειας^{1-4,10,11}

✓ Ένας συνιστώμενος τακτικός έλεγχος παρακολούθησης*¹

✓ Μία κάψουλα, μία φορά τη μέρα¹

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το IBRANCE, 125mg μια φορά την ημέρα από του στόματος για 21 μέρες σε κύκλο 28 ημερών (αχίμα 3/1), ενδείκνυται για τη θεραπεία του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου του μαστού ο οποίος είναι θετικός στους ορμονικούς υποδοχείς (HR) και αρνητικός στον υποδοχέα τύπου 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (HER2):

- σε συνδυασμό με αναστολέα της αρωματάσης

- σε συνδυασμό με φουλεστράντη σε γυναίκες που έχουν λάβει προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία

Σε προ- ή περι-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες η ενδοκρινική θεραπεία πρέπει να συνδυάζεται με LHRH αγωνιστή.¹

Για το πλήρες κείμενο της δοσολογίας και του τρόπου χορήγησης συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το IBRANCE αντενδείκνυται σε περιπτώσεις υπερευαίσθησής στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα, καθώς και σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν σκευάσματα που περιέχουν υπερικό/βαλασμόχορτο (St. John's Wort). Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ($\geq 20\%$) οποιουδήποτε βαθμού που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν palbociclib σε τυχαίοποιημένες κλινικές μελέτες ήταν ουδετεροπενία, λοιμώξεις, λευκοπενία, κόπωση, ναυτία, στοματίτιδα, αναιμία, διάρροια, αλωπεκία και θρομβοπενία. Οι πιο συχνές ($\geq 2\%$) ανεπιθύμητες ενέργειες Βαθμού ≥ 3 του palbociclib ήταν ουδετεροπενία, λευκοπενία, λοιμώξεις, αναιμία, αυξημένη ηπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST), κόπωση και αυξημένη αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT).¹

*Πρέπει να εκτελείται πλήρης αιματολογικός έλεγχος πριν από την έναρξη της θεραπείας και κατά την έναρξη του κάθε κύκλου, καθώς και την Ημέρα 15 των πρώτων 2 κύκλων και όπως ενδείκνυται κλινικά.

LHRH = ορμόνη απελευθέρωσης της ωχρινοτρόπου ορμόνης. mBC = μεταστατικός Καρκίνος Μαστού.

1. IBRANCE, Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 05/2024. 2. Ruqo H, et al. Breast Cancer Res Treat. 2019;174(3):719-729. 3. Finn RS, et al. N Engl J Med. 2016;375(20):1925-1936. 4. Cristofanilli M, et al. Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439. 5. DeMichele et al. Breast Cancer Research (2021) 23:37. 6. Waller J, et al. J Glob Oncol. 2019 May;5. JG01800239 7. Taylor-Stokes G, et al. Breast. 2019 Feb;43:22-7 8. Harbeck N, et al. Ann Oncol. 2016;27(6):1047-1054. 9. Ruqo HS, et al. Ann Oncol. 2018;29(4):888-894. 10. Dieras V, et al. J Natl Cancer Inst. 2019;111(4):419-430. 11. Verma S, et al. Oncologist. 2016;21:1165-1175.

Η συντετηγμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος δημοσιεύεται σε διαφορετική σελίδα του παρόντος.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Μαραγκούλη Ελένη	Παθολόγος - Ογκολόγος, Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Τρικάλων, Τρίκαλα
Μαρουλάκου Ιωάννα	Καθηγήτρια Γενετικής, Βιολογία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ματθαίος Δημήτριος	Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Ογκολογίας Δ.Π.Θ.
Μπαλγκουρανίδου Ιωάννα	PhD, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου, Βιολόγος-Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Ιατρικής, Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Δ.Π.Θ.
Μπάμιας Αριστοτέλης	Καθηγητής Θεραπευτικής - Παθολογίας - Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα
Μπαρμπούνης Βασίλειος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Ε' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Ιασώ», Αθήνα
Μπουζαρέλου Δήμητρα	MSc, PhD, ErCLG, Υπεύθυνη Τμήματος Κληρονομούμενων Νοσημάτων, GENEKOR MEDICAL S.A.
Μπούτης Αναστάσιος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Γ' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη
Νεανίδης Κωνσταντίνος	MD, MSc, Παθολόγος - Ογκολόγος & Κλινικός Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη
Νικολάου Μιχαήλ	Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Β', Α' Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα
Παντελιάδου Μαριάνθη	Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»
Παυλίδης Νεκτάριος	MD MSc, Assistant Director in Medical Oncology FMH in Medical Oncology in Switzerland, General Hospital of Limassol-Cyprus
Περδικούρη Ειρήνη-Ισιδώρα	MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Βόλος
Ραμφίδης Βασίλειος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική, 251 Γ.Ν.Α., Αθήνα

Innovative Oncology



Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση (Braftovi): 75 mg σκληρά καψάκια. Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 75 mg encorafenib. Νοσοκομειακή τιμή (CAPS 75MG): € 936,39, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση (Mektovi): Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 15 mg binimetinib. Έκδοχο με γνωστή δράση. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 133,5 mg μονοϋδρικής λακτόζης. Νοσοκομειακή τιμή (TABS 15MG): €1.668,45, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση (Nerlynx): Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει ηλεινική νερατινίμη, ισοδύναμη με 40 mg νερατινίμης. Νοσοκομειακή τιμή: € 3.195,95, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό γιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε τις περιλήψεις χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται από τον κάτοχο αδειών κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεων.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**



Pierre Fabre
FARMAKA S.A.

Αγιοσιλάου 6-8, 15123 Μαρούσι,
Τηλ. 210-7234582

© 2024 Pierre Fabre, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Το BRAFTOVI™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Array Biopharma Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε διάφορες άλλες χώρες.
Το MEKTOVI™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Array Biopharma Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε διάφορες χώρες.
Το NERLYNX™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Puma Biotechnology Inc.

Ρήγας Γεώργιος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Μονάδα Χημειοθεραπείας, Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Βόλος
Ρίζος Γεώργιος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Ογκολογικής Κλινικής 424 Γ.Σ.Ν.Ε.
Ροβίθη Μαρία	Παθολόγος - Ογκολόγος, Γ.Ν. Αγίου Νικολάου, Κρήτη
Ρωμανίδης Κωνσταντίνος	Καθηγητής Χειρουργικής, Τμήμα Ιατρικής, Δ.Π.Θ., Β' Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη
Σαριδάκη Ζένια	Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, Πρόεδρος Εταιρείας Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.), Διευθύντρια, Α' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan», Αθήνα, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ογκολογικού Τμήματος, «Ασκληπιός ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ», Ηράκλειο, Κρήτη
Σιμάτου Αριστοφάνια	Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας Β' Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα
Σκάρλος Παντελής	MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Διευθυντής - Β' Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Metropolitan, Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Στειρόπουλος Πασχάλης	Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας ΔΠΘ, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη
Ταλαγάνη Σοφία	Επικουρική Επιμελήτρια Ογκολογίας, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα
Τέγος Θεόδωρος	Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
Τιμοθεάδου Ελένη	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας - Ογκολογίας Α.Π.Θ., Διευθύντρια, Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας, Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Τριχάς Μιλτιάδης	Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Νοσοκομείο «Ιασώ», Αθήνα



Ontruzanttm
trastuzumab
150mg και 420mg

OntruzantTM (trastuzumab)

Πριν συνταγογραφήσετε ONTRUZANTTM, συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από τον Κ.Α.Κ.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από ιατρό με κατάλληλη ειδικευση & εμπειρία.

Λιανική Τιμή:

ONTRUZANTTM PD.C.S.INF 150MG/VIAL BTx1 VIAL / Λ.Τ: 388,13€

ONTRUZANTTM PD.C.S.INF 420MG/VIAL BTx1 VIAL / Λ.Τ: 1096,17€

(Σε περίπτωση τροποποίησης του Δελτίου Τιμών ισχύει η νεότερη τιμή)

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

© 2024 Organon group of companies. All rights reserved.

Τοπικός Αντιπρόσωπος:



BIANEX A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEX A.E. - Έδρα : Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά, Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία
Τηλ.: 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύσμος Θεσσαλονίκης • Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000



Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

ORGANON

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:

Samsung Bioepis NL B.V., Olof Palmestraat 10,
2616 LR Delft, Ολλανδία

VX-SBF-110010

BE-24001-ONF-1/2024

Τσώλη Μαρίνα

Επιμελήτρια Β' Ενδοκρινολογίας, Κέντρο
Εμπειρογνώμοσύνης Νευροενδοκρινών Όγκων,
Α' ΠΠΚ, Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα

Φιλιππάτος Κωνσταντίνος

Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Επιμελητής Α',
Πανεπιστημιακή Κλινική Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης,
Αλεξανδρούπολη

Φιλίππου Αναστάσιος

Καθηγητής Φυσιολογίας-Φυσιολογίας της
Άσκησης, Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή
ΕΚΠΑ, Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου «Exercise is
Medicine-Greece»

Φίσκα Αλίκη

Καθηγήτρια Ανατομίας, Τμήμα Ιατρικής, Δ.Π.Θ.,
Αλεξανδρούπολη

Φωταρέλλη Αγγελική

MD, BSN, Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β',
Γ' Τμήμα Κλινικής Ογκολογίας-Χημειοθεραπείας,
Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη

Χαλικιάς Σπυρίδων

MD, MSc, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος-
Εντατικολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Μονάδα
Παθολογικής Ογκολογίας και Χημειοθεραπείας
Γυναικολογικού καρκίνου, Γ.Ν.Μ «Έλενα Βενιζέλου»,
Αθήνα

Χαρπίδου Ανδριανή

MD, PhD, FCCP Πνευμονολόγος Υπεύθυνη
Μονάδας Κλινικής Έρευνας Γ' Παθολογική Κλινική
και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ,
Αθήνα

Χριστοπούλου Αθηνά

Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, Διευθύντρια και
Υπεύθυνη Ογκολογικής Μονάδας, Γ.Ν. Πατρών
«Ο Άγιος Ανδρέας», Είδ. Γραμματέας, Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Ε.

Ψυρρή Αμάντα

Καθηγήτρια Παθολογίας - Ογκολογίας, Ιατρική
Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Διευθύντρια, Β' Προπαιδευτική
Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - ESMO National
Societies Committee Chair

Υπερβαίνοντας τον Φόβο του Τρυπήματος



PELGRAZ ACC 02_12/2021

WinMedica
Serving Health for Life

Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας
Accord Healthcare S.L.U.

accord
The Evolution of Generics

Η σύντομη ΠΧΠ του προϊόντος δημοσιεύεται σε άλλη σελίδα του εντύπου.
Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ από την Win Medica A.E. κατόπιν αιτήσεως.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε
στην εταιρεία: WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35
15238 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827
info@winmedica.gr, www.winmedica.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα
φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες
ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την
«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Orlik G, Vishal V, Cornilewska-Watnicka J. Poster Board 071: Call Fear Of Injection Be Managed By Autoinjection: Internet Survey With Healthcare Professionals About Neutropenic Patients. European Journal of Oncology Pharmacy, October 2018; Vol. 1, Issue 3, p. 14-65.

PecFent®
ΡΙΝΙΚΟ ΕΚΝΕΦΩΜΑ ΚΙΤΡΙΚΗΣ ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗΣ



Abstral®
ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΑ ΔΙΣΚΙΑ ΚΙΤΡΙΚΗΣ ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗΣ

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από τον Κάτοχο.

KYOWA KIRIN

GRÜNENTHAL

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:

anaBIOsis
pharmaceuticals

Responsible Usage



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Αθήνα: Παράπλευρος Α. Κύμης 3-7, ΤΚ 14122 Νέο Ηράκλειο Αττικής, τηλ: 210 271 1020, fax: 210 271 2001
Θεσ/νίκη: 9^ο χλμ. Θεσ/νίκης - Μουδανιών, 55535 Θεσ/νίκη, τηλ: 2310 489360, fax: 2310 489396
email: info@anabiosis.gr • site: www.anabiosis.gr

Γενικές Πληροφορίες

Οργάνωση

Ινστιτούτο Μοριακής Ιατρικής & Βιοϊατρικής Έρευνας (IMBE)

Ημερομηνία

27-28 Σεπτεμβρίου 2024

Τόπος Διεξαγωγής

Web Scientific Event / Διαδικτυακή Διημερίδα

www.livemed.gr

Εγγραφή

Η εγγραφή και η παρακολούθηση της Διημερίδας είναι δωρεάν και επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς / μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Οδηγίες Διαδικτυακής Παρακολούθησης

Η Διημερίδα θα αναμεταδοθεί διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας www.livemed.gr

Εάν είστε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού στο Livemed, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία (πατήστε στο πεδίο **Register / Εγγραφή**).

Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών.

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε από το μενού την κατηγορία Live, την εκδήλωση που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο **Go Live ή Go Virtual**.

Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την **«Αίθουσα Συνεδριάσεων»**

Ερωτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέσω του πεδίου που βρίσκεται κάτω από το βίντεο, κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοση

Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν 16 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits).

Γραμματεία:



E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.

Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σμύρνη,
Τηλ.: 210 98 80 032, Fax: 210 98 81 303

Website: www.events.gr, **E-mail:** ets@events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η E.T.S. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr.

Πίνακας λίστας ανεπιθύμητων ενεργειών:

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
IBRANCE (palcicicilb)

ΣΚΛΗΡΑ ΚΑΨΑΚΙΑ 75 mg, 100 mg και 125 mg

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Υπερευαίσθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Χρήση σε ασθενείς που περιέχουν υπερικό/βαλασμάχορτο (St. John's Wort). **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:** Προ/περιεμνημοντωπασιακές γυναικές. Όταν το IBRANCE χορηγείται σε προ/περιεμνημοντωπασιακές γυναικές σε συνδυασμό με αναστολέα αρωματάσης, είναι υποχρεωτική η ωθηκτομή ή η καταστολή της λειτουργίας των ωοθηκών με χορήγηση αγωνιστή LHRH, λόγω του μηχανισμού δράσης των αναστολέων της αρωματάσης. Ο συνδυασμός του palcicicilb με τη φουλβεστράντη σε προ/περιεμνημοντωπασιακές γυναικές έχει μελετηθεί μόνο σε συνδυασμό με ένα αγωνιστή LHRH.Κρίσιμη σπλάγχχνική νόσος. Η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του palcicicilb δεν έχουν μελετηθεί σε ασθενείς με κρίσιμη σπλάγχχνική νόσο. Αιματολογικές διαταραχές. Για ασθενείς που εμφανίζουν ουδετεροπενία Βαθμού 3 ή 4 συνιστάται διακοπή της δόσης, μείωση της δόσης ή καθυστέρηση στην έναρξη των κύκλων της θεραπείας. Θα πρέπει να διεξάγεται κατάλληλη παρακολούθηση (βλ. παράγραφο «Ανεπιθύμητες Ενέργειες»). Διάσπαση πνευμονοπάθεια/πνευμονίτιδα. Μπορεί να παρουσιαστεί βαριάς μορφής, απειλητική για τη ζωή ή θανατηφόρα ILD /ή/κα πνευμονίτιδα σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με IBRANCE, όταν λαμβάνεται σε συνδυασμό με ενδοκρινική θεραπεία. Σε κλινικές μελέτες (PALOMA-1, PALOMA-2, PALOMA-3), το 1,4% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με το IBRANCE παρουσίασε ILD/πνευμονίτιδα οποιουδήποτε βαθμού, 0,1% παρουσίασε βαθμό 3, ενώ δεν αναφέρθηκαν περιπτώσεις βαθμού 4 ή θανατηφόρες περιπτώσεις. Επιπλέον περιπτώσεις ILD/πνευμονίτιδας έχουν παρατηρηθεί μετά την κυκλοφορία στην αγορά, με την αναφορά θανατηφόρων περιστατικών (βλ. παράγραφο «Ανεπιθύμητες Ενέργειες»). Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για πνευμονικά συμπτώματα ενδεικτικά ILD/πνευμονίτιδας (π.χ. υποξεία, βήχας, δύσπνοια). Σε ασθενείς που παρουσιάζουν νέα ή επιδεινούμενα αναπνευστικά συμπτώματα και υπάρχει η υποψία ανάπτυξης ILD/πνευμονίτιδας, το IBRANCE θα πρέπει να διακόπτεται αμέσως και ο ασθενής θα πρέπει να αξιολογείται. Το IBRANCE θα πρέπει να διακόπτεται οριστικά σε ασθενείς με βαριάς μορφής ILD ή πνευμονίτιδα. Λοιμώξεις. Καθώς το IBRANCE έχει μυελοκατασταλτικές ιδιότητες, μπορεί να προδιαθέσει τους ασθενείς για λοιμώξεις. Λοιμώξεις έχουν αναφερθεί σε υψηλότερο ποσοστό σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με το IBRANCE σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες σε σύγκριση με ασθενείς που έλαβαν θεραπεία στο αντίστοιχο σκέλος σύγκρισης. Λοιμώξεις Βαθμού 3 και Βαθμού 4 εμφανίστηκαν αντίστοιχα στο 5,6% και το 0,9% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με το IBRANCE σε οποιουδήποτε συνδυασμό (βλ. παράγραφο «Ανεπιθύμητες Ενέργειες»). Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για σημεία και συμπτώματα λοιμώξεων και τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις ιατρικές ενδείξεις. Οι γιατροί θα πρέπει να ενημερώνουν τους ασθενείς ώστε να αναφέρουν αμέσως οποιουδήποτε επεισόδια πυρετού. Φλεβική θρομβοεμβολία. Συμβαίνει φλεβικής θρομβοεμβολίας αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με το IBRANCE (βλ. παράγραφο «Ανεπιθύμητες Ενέργειες»). Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για σημεία και συμπτώματα εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και πνευμονικής εμβολής και να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις ιατρικές ενδείξεις. Ηπατική δυσλειτουργία. Το IBRANCE θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, υπό στενή παρακολούθηση για σημεία τοξικότητας. Νεφρική δυσλειτουργία. Το IBRANCE θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία, υπό στενή παρακολούθηση για σημεία τοξικότητας. Ταυτόχρονη θεραπεία με αναστολέα ή επαγωγείς του CYP3A4. Οι ισχυροί αναστολείς του CYP3A4 μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένη τοξικότητα. Θα πρέπει να αποφευχθεί η ταυτόχρονη χρήση ισχυρών αναστολέων του CYP3A4 κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το palcicicilb. Το ενδεχόμενο συγχρόνησης θα πρέπει να εξετάζεται μόνο μετά από προσεκτική αξιολόγηση των δυνητικών οφελών και κινδύνων. Εάν η συγχρόνηση με ισχυρό αναστολέα του CYP3A4 δεν μπορεί να αποφευχθεί, μειώστε τη δόση του IBRANCE στα 75 mg μία φορά την ημέρα. Όταν διακοπεί ο ισχυρός αναστολέας, η δόση του IBRANCE θα πρέπει να αυξάνεται (μετά από 3 – 5 ημετερίστους ζωής του αναστολέα) έως τη δόση που χρησιμοποιείτο πριν την έναρξη του ισχυρού αναστολέα του CYP3A4. Η συγχρόνηση επαγωγών του CYP3A4 μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη έκθεση στο palcicicilb και κατά συνέπεια σε κίνδυνο έλλειψης αποτελεσματικότητας. Συνεπώς, η ταυτόχρονη χρήση του palcicicilb με ισχυρούς επαγωγείς του CYP3A4 θα πρέπει να αποφευχθεί. Δεν απαιτείται καμία προσαρμογή της δόσης για τη συγχρόνηση του palcicicilb με μέτριους επαγωγείς του CYP3A4. Γυναικές σε αναπαραγωγική ηλικία ή οι σύντροφοί τους. Γυναικές σε αναπαραγωγική ηλικία ή οι άνδρες σύντροφοί τους πρέπει να χρησιμοποιούν μία μέθοδο αντισύλληψης υψηλής αποτελεσματικότητας ενώ παίρνουν το IBRANCE. Λακτόζη. Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λακτόζη. Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, πλήρη ανεπάρκεια λακτάσης ή κακή απορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης δεν πρέπει να πάρουν αυτό το φαρμακευτικό προϊόν. Νάτριο. Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά καψάκιο, είναι απόλυτο που ονομάζουμε «ελεύθερο νατρίου». **ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Περιλήψη του προφίλ ασφάλειας**. Το συνολικό προφίλ ασφάλειας του IBRANCE βασίζεται σε συγκεντρωτικά δεδομένα από 872 ασθενείς που έλαβαν palcicicilb σε συνδυασμό με ενδοκρινική θεραπεία (N = 527 σε συνδυασμό με λετροζόλη και N = 345 σε συνδυασμό με φουλβεστράντη) σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες σε HR-θετικό, HER2-αρνητικό προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνιο του μαστού. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 20%) οποιουδήποτε βαθμού που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν palcicicilb σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ήταν ουδετεροπενία, λοιμώξεις, λευκοπενία, κόπωση, ναυτία, στοματίτιδα, αναιμία, διάρροια, αλωπεκία και θρομβοπενία. Οι πιο συχνές (≥ 2%) ανεπιθύμητες ενέργειες Βαθμού ≥ 3 του palcicicilb ήταν ουδετεροπενία, λευκοπενία, λοιμώξεις, αναιμία, αυξημένη ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST), κόπωση και αυξημένη αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT). Μειώσεις της δόσης ή τροποποιήσεις της δόσης λόγω οποιασδήποτε ανεπιθύμητης ενέργειας αναφέρθηκαν στο 38,4% των ασθενών που έλαβαν το IBRANCE σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ανεξαρτήτως συνδυασμού. Οριστική διακοπή λόγω ανεπιθύμητης ενέργειας αναφέρθηκε στο 5,2% των ασθενών που έλαβαν το IBRANCE σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ανεξαρτήτως συνδυασμού. Παρακάτω αναφέρονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες από το συγκεντρωτικό σύνολο δεδομένων 3 τυχαιοποιημένων μελετών. Η διάμεση διάρκεια της θεραπείας με palcicicilb στο συγκεντρωτικό σύνολο δεδομένων κατά την τελική ανάλυση της συνολικής επίβιωσης (OS) ήταν 14,8 μήνες. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατηρούνται ανά κατηγορία συχνότητας. Οι κατηγορίες συχνότητας ορίζονται ως ακολούθως: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/10 έως < 1/10) και όχι συχνές (≥ 1/100 έως < 1/100). **Προτιμώμενος όρος* (PT) Πολύ συχνές:** Λοιμώξεις^a, ουδετεροπενία^a, λευκοπενία^a, αναιμία^a, θρομβοπενία^a, μειωμένη όρεξη, στοματίτιδα^a, ναυτία, διάρροια, έμετος, εξάνθημα^a, αλωπεκία, ηροδερμία, κόπωση, εξσθένωση, πυρετός, ALT αυξημένη, Σχζυνές: Εμπύρετη ουδετεροπενία, δυσανεμία, άραση θαμνή, δακρύρροια αυξημένη, ηροθαλαμία, φλεβική θρομβοεμβολία, ετίαση, ILD/πνευμονίτιδα, σύνδρομο παλαμο-πελματιαίας ερυθρουοκυτταρίωσης, κρεατινίνη αίματος αυξημένη. Όχι συχνές: Δερματικός ερυθριματώδης λύκος, πολυμόρφο ερύθημα. ALT= αμινοτρανσφεράση της αλανίνης, AST= ασπαρτική αμινοτρανσφεράση, ILD=διάσπαση πνευμονοπάθεια, N/n= αριθμός ασθενών, N/A=δεν εφαρμόστηκε. ^aΟι PT αναγράφονται σύμφωνα με το MedDRA 17.1. ^bΟι λοιμώξεις περιλαμβάνουν όλους τους PT που αποτελούν μέρος της Κατηγορίας Οργανικού Συστήματος «Λοιμώξεις και παρασιτώσεις». ^cΗ ουδετεροπενία περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Ουδετεροπενία, Αριθμός ουδετεροφίλων μειωμένος. ^dΗ λευκοπενία περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Λευκοπενία, Αριθμός λευκοκυττάρων μειωμένος. ^eΗ αναιμία περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Αναιμία, Αιμοσφαιρίνη μειωμένη, Αιματοκρίτης μειωμένος. ^fΗ θρομβοπενία περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Θρομβοπενία, Αριθμός αιμοπεταλίων μειωμένος. ^gΗ στοματίτιδα περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Αφθώδης στοματίτιδα, Χειλίτιδα, Γλωσσίτιδα, Γλωσσοδυνία, Εξέλκωση στο στόματος, Φλεγμονή βλεννογόνου, Άλγος στο στόματος, Στοματοφαρυγγική δυσφορία, Στοματοφαρυγγικό άλγος, Στοματίτιδα. ^hΤο εξάνθημα περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Εξάνθημα, Κηλοδερματίτιδα εξάνθημα, Κνησμώδες εξάνθημα, Ερυθηματώδες εξάνθημα, Βλατιδώδες εξάνθημα, Δερματίτιδα, Δερματίτιδα ομοιάζουσα με ακμή, Τοξικό εξάνθημα δέρματος. ^h Η ILD/πνευμονίτιδα περιλαμβάνει κάθε αναφερόμενο PT που αποτελεί μέρος του Τυποποιημένου Ερωτηματολόγιου MedDRA για τη διάμεση πνευμονοπάθεια (με τη στενή έννοια). ⁱ Η φλεβική θρομβοεμβολία περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: πνευμονική εμβολή, εμβολή, εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, περιφερικός εμβολισμός, θρόμβωση.Στον παρακάτω Πίνακα αναφέρονται οι εργαστηριακές παθολογικές τιμές που παρατηρήθηκαν σε συγκεντρωτικό σύνολο δεδομένων 3 τυχαιοποιημένων μελετών (N = 872).

Εργαστηριακές παθολογικές τιμές	IBRANCE συν λετροζόλη ή φουλβεστράντη			Σκέλη συγκριτικού παράγοντα*		
	Κάθε Βαθμού %	Βαθμού 3 %	Βαθμού 4 %	Κάθε Βαθμού %	Βαθμού 3 %	Βαθμού 4 %
WBC μειωμένα	97,4	41,8	1,0	26,2	0,2	0,2
Ουδετερόφιλα μειωμένα	96,6	57,5	11,7	17,0	0,9	0,6
Κρεατινίνη αίματος αυξημένη	95,5	1,6	0,3	86,8	0,0	0,0
Αναιμία	80,1	5,6	Δ/ι	42,1	2,3	Δ/ι
Αιμοπεταλία μειωμένα	65,2	1,8	0,5	13,2	0,2	0,0
ALT αυξημένη	55,5	3,9	0,0	43,3	2,1	0,0
AST αυξημένη	46,1	2,5	0,1	33,2	0,4	0,0

WBC=λευκά αιμοσφαίρια, AST=ασπαρτική αμινοτρανσφεράση, ALT=αμινοτρανσφεράση της αλανίνης, N=αριθμός ασθενών, Δ/ι=δεν ισχύει. Σημείωση: Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων βαθμολογούνται ανάλογα με τον βαθμό βαρύτητας της έκδοσης 4.0 των NCI CTCAE. * λετροζόλη ή φουλβεστράντη. **Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών**. Συνολικά, ουδετεροπενία οποιουδήποτε βαθμού αναφέρθηκε σε 716 (82,1%) ασθενείς που έλαβαν IBRANCE ανεξαρτήτως συνδυασμού, με ουδετεροπενία Βαθμού 3 να έχει αναφερθεί σε 500 (57,3%) ασθενείς και ουδετεροπενία Βαθμού 4 να έχει αναφερθεί σε 97 (11,1%) ασθενείς. Ο διάμεσος χρόνος μέχρι το πρώτο επεισόδιο ουδετεροπενίας οποιουδήποτε βαθμού ήταν 15 ημέρες (12-700 ημέρες) και η διάμεση διάρκεια ουδετεροπενίας Βαθμού ≥ 3 στις 3 τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ήταν 7 ημέρες. Εμπύρετη ουδετεροπενία αναφέρθηκε στο 0,9% των ασθενών που έλαβαν IBRANCE σε συνδυασμό με φουλβεστράντη και στο 1,7% των ασθενών που έλαβαν palcicicilb σε συνδυασμό με λετροζόλη. Εμπύρετη ουδετεροπενία αναφέρθηκε σε περίπου 2% των ασθενών που εκτέθηκαν στο IBRANCE κατά τη διάρκεια του συνολικού κλινικού προγράμματος. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών. Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιπρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιουδήποτε πιθανολογούμενης ανεπιθύμητης ενέργειας μέσω: **ΕΛΛΑΔΑ:** Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040337, Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitirnikarta.gr>, **Κύπρος:** Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Τηλ: +357 22608607, Φαξ: +357 22608669, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs, **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Βέλγιο. **ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:** Pfizer Ελλάς Α.Ε., Λ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα, Τηλ.: +30 210 6785800. **ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:** Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch), Λεωφόρος Αθλάσας 26, 2018 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22 617690. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** EU/1/16/1147/001, 003, 005. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 05/2024. **75 MG BT X 21 CAPS, 100 MG BT X 21 CAPS, 125 MG BT X 21 CAPS:** **ΔΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ - ΕΛΛΑΔΑ:** Λ.Τ.: 2.449,80 €, Ν.Τ.: 2.017,45 €. **ΔΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ - ΚΥΠΡΟΣ:** Λ.Τ.: 2.633,55€. **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής. **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:** Με ιατρική συνταγή. **ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ.**

Χορηγοί

AMGEN

anaBIOsis

AstraZeneca

Bayer

BIANEE
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Bristol Myers Squibb®

DEMO ABEE
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

FARAN
 ONCOLOGY

Galenica a.e.

Genekor
 Committed to Biotechnological Innovation

GENESIS
 pharma

GILEAD
 Oncology

GSK

INTEGRIS
 PHARMA

IPSEN

Janssen Oncology
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF Johnson & Johnson

Lavipharm

Lilly
 ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

medicair

MERCK

MSD

NORDIGA MD
 WE CARE FOR YOUR HEALTH

Pfizer
 Oncology

Pierre Fabre
 FARMAKA S.A.

RAFARM

Roche

SERVIER
 moved by you

VIATRIS

WinMedica

Σημειώσεις

5th WEB SCIENTIFIC EVENT
PAVING INNOVATION
in Cancer Treatment
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
στην **Ογκολογία**

27
28
Σεπτεμβρίου 2024

Διοργάνωση:
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
& ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Watch live on
www.livemed.gr



5th WEB SCIENTIFIC EVENT
PAVING INNOVATION
in Cancer Treatment
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
στην **Ογκολογία**

Γραμματεία:  Events & Travel Solutions

E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.

Ελ. Βενιζέλου 154 • 171 22 Ν. Σμύρνη • Τηλ.: 210-98 80 032, Fax: 210-98 81 303 • **Website:** www.events.gr • **E-mail:** ets@events.gr