

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ



ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Σε συνεργασία με την Αιματολογική Κλινική
του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης



© 2025 E.T.S. EVENTS & TRAVEL SOLUTIONS

7^ο Έτος

ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ
ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ
ΣΤΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ:

Χορηγούνται
21 Μόρια
Συνεχιζόμενης
Ιατρικής
Εκπαίδευσης
(CME – CPD)

Νεότερες εξελίξεις στη βιολογία και
θεραπεία των αιματολογικών νόσων

30 ΜΑΪΟΥ - 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ **RAMADA PLAZA THRACI**

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



XOSPATATM

gilteritinib 40mg tablets



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΠΡΟΪΟΝ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ -5%
XOSPATA F.C.TAB 40MG/TAB BΤx84 δισκία σε blisters (OPA/αλουμινίου/PVC/αλουμινίου)	GILTERITINIB	15.485,14 €	14.131,74 €	13.425,15 €

Περιορισμένη Ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως και περιλαμβάνονται στη συνοπτική περιγραφή χαρακτηριστικών του προϊόντος και το φύλλο οδηγιών χρήσης του φαρμάκου.

XOS/ADV1/10.2024 MAT-GR-XOS-2024-00006



Astellas Pharmaceuticals A.E.B.E.
Λ.Κηφισίας 7 & Νεαπόλεως 2
15123 Μαρούσι Αττικής
Τηλ: 210-81899900
www.astellas.com/gr



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί Φίλοι και Συνάδελφοι,

Η 7^η ετήσια εκδήλωση Αιματολογίας στην ακριτική μας πόλη πλησιάζει. Ετοιμάζουμε με μεράκι ένα διαδραστικό πρόγραμμα με προκλινικούς φοιτητές και νέους Αιματολόγους σε πρώτο πλάνο και τους εμπειρότερους στην καθοδήγηση και το σχολιασμό. Οι τελευταίες εξελίξεις στην Αιματολογία θα παρουσιαστούν από εκλεκτούς Έλληνες συναδέλφους και μεγάλα διεθνή ονόματα που θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους: Ειρήνη Παπαπέτρου (Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, NY, USA), Amer Zeidan (Yale University), Moshe Mittelman (Tel Aviv Sourasky Medical Center) και άλλους.

Όπως όμως και κάθε χρόνο οι ασθενείς θα έχουν την τιμητική τους στην εναρκτήρια ομιλία του συνεδρίου που θα αφορά την υλοποίηση κοινών δράσεων της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου.


Σας περιμένουμε όλους για να μαγευτούμε και φέτος από την περίτεχνη διασύνδεση της Αιματολογίας με την κλινική και την έρευνα.

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου

Ιωάννης Κοτσιανίδης
Καθηγητής Αιματολογίας Δ.Π.Θ.
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης



Μας εμπνέει ένα μοναδικό όραμα:
Να αλλάζουμε τη ζωή των ασθενών
αξιοποιώντας την επιστήμη™



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.bms-greece.gr



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

30 ΜΑΪΟΥ

2025

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

08:00 - 09:00 Ομάδα Εργασίας Φοιτητών

09:00 - 10:30 Περιπτώσεις ασθενών Ι - Φοιτητές Ιατρικής Δ.Π.Θ

Περίπτωση 1. Περίπτωση ΜΔΣ	Μ. Χαμζαδάκη
Περίπτωση 2. Περίπτωση Λεμφοβλαστικής λευχαιμίας	Π. Κεϊσίδης
Περίπτωση 3. Περίπτωση διφαινοτυπικής λευχαιμίας	Ζ. Παπαδοπούλου
Περίπτωση 4. Περίπτωση PNH	Χ. Δουλαδίκη
Σχολιασμός - Συζήτηση: Χ. Μισίδου, Μ. Παπουτσέλης	

10:30 - 12:00 Περιπτώσεις ασθενών ΙΙ

Περίπτωση 1. Περίπτωση χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας	Ι. Νικολαΐδου
Περίπτωση 2. Περίπτωση λεμφώματος με λεισμανίαση	Σ. Βουτίδου
Περίπτωση 3. Περίπτωση θρομβοκυττάρωσης	Κ.-Μ. Τσάκα
Περίπτωση 4. Περίπτωση ηωσινοφιλίας	Ι. Κοντογιώργη
Σχολιασμός - Συζήτηση: Μ. Παναγιωτόπουλος, Χ. Ρουμπάκης	

12:00 - 12:30 Μεσημβρινή Διακοπή - Ελαφρύ Γεύμα

12:30 - 13:00 Διάλεξη

Προεδρείο: **Ι. Κοτσιανίδης**

Σύγχρονη θεραπευτική στρατηγική στη ΧΛΛ **Θ. Χατζηκωνσταντίνου**

13:00 - 13:30 Δορυφορική Διάλεξη

Προεδρείο: **Κ. Λιάπης**

Sponsored by **Swixx** Modern Medicines for AL BioPharma

Η θέση της ζανουμπρουτινίμπης στο θεραπευτικό αλγόριθμο της Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας **Χ. Καλπαδάκη**

13:30 - 14:00 Δορυφορική Διάλεξη

Προεδρείο: **Μ. Αγγελοπούλου**

Sponsored by **abbvie**

Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία και Θεραπείες Πεπερασμένης Διάρκειας: Λήψη Αποφάσεων και Σύγχρονη Διαχείριση **Α. Μπαντή**

14.00 - 14.20 Δορυφορική Διάλεξη

Προεδρείο: **Κ. Λιάπης**

Sponsored by **Johnson&Johnson**

Νεότερα δεδομένα και θεραπευτικές στρατηγικές στην 1^η γραμμή της ΧΛΛ: Με οδηγό τις θεραπείες περιορισμένου χρόνου **Γ. Βραχιώλιας**

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΚΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ

Nucala (μεπολιζουμάμπη) ενδείκνυται ως επιπρόσθετη
θεραπεία για¹:



Σοβαρό Ανθεκτικό Ηωσινοφιλικό Άσθμα (SEA)
σε ασθενείς ηλικίας 6 ετών και άνω



Χρόνια Ρινοκολπίτιδα με Ρινικούς Πολύποδες (CRSwNP)
σε ασθενείς ηλικίας 18 ετών και άνω



Ηωσινοφιλική Κοκκιωματώση με Πολυαγγειίτιδα (EGPA)
σε ασθενείς ηλικίας 6 ετών και άνω



Υπερηωσινοφιλικό Σύνδρομο (HES) σε ασθενείς
ηλικίας 18 ετών και άνω

Εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά, οι εικόνες και τα προφίλ ασθενών
προσρίζονται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς.

Για την Περίληψη των
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
σκανάρετε το **QR code**.
Σε έντυπη μορφή είναι
διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως
στην εταιρεία.



Σύνοψη Προφίλ ασφαλείας¹:

Σοβαρό ηωσινοφιλικό άσθμα: Σε μελέτες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο σε ενήλικες και εφήβους ασθενείς με σοβαρό ανθεκτικό ηωσινοφιλικό άσθμα, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν κεφαλαλγία (20%), αντιδράσεις στη θέση ένεσης (8%) και οσφυαλγία (6%).

CRSwNP: Σε μία ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη σε ασθενείς με CRSwNP, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν κεφαλαλγία (18%) και οσφυαλγία (7%).

EGPA: Σε μία ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη σε ασθενείς με EGPA, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν κεφαλαλγία (32%), αντιδράσεις στη θέση ένεσης (15%) και οσφυαλγία (13%). Συστηματικές αλλεργικές αντιδράσεις/ αντιδράσεις υπερευαισθησίας αναφέρθηκαν από το 4% των ασθενών με EGPA.

HES: Σε μία ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη σε ασθενείς με HES, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν κεφαλαλγία (13%), ουρολοίμωξη (9%), αντιδράσεις στη θέση ένεσης και πυρεξία (7% η κάθε μία).

Βιβλιογραφία:

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Nucala, Ιούνιος 2024.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η εικόνα και το προφίλ ασθενούς χρησιμοποιείται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς. Το Nucala θα πρέπει να χορηγείται από ιατρούς με εμπειρία στη διάγνωση και την αντιμετώπιση του σοβαρού ανθεκτικού ηωσινοφιλικού άσθματος, της CRSwNP, της EGPA ή και του HES.

Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

Λ.Τ.*: NUCALA INJ SOL 100MG 1 προγεμισμένη σύριγγα: 970,60 € NUCALA INJ SOL 100MG 1 προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας: 970,60 € % επικονήσεως από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

*αφορά μόνο σε πωλήσεις ιδιωτικού φαρμακείου.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK.

©2024 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Ομίλου GSK.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΑΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
www.gr.gsk.com



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

30 ΜΑΪΟΥ

2025

14:20 - 14:50

Δορυφορική Διάλεξη

Προεδρείο: **Θ. Βασιλακόπουλος**

Sponsored by



Επεκτείνοντας τα πλεονεκτήματα της BTK αναστολής σε ασθενείς με Υ/Α Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία

Ε. Βέρρου

14:50 - 15:10

Δορυφορική Διάλεξη

Προεδρείο: **Ι. Κοτσιανιδης**

Sponsored by



Συνεχιζόμενη έναντι πεπερασμένης διάρκειας θεραπεία: Ο ασθενής με ΧΛΛ στο επίκεντρο

Θ. Βασιλακόπουλος

15:10 - 15:30

Διάλειμμα Καφέ

15:30 - 16:30

Στρογγυλό Τραπέζι

Νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις στα λεμφώματα

Προεδρείο: **Θ. Βασιλακόπουλος, Γ. Πάγκαλης**

15:30 - 16:00

Περιπτώσεις ασθενών με λέμφωμα Hodgkin

Περίπτωση 1.

Περίπτωση 2.

Σχολιασμός: Σ. Σαχανάς

Α. Πιπερίδου

Γ. Καριανάκης

16:00 - 16:30

Περιπτώσεις ασθενών με DLBCL

Περίπτωση 1.

Περίπτωση 2.

Σχολιασμός: Σ. Παπαγεωργίου

Π. Βρυτιιά

Ι. Μαρκάκη

16:30 - 17:00

Δορυφορική Διάλεξη

Προεδρείο: **Ι. Μπάτσης**

Sponsored by



Αντιμετώπιση ασθενών με ΔΛΜΒΚ και Οζώδες Λέμφωμα. Τι μπορούμε να πετύχουμε με ADCs και αντισώματα διπλής ειδικότητας;

Α. Μπαντή

17:00 - 17:20

Διάλειμμα καφέ

17:20 - 18:20

Στρογγυλό Τραπέζι

Νεότερες εξελίξεις στα σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας

Προεδρείο: **Α. Γαλανόπουλος, Β. Παππά**

17:20 - 17:50

Αναζητώντας μνηστήρες για την αζακυτιδίνη στα ΥΚ - ΜΔΣ

Π. Διαμαντόπουλος

Σχολιασμός: Ν. Βύνιου

17:50 - 18:20

Τρέχουσες μελέτες του τμήματος ΜΔΣ

Α. Μπούχλα

Σχολιασμός: Β. Παππά



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΕΧΕΙ & ΔΙΑΡΚΕΙ^{1-4*}

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕ
LR-MDS & β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ¹⁻⁴

Reblozyl®
(luspatercept)

*LR-MDS: σε ασθενείς TD χωρίς προηγούμενη έκθεση σε ESA: REBLOZYL® έναντι εποετίνης άλφα
β-θαλασσαιμία: NTD & TD ασθενείς: REBLOZYL® έναντι εικονικού φαρμάκου

Βιβλιογραφία: 1. REBLOZYL®, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 02/2025 2. Cappellini MD et al, A phase 3 trial of Luspatercept in Patients with Transfusion-Dependent b-Thalassemia; N Engl J Med 2020; 382: 1219-31. DOI: 10.1056/NEJMoa1910182 3. Taher AT et al, Luspatercept for the treatment of anaemia in Non-Transfusion-Dependent b-Thalassemia (BEYOND): a phase 2, randomised, double-blind, multicentre, placebo-controlled trial. Lancet Haematol. 2022;9(10):e733-e744. 4. Della Porta M. G., Garcia-Manero G., Santini V., et al. Luspatercept versus epoetin alfa in erythropoiesis stimulating agent-naïve, transfusion-dependent, lower-risk myelodysplastic syndromes (COMMANDS): primary analysis of a phase 3, open-label, randomised, controlled trial. Lancet Haematol 2024; published online July 19. [https://doi.org/10.1016/S2352-3026\(24\)00203-5](https://doi.org/10.1016/S2352-3026(24)00203-5). Lancet Haematology 2024



Bristol-Myers Squibb A.E.
Αττικής 49-53 & Προποντιδός 2,
Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική
ΤΘ 63883 - Βριλήσσια,
Τ.Κ. 152 03, Αττική
Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400,
Φαξ 210 6074333
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

Ενδείξεις:

- Το Reblozyl ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες για τη θεραπεία της εξαρτώμενης από μεταγγίσεις αναμίας λόγω μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων (ΜΔΣ) με πολύ χαμηλό, χαμηλό και ενδιάμεσο κίνδυνο
- Το Reblozyl ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες για τη θεραπεία της αναμίας που σχετίζεται με την εξαρτώμενη από μεταγγίσεις και τη μη εξαρτώμενη από μεταγγίσεις βήτα-θαλασσαιμία

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:

Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562
Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585,
Ιστοτόπος: www.eof.gr

Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας CY-1475 Λευκωσία
Τηλ: +357 22608607, Φαξ: + 357 22608669,
Ιστοτόπος: www.moh.gov.cy/phs

Λιανική Τιμή:

Ελλάδα: REBLOZYL® 25mg 1.249,02 €, REBLOZYL® 75mg 3.639,57 €
Κύπρος: REBLOZYL® 25mg 1.474,77 €, REBLOZYL® 75mg 4.232,95 €

Συνομογραφίες:

LR-MDS: μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο χαμηλότερου κινδύνου, ESA: ερυθροποιητίνη, TD: εξάρτηση από μεταγγίσεις, NTD: χωρίς εξάρτηση από μεταγγίσεις

Blue Box: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή.
Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από ιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας και να ανατρέξετε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάροντας το QR code.



Ημερομηνία Αναθεώρησης Κειμένου:
02/2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
www.kitrinikarta.gr



ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ
ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΤΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ:
ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

30 ΜΑΪΟΥ

2 0 2 5

18:20 - 18:50

Δορυφορικό

Sponsored by  Bristol Myers Squibb

Προεδρείο: **Α. Συμεωνίδης**

Θεραπείες 1ης γραμμής για την αντιμετώπιση της
αναμίας των LR - MDS

Σ. Παπαγεωργίου

18:50 - 19:30

Keynote lecture

Chair: **I. Kotsianidis**

The boulevard of Broken dreams for novel therapies of higher
risk MDS: Lessons learned from failed pivotal trials

A. Zeidan

19:30 - 20:10

Keynote lecture

Chair: **I. Kotsianidis**

Mechanisms of resistance to Venetoclax

E. Papapetrou

20:10 - 20:45

Τελετή Έναρξης - Χαιρετισμοί

20:45 - 21:30

Εναρκτήριο Ομιλία

Προεδρείο: **Γ. Βασιλόπουλος**

Οδοί συνεργασίας και κοινής δράσης της ΕΛΛΟΚ με την ΕΑΕ

Γ. Καπετανάκης

Σχολιασμός:

- **Χ. Παλαιολόγου**, Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φίλων Νομού Έβρου
“ΣυνεχίζΩ»
- **Ε. Ορφανού**, Επιστημονικά Υπεύθυνη για την ΠΦΥ και Δευτεροβάθμια
Περίθαλψη στην Ένωση Σπάνιων Ασθενών Ελλάδας
- **Ρ. Κοκκινάκη**, Πρόεδρος Σύλλογου Καρκινοπαθών και Φίλων Ν. Ροδόπης
“Δύναμη Ψυχής”
- **Β. Δήμος**, Πρόεδρος Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσαιμίας

Ο 1^{ος} εγκεκριμένος JAK1/2 & ACVR1 αναστολέας.¹

Μια θεραπεία για
τη διαχείριση της
ΣΠΛΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑΣ ή
των **ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ**
σε ασθενείς με
ΜΥΕΛΟΪΝΩΣΗ



μέτρια
έως σοβαρή
ΑΝΑΙΜΙΑ¹

Omjjara
mometinib

Για την Περίληψη
των Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος σκανάρετε το **QR code**.
Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη
κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.



Σύνοψη του προφίλ ασφάλειας¹:

Η ασφάλεια του Omjjara αξιολογήθηκε σε τρεις τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες με δραστικό παράγοντα, πολυκεντρικές μελέτες σε ενήλικες με μυελοϊνωση (MOMENTUM, SIMPLIFY-1, και SIMPLIFY-2). Σε αυτές οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν διάρροια (23%), θρομβοπενία (21%), ναυτία (17%), κεφαλαλγία (13%), ζάλη (13%), κόπωση (12%), εξασθένιση (11%), κοιλιακό άλγος (11%) και βήχας (10%). Η πιο συχνή σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια (Βαθμού ≥ 3) ήταν η θρομβοπενία (12%).

Βιβλιογραφία

1. Omjjara (mometinib) Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Ιανουάριος 2024

Λιανική Τιμή: € 5141,54

% επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: αναμένεται.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού/καταχώρησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος η οποία διατίθεται κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK. ©2024 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Ομίλου GSK

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
www.gr.gsk.com

GSK



ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΤΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ:

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΣΑΒΒΑΤΟ

31 ΜΑΪΟΥ

2025

09:00 - 10:30	Στρογγυλό Τραπέζι Πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες Προεδρείο: Ε. Σπανουδάκης, Κ. Τσαταλάς	
09:00 - 09:30	Περίπτωση ασθενούς με καρδιακή αμυλοείδωση (AL or ATTR) Σχολιασμός: Ε. Καστρίτης	Φ. Θεοδωρακάκου
09:30 - 10:00	Περίπτωση ασθενούς με τριπλά ανθεκτική νόσο - θεραπευτική αλληλουχία Σχολιασμός: Ν. Γιαννακούλας	Γ. Φωτιάδης
10:00 - 10:30	Περίπτωση ηλικιωμένου ασθενούς με PS:0 και πρωτοδιαγνωσθεν μυέλωμα σταθερού κινδύνου Σχολιασμός: Ε. Κατωδρότου	Α. Δάιου
10:30 - 10:50	Δορυφορική Διάλεξη Προεδρείο: Ε. Σπανουδάκης Βελτιστοποιώντας την 1η γραμμή θεραπείας στο ΠΜ: Καينوτομία, αποτελέσματα και εξατομίκευση	<i>Sponsored by</i> Johnson&Johnson Ν. Κανέλλιας
10:50 - 11:20	Διάλειμμα Καφέ	
11:20 - 13:20	Στρογγυλό Τραπέζι Θεραπευτικές εξελίξεις στις οξείες λευχαιμίες Προεδρείο: Μ. Παγώνη, Ι. Σακελλάρη	
11:20 - 11:50	Περίπτωση ασθενούς με θεραπεία συντήρησης ΟΜΛ Σχολιασμός: Μ. Παπαθανασίου	Β. Καναβά
11:50 - 12:20	Περίπτωση Philadelphia - like οξείας Λεμφοβλαστικής Λευχαιμίας Σχολιασμός: Γ. Βραχιώλιας	Λ. Ιγγλέζου
12:20 - 12:50	Περίπτωση ασθενούς με ΟΛΛ και θεραπεία με CAR - T κύτταρα Σχολιασμός: Ζ. Μπούσιου	Γ. Σαλβαράς
12:50 - 13:20	Ο ρόλος του NGS στη διάγνωση και παρακολούθηση των ΟΜΛ & ΟΛΛ	Μ. Γαροφαλάκη
13:20 - 14:50	Στρογγυλό Τραπέζι: Ασυνήθη αιματολογικά νοσήματα (1) Προεδρείο: Σ. Βακαλοπούλου, Β. Γαρυπίδου	
13:20 - 13:50	Νεότερα δεδομένα στις πορφυρίες	Η. Πέσσαχ
13:50 - 14:20	Νόσος Gaucher	Μ. Διαμαντίδης
14:20 - 14:50	Σύνδρομο VEXAS	Φ. Κλωνιζάκης
14:50 - 15:20	Μεσημβρινή Διακοπή - Ελαφρύ Γεύμα	

Η SANDOZ στην Αιματολογία

RIXATHON®
rituximab

Lenalidomide/Sandoz

Azacitidine/Sandoz

Bortezomib/Sandoz

 **ZIEXTENZO®**
pegfilgrastim

 **ZARZIO®**
filgrastim

SANDOZ

Rixathon • Ziextenzo • Zarzio
KAK: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, ΑΥΣΤΡΙΑ

LENALIDOMIDE/SANDOZ • BORTEZOMIB/SANDOZ • AZACITIDINE/SANDOZ
KAK: Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, S.I-1000, Ljubljana, ΣΛΟΒΕΝΙΑ





ΣΑΒΒΑΤΟ

31 ΜΑΪΟΥ

2025

15:20 - 16:50	Στρογγυλό Τραπέζι: Ασυνήθη αιματολογικά νοσήματα (2) Προεδρείο: Ε. Βλαχάκη, Π. Παναγιωτίδης	
15:20 - 15:50	Αναστολή των JAK κινασών στη μυελοίνωση	Β. Παρδάλης
15:50 - 16:20	Ο ρόλος του Αιματολόγου στις παθήσεις του συμπληρώματος	Ε. Γαβριηλάκη
16:20 - 16:50	Ασυνήθεις περιπτώσεις αιμόλυσης	Μ. Μαλκότς
16:50 - 17:10	Δορυφορική Διάλεξη Προεδρείο: Ι. Κοτσιανίδης	<i>Sponsored by</i> AstraZeneca 
	Συνδυαστική αναστολή του συμπληρώματος στην PNH: Στοχεύοντας την εξωαγγειακή αιμόλυση χωρίς να διακυβεύεται η αναστολή του τελικού συμπληρώματος	Κ. Λιάπης
17:10 - 17:40	Δορυφορική Διάλεξη Προεδρείο: Σ. Βακαλοπούλου, Π. Παναγιωτίδης	<i>Sponsored by</i>  AOP ORPHAN FOCUS ON RARE DISEASES
	PV: Η σημασία της μοριακής ανταπόκρισης και ο ρόλος της RoreglIFN	Θ. Βασιλακόπουλος
17:40 - 18:10	Διάλειμμα Καφέ	
18:10 - 20:40	Recent progress in diagnosis and management of Myelodysplastic Neoplasms Chairs: I. Kotsianidis, B. Turgut	
18:10 - 18:40	Is Bone marrow examination still required for all hematology patients? The example of MDS	M. Mittelman
18:40 - 19:10	Management of patients with unexplained cytopenia	Ch. Pontikoglou
19:10 - 19:40	Testing for familial MDS	P. Costeas
19:40 - 20:10	Novel treatments in lower - risk MDS	E. Akar
20:10 - 20:40	The contribution of AI in MDS	E. Hatzimichael



ONCOLOGY

 **ADCetris**[®]
brentuximab vedotin

 **LIVTENCITY**[™] ▼
(maribavir) tablets
200mg

 **NINLARO**[™]
ixazomib capsules

 **ADYNOVI**
Rurioctocog alfa pegol
(Recombinant Coagulation Factor VIII)

 **ADVATE**
Octocog alfa (Recombinant Coagulation Factor VII)

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• ADCETRIS (Brentuximab Vedotin) PD.C.S.INF 50 mg/vial• LIVTENCITY (maribavir) tablets 200 mg/tab• NINLARO (ixazomib) capsules 4.0 mg/cap• NINLARO (ixazomib) capsules 3.0 mg/cap• NINLARO (ixazomib) capsules 2.3 mg/cap | <ul style="list-style-type: none">• ADYNOVI [rurioctocog alfa pegol, human coagulation factor VIII (rDNA)] PS.INJ.SOL 500 IU/2 ml/vial• ADYNOVI [rurioctocog alfa pegol, human coagulation factor VIII (rDNA)] PS.INJ.SOL 1000 IU/2 ml/vial• ADYNOVI [rurioctocog alfa pegol, human coagulation factor VIII (rDNA)] PS.INJ.SOL 2000 IU/5 ml/vial | <ul style="list-style-type: none">• ADVATE [octocog alfa, human coagulation factor VIII (rDNA)] PS.INJ.SOL 250 IU/5 ml/vial• ADVATE [octocog alfa, human coagulation factor VIII (rDNA)] PS.INJ.SOL 500 IU/5 ml/vial• ADVATE [octocog alfa, human coagulation factor VIII (rDNA)] PS.INJ.SOL 1000 IU/5 ml/vial | <ul style="list-style-type: none">• ADVATE [octocog alfa, human coagulation factor VIII (rDNA)] PS.INJ.SOL 1500 IU/5 ml/vial• ADVATE [octocog alfa, human coagulation factor VIII (rDNA)] PS.INJ.SOL 2000 IU/5 ml/vial• ADVATE [octocog alfa, human coagulation factor VIII (rDNA)] PS.INJ.SOL 3000 IU/5 ml/vial |
|---|--|--|--|

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το χρίγγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της Π.Χ.Π. για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Περατέρω πληροφορίες διατίθενται από τον τοπικό αντιπρόσωπο, κατόπιν αιτήσεως, ή περιλαμβάνονται στη συνοπτική περιγραφή χαρακτηριστικών των προϊόντων, των ΦΟΚ και τις μονογραφίες των φαρμάκων

Για Αναφορά Ανεπιθύμητης Ενέργειας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: • Τηλ: +30 210 6387 800 • email: AE.GRC@takeda.com

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Τοπικός αντιπρόσωπος: Takeda Ελλάς Α.Ε.

Green Plaza, Κτίριο Β, Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, 151 24, Μαρούσι, Τηλ: κέντρο: 2106387800, Fax: 2106387801 • www.takeda.gr

Takeda & Takeda logo are trademarks of Takeda Pharmaceutical Company Limited used under license.

© Copyrights 2024 Takeda HELLAS S.A. All rights reserved. C-APROM/GR/ADCE/0046, November 2024





ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ
ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΤΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ:
ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ
Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΚΥΡΙΑΚΗ

01 ΙΟΥΝΙΟΥ

2 0 2 5

09:00 - 11:00	Εργαστήριο Κυτταρικής και μοριακής Βιολογίας Προεδρείο: Π. Κολοβός, Ι. Μητρούλης	
09:00 - 09:20	Γενικές αρχές Κυτταρομετρίας Ροής	Ε. Λαμπριανίδου
09:20 - 09:40	Εφαρμογές της ΚΡ στην Αιματολογία	Χ. Κυμπαρίδου
09:40 - 10:00	Ερευνητικές εφαρμογές ΚΡ	Δ. Δημητρίου
10:00 - 10:20	Αλληλούχηση RNA	Π. Λιακόπουλος
10:20 - 11:00	Διαδραστική συνεδρία: κλινικές περιπτώσεις	Θ. Σπυρόπουλος
11:00 - 11:30	Διάλειμμα	
11:30 - 13:00	Στρογγυλό Τραπέζι: Αιματολογία και άλλες ειδικότητες (I) Προεδρείο: Θ. Βασιλακόπουλος, Κ. Λιάπης	
11:30 - 12:00	Άνοια και κλωνική αιμοποίηση Σχολιασμός: Ε. Καρανταλή	Η. Σταματίου
12:00 - 12:30	Ο ουδετεροπενικός πυρετός στην εποχή των πολυανθεκτικών μικροβίων	Π. Ραφαηλίδης
12:30 - 13:00	Θρομβοπενία στην σε κύηση Σχολιασμός: Ν. Νικολέττος	Α. Γερεντέ
13:00 - 13:15	Διάλειμμα	
13:15 - 14:30	Στρογγυλό Τραπέζι: Αιματολογία και άλλες ειδικότητες (II) Προεδρείο: Ζ. Μπεζιργιαννίδου, Μ. Παπουτσέλης	
13:15 - 13:40	Καρδιαγγειακή νόσος και Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο Σχολιασμός: Δ. Στάκος	Χ. Μισίδου
13:40 - 14:05	Στην διεπαφή Ογκολογίας & Αιματολογίας: Επείγουσες καταστάσεις Σχολιασμός: Δ. Ματθαίος	Τ. Κουκάκη
14:05 - 14:30	Ο ρόλος του PET/CT στη διάγνωση αιματολογικών νόσων	Π. Βαλσαμάκη
14:30 - 14:45	Συμπεράσματα Λήξη Συνεδρίου	



ABRYSVO™

Respiratory Syncytial Virus Vaccine

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία ή σκανάροντας το QR Code.

Ισχύουσα Περίληψη
Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος:



Για περαιτέρω
πληροφορίες:



▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 (Ανεπιθύμητες ενέργειες) της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.



Τοπικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα,
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα
Τηλ.: 210 6785800, Αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ 00024290100

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

PP-A1G-GRC-0054-NOV24



ΤΙΤΛΟΙ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Akar Emre	MD Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul
Costeas Paul	Executive Director at Karaiskakio Foundation. The Center for the Study of Hematological and other Malignancies (CSHM), University of Maryland
Mittelman Moshe	Professor of Medicine and Hematology Chairman, Israel Cancer Association, Chairman, Scientific Board, MDS Foundation, Past Chairman, Department of Medicine, Tel Aviv Sourasky Medical Center, Past President, Israel Society of Hematology
Papapetrou Eirini	MD, PhD Professor of Oncological Sciences, Hematology and Medical Oncology Founding Director of the Center for Advancement of Blood Cancer Therapies Icahn School of Medicine at Mount Sinai (ISMMS)
Targut Burhan	Professor of Hematology Medical Park Bahçelievler Hastanesi
Zeidan Amer	Professor of Internal Medicine (Hematology) Yale School of Medicine
Αγγελοπούλου Μαρία	Καθηγήτρια Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α., Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Βακαλοπούλου Σοφία	Καθηγήτρια Αιματολογίας Α.Π.Θ., Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»
Βαλσαμάκη Πιπίτσα	Επίκουρη Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Βασιλακόπουλος Θεόδωρος	Καθηγητής Αιματολογίας Ιατρικής Σχολής, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Βασιλόπουλος Γεώργιος	Καθηγητής Παθολογίας-Αιματολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Π.Γ.Ν. Λάρισας, Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών
Βέρρου Ευγενία	Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α', Αιματολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Βλαχάκη Ευθυμία	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιματολογίας-Αιμοσφαινοπαθειών Α.Π.Θ., Β' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»
Βουτίδου Στυλιανή	Φοιτήτρια Ιατρικής, Δ.Π.Θ.
Βραχιώλιας Γεώργιος	Αιματολόγος, Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Βρυτιά Πηνελόπη	Ειδικεύομενη Αιματολογίας, Β' ΠΠΚ, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
Βύνιου Νόρα-Αθηνά	Καθηγήτρια Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α., Ιατρικό Κέντρο Π. Φαλήρου
Γαβριηλάκη Ελένη	Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Α.Π.Θ.

SUOMICON®

Dexamethasone

10mg/5ml, ποσ. διάλ., 50ml

20mg/5ml, ποσ. διάλ., 30ml

Με ιατρική συνταγή

NEO

PRELOCORTIL®

Prednisolone

5mg/tab, διαλυτά δισκία x30

20mg/tab, διαλυτά δισκία x30



Με ιατρική συνταγή

PIRVER®

Prednisolone

5mg/ml, ποσ. διάλ., 60ml

10mg/ml, ποσ. διάλ., 60ml

Με ιατρική συνταγή

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για

ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Συν-προώθηση SUOMICON & PIRVER
Medicair Bioscience Laboratories CY LTD

Συν-προώθηση PRELOCORTIL
S.J.A. PHARM Ε.Π.Ε.

Υπεύθυνος Ιατρικής Ενημέρωσης

Medicair Bioscience Laboratories S.A.

Λαρίσιος 10, 15351 Παλλήνη, Αθήνα,

τ-φ 210 6669 603, e info@medicair.gr

www.medicair.gr

Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών των Προϊόντων,
επικοινωνήστε με τον επιστημονικά υπεύθυνο
της ιατρικής ενημέρωσης,
τηλ. επικοινωνίας: 210 669603,
e-mail: pharmacovigilance@medicair.gr, www.medicair.gr

PRELOCORTIL® SOLU.TAB 5MG/TAB BT x 30	18,30€
PRELOCORTIL® SOLU.TAB 20MG/TAB BT x 30	73,17€
PIRVER ORAL.SOL 5MG/ML BTx BOTTLE x 60ml	29,93€
PIRVER ORAL.SOL 10MG/ML BTx BOTTLE x 60ml	59,89€
SUOMICON ORAL.SOL 10MG/5ML BOTTLE x 50ml	49,44€
SUOMICON ORAL.SOL 20MG/5ML BOTTLE x 30ml	59,19€



ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ
ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΤΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ:

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ

Τ Ι Τ Λ Ο Ι Ο Μ Ι Α Π Τ Ω Ν - Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ω Ν

Γαλανόπουλος Αθανάσιος	Αιματολόγος, Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών
Γαροφαλάκη Μαρία	PhD, Βιολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη Εργαστηρίου Μοριακής Αιματολογίας, Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Γαρυπίδου Βασιλεία	Ομότιμη Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Γερντέ Αγγελική	MD, PhD, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Εξειδικευμένη στην Εμβρυομητρική Ιατρική, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Γεν. Γραμματέας Ε.Ε.Ε.Ι., Επιστημονική Συνεργάτης Γ' Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Α.Π.Θ
Γιαννακούλας Νικόλαος	Αναπληρωτής Καθηγητής Αιματολογίας, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Δάιου Αικατερίνη	Ειδικεύομενη Αιματολογίας, Αιματολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Δημητρίου Δεσποίνα	Μοριακή Βιολόγος, Εξωτερική Συνεργάτης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Δήμος Βασίλειος	Πρόεδρος Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσαιμίας
Διαμαντίδης Μιχαήλ	Αιματολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ., Επιστημονικά Υπεύθυνος, Αιματολογικό Τμήμα, Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου, Γ.Ν. Λάρισας
Διαμαντόπουλος Παναγιώτης	Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α., Α' Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Δουλαδίκη Χριστίνα	Φοιτήτρια Ιατρικής, Δ.Π.Θ.
Θεοδωρακάκου Φωτεινή	Ειδικεύομενη Αιματολογίας, Θεραπευτική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Ιγγλέζου Λυδία	Ειδικεύομενη Παθολογίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Καλπαδάκη Χριστίνα	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστηριακής Αιματολογίας, Διευθύντρια Αιματολογικού Εργαστηρίου, Πα.Γ.Ν.Η., Ηράκλειο, Κρήτη
Καναβά Βασιλική	Ειδικεύομενη Αιματολογίας, Αιματολογική Κλινική – Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Κανέλλιας Νικόλαος	Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Καπετανάκης Γεώργιος	Πρόεδρος ΔΣ, Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου-ΕΛΛΟΚ
Καρανταλή Ελένη	Επίκουρη Καθηγήτρια Νευρολογίας Δ.Π.Θ.
Καριανάκης Γρηγόριος	Ειδικεύομενος Αιματολογίας, Αιματολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Καστρίτης Ευστάθιος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α., Θεραπευτική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

Lenalidomide Krka

Caps 5mg, 10mg, 15mg, 20mg, 25mg



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lenalidomide Krka 5 mg σκληρά καψάκια, Lenalidomide Krka 10 mg σκληρά καψάκια, Lenalidomide Krka 15 mg σκληρά καψάκια, Lenalidomide Krka 20 mg σκληρά καψάκια, Lenalidomide Krka 25 mg σκληρά καψάκια. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει μονοϋδρική υδροχλωρική λεναλιδομίδη που ισοδυναμεί σε 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg ή 25 mg λεναλιδομίδης. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Σκληρό καψάκιο (καψάκιο) **Lenalidomide Krka 5 mg σκληρά καψάκια** Το καπάκι του καψακίου είναι μπλε, το σώμα του καψακίου είναι μπλε με εντυπωμένη την ένδειξη 5 σε μαύρο χρώμα. Το περιεχόμενο του καψακίου είναι κόνις χρώματος λευκού έως κίτρινου-λευκού ή έως καφέ-λευκού. Μέγεθος σκληρού καψακίου: 2, μήκος 18 ± 1 mm. **Lenalidomide Krka 10 mg σκληρά καψάκια** Το καπάκι του καψακίου είναι πράσινο, το σώμα του καψακίου είναι καφέ με εντυπωμένη την ένδειξη 10 σε λευκό χρώμα. Το περιεχόμενο του καψακίου είναι κόνις χρώματος λευκού έως κίτρινου-λευκού ή έως καφέ-λευκού. Μέγεθος σκληρού καψακίου: 0, μήκος 21 ± 1 mm. **Lenalidomide Krka 15 mg σκληρά καψάκια** Το καπάκι του καψακίου είναι καφέ, το σώμα του καψακίου είναι μπλε με εντυπωμένη την ένδειξη 15 σε μαύρο χρώμα. Το περιεχόμενο του καψακίου είναι κόνις χρώματος λευκού έως κίτρινου-λευκού ή έως καφέ-λευκού. Μέγεθος σκληρού καψακίου: 2, μήκος 18 ± 1 mm. **Lenalidomide Krka 20 mg σκληρά καψάκια** Το καπάκι του καψακίου είναι πράσινο, το σώμα του καψακίου είναι μπλε με εντυπωμένη την ένδειξη 20 σε μαύρο χρώμα. Το περιεχόμενο του καψακίου είναι κόνις χρώματος λευκού έως κίτρινου-λευκού ή έως καφέ-λευκού. Μέγεθος σκληρού καψακίου: 1, μήκος 19 ± 1 mm. **Lenalidomide Krka 25 mg σκληρά καψάκια** Το καπάκι του καψακίου είναι καφέ, το σώμα του καψακίου είναι καφέ με εντυπωμένη την ένδειξη 25 σε λευκό χρώμα. Το περιεχόμενο του καψακίου είναι κόνις χρώματος λευκού έως κίτρινου-λευκού ή έως καφέ-λευκού. Μέγεθος σκληρού καψακίου: 0, μήκος 21 ± 1 mm. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ** KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Σλοβενία. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ** Lenalidomide Krka 5 mg σκληρά καψάκια: EU/1/20/1519/004, Lenalidomide Krka 10 mg σκληρά καψάκια: EU/1/20/1519/008, Lenalidomide Krka 15 mg σκληρά καψάκια: EU/1/20/1519/010, Lenalidomide Krka 20 mg σκληρά καψάκια: EU/1/20/1519/012, Lenalidomide Krka 25 mg σκληρά καψάκια: EU/1/20/1519/014. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 15 Δεκεμβρίου 2021

Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: <http://www.ema.europa.eu>.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ / ΔΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ: Lenalidomide Krka caps 5mg/cap 21x1 καψάκια: 1.982,07€, Lenalidomide Krka caps 10mg/cap 21x1 καψάκια: 1.937,37€, Lenalidomide Krka caps 15mg/cap 21x1 καψάκια: 2.042,39€, Lenalidomide Krka caps 20mg/cap 21x1 καψάκια: 3.183,03€, Lenalidomide Krka caps 25mg/cap 21x1 καψάκια: 2.953,23€ Σε περίπτωση τροποποίησης του δελτίου τιμών ισχύει η νεότερη τιμή. Ενδείκνυται σε ενήλικες ασθενείς.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την πλήρη Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από τον KAK



BIANEΞ A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEΞ A.E. - Έδρα: Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά,
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία, Τηλ.: 210 8009111 • Fax: 210 8071573
E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113,
562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



BE-25015-LEN-5/2025


Κατωδρύτου Ειρήνη	Αιματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Αιματολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Κεϊσίδης Παναγιώτης	Φοιτητής Ιατρικής, Δ.Π.Θ.
Κλωνιζάκης Φίλιππος	MD, MSc, PhD, Αιματολόγος, Επιμελητής Α' Ε.Σ.Υ., Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας Β' Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»
Κοκκινάκη Ροδούλα	Πρόεδρος Σύλλογου Καρκινοπαθών και Φίλων Ν. Ροδόπης "Δύναμη Ψυχής"
Κολοβός Παναγιώτης	Φοιτητής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κοντογιώργη Ιωάννα	Φοιτήτρια Ιατρικής, Δ.Π.Θ.
Κοτσιανίδης Ιωάννης	Καθηγητής Αιματολογίας Δ.Π.Θ., Διευθυντής, Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Κουκάκη Τριανταφυλλιά	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Κυμπαρίδου Χρύσα	Μοριακή Βιολόγος, Εξωτερική Συνεργάτης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Λαμπριανίδου Ελευθερία	Μοριακός Βιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Λιακόπουλος Παναγιώτης	Μοριακή Βιολόγος, Εξωτερική Συνεργάτης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Λιάπης Κωνσταντίνος	Αιματολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Αιματολογίας Δ.Π.Θ., Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Μαλκότς Μπουσέ	Ειδικευόμενη Αιματολογίας, Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Μαρκάκη Ιουλία	Ειδικευόμενη Αιματολογίας, Β' ΠΠΚ, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
Ματθαίος Δημήτριος	Αναπληρωτής Καθηγητής Ογκολογίας, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Ογκολογικής Κλινικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μητρούλης Ιωάννης	Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μισίδου Χριστίνα	Ειδικευόμενη Αιματολογίας, Π.Γ.Ν Αλεξανδρούπολης
Μπαντή Αναστασία	Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α', Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Μπάτσης Ιωάννης	Αιματολόγος, Διευθυντής, Αιματολογική Κλινική – Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Μπεζιργιαννίδου Ζωή	Αιματολόγος, Διευθύντρια Αιματολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Μπούσιου Ζωή	Αιματολόγος, Επιμελήτρια Β', Αιματολογική Κλινική, Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων και Κυτταρικών Θεραπειών, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»



High hematocrit values¹

Thromboembolic events²

Disease progression²



**Getting
to the root
of PV^{1,2}**

Change
living with PV³

Next
generation
(interferon)^{2,3}

BESREMI[®] is indicated as monotherapy in adults for the treatment of polycythaemia vera without symptomatic splenomegaly.⁴

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
αντιβιοτικά
ΟΛΕΣ τις αναπαραγωγές ενέχουσες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπεριλαμβάνεται την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH
Member of the AOP Health Group
Leopold-Ungar-Platz 2, 1190 Vienna, Austria
www.aop-health.com

1. Austin RJ et al., (2020). Leukemia 34: 1075–1089 (doi: 10.1038/s41375-019-0638-y)
2. Abu-Zelnah G et al., (2022). Leukemia 36: 569-572 (doi: 10.1038/s41375-021-01447-3)
3. Gisslinger HG et al., (2020). Lancet Haematol. 7:e196-208 (doi: 10.1016/S2352-3026(19)30236-4.)
4. Summary of Product Characteristics (SmPC) BESREMI[®], current version

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται στο εκθετήριο.

ΕΛΛΑΔΑ: Ενδεικτική Τιμή ΒΤΧ1ΡΦ. PEN-2 βελόνες για ένεση: 1643,82€.

ΕΛΛΑΔΑ: Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.



ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ
ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΤΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ:

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ

Τ Ι Τ Λ Ο Ι Ο Μ Ι Α Π Τ Ω Ν - Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ω Ν

Μπούχλα Ανθή	Αιματολόγος, Επιμελήτρια Β' ΕΣΥ, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
Νικολαΐδου Ιόλη	Φοιτήτρια Ιατρικής, Δ.Π.Θ.
Νικολέττος Νικόλαος	Καθηγητής Γυναικολογίας-Μαιευτικής, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής, Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή», Δ.Π.Θ.
Ορφανού Εύη	Επιστημονικά Υπεύθυνη για την ΠΦΥ και Δευτεροβάθμια Περίθαλψη στην Ένωση Σπάνιων Ασθενών Ελλάδας
Πάγκαλης Γεράσιμος	Ομότιμος Καθηγητής Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής Ιατρικού Αθηνών-Ψυχικού
Παγώνη Μαρία	Αιματολόγος, Διευθύντρια, Αιματολογική Κλινική – Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Παλαιολόγου Χριστίνα	Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φίλων Νομού Έβρου "Συνεχίζω"
Παναγιωτίδης Παναγιώτης	Ομότιμος Καθηγητής Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α.
Παναγιωτόπουλος Εμμανουήλ	Ειδικεύμενος Παθολογίας, Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Παπαγεωργίου Σωτήριος	Αιματολόγος, Επιμελητής Α', Αιματολογική Μονάδα, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Παπαδοπούλου Ζωή	Φοιτήτρια Ιατρικής, Δ.Π.Θ.
Παπαθανασίου Μαρία	Αιματολόγος, Επιμελήτρια, Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Παπουτσέλης Μενέλαος	Αιματολόγος, Επιμελητής Α', Πανεπιστημιακή Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Παππά Βασιλική	Καθηγήτρια Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α., Αιματολογική Μονάδα, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Παρδάλης Βασίλειος	Αιματολόγος, Επιμελητής Αιματολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν»
Πέσσαχ Ηλίας	Αναπληρωτής Καθηγητής Αιματολογίας, ΔΙΠΑΕ, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Πυπερίδου Αλεξία	Ειδικεύμενος Αιματολογίας, Αιματολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Ποντίκογλου Χαράλαμπος	Αναπληρωτής Καθηγητής Αιματολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Αιματολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η., Ηράκλειο, Κρήτη
Ραφαηλίδης Πέτρος	Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική & Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Ρουμπάκης Χριστόφορος	Αιματολόγος, Επιμελητής Β' ΕΣΥ, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Lenalidomide Accord

Σκληρά καψάκια

5mg

10mg

15mg

20mg

25mg



Lena.03.02/2022

Ενδεικτική Λιανική Τιμή:

Lenalidomide Accord 5mg	2.452,25 €
Lenalidomide Accord 10mg	2.402,76 €
Lenalidomide Accord 15mg	2.526,86 €
Lenalidomide Accord 20mg	3.183,03 €
Lenalidomide Accord 25mg	2.953,23 €

Lenalidomide Accord Τρόπος Διάθεσης:

Περιορισμένη Ιατρική Συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και το Εκπαιδευτικό Υλικό για τους Επαγγελματίες Υγείας.



W M WinMedica
Serving Health for Life

Για περισσότερες πληροφορίες:

WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35, 15238 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827

info@winmedica.gr, www.winmedica.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Accord Healthcare S.L.U.

accord
The Evolution of Generics



Global Generics
& Biosimilars
AWARDS 2018
COMPANY OF
THE YEAR



ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ
ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΤΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ:

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ

Τ Ι Τ Λ Ο Ι Ο Μ Ι Α Π Τ Ω Ν - Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ω Ν

Σακελλάρη Ιωάννα	Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣΥ, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Σαλβαράς Γρηγόριος	Ειδικευόμενος Αιματολογίας, Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Σαχανάς Σωτήριος	Αιματολόγος, Αιματολογική Κλινική, Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού
Σπανουδάκης Εμμανουήλ	Αναπληρωτής Καθηγητής Αιματολογίας Δ.Π.Θ., Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Σπυρόπουλος Θεόδωρος	Μοριακός Βιολόγος, εξωτερικός συνεργάτης Δ.Π.Θ., Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Στάκος Δημήτριος	Καθηγητής Καρδιολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σταματίου Ηλιάνα	Ειδικευόμενη Παθολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Συμεωνίδης Ανάργυρος	Ομότιμος Καθηγητής Αιματολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Αιματολογικό Τμήμα, ΟΛΥΜΠΙΟ Θεραπευτήριο - Γενική Κλινική Πατρών, Πάτρα
Τσάκα Κωνσταντίνα-Μαρίνα	Φοιτήτρια Ιατρικής, Δ.Π.Θ.
Τσαταλάς Κωνσταντίνος	Ομότιμος Καθηγητής Αιματολογίας Α.Π.Θ.
Φωτιάδης Γεώργιος	Ειδικευόμενος Αιματολογίας, Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας
Χαμζαδάκη Μαρία	Φοιτήτρια Ιατρικής, Δ.Π.Θ.
Χατζηκωνσταντίνου Θωμάς	Αιματολόγος, Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝ.Ε.Β.), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Χατζημιχαήλ Ελευθερία	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιματολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ivor[®]
Bemiparin sodium

IvormaX[®]
Bemiparin sodium



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivor 2.500 IU anti-Xa/0,2 ml ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 2.500 IU (anti Factor Xa*) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα (ισοδύναμη με 12.500 IU (anti Factor Xa*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος). Η δραστηριότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστηριότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ: IVOR 2.500 IU anti-Xa/0,2 ml BT x 2 PFSYR A.T.: 5,83 €

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivor 3.500 IU anti-Xa/0,2 ml ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 3.500 IU (anti Factor Xa*) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα (ισοδύναμη με 17.500 IU (anti Factor Xa*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος). Η δραστηριότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστηριότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ: IVOR 3.500 IU anti-Xa/0,2 ml BT x 2 PFSYR A.T.: 10,74 € BT x 30 PFSYR A.T.: 120,83 €

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: IvormaX 25.000 IU anti-Xa/ml ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 25.000 IU (anti-Factor Xa*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος. Ισοδύναμη με: 5.000 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα, 7.500 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,3 ml προγεμισμένη σύριγγα, 10.000 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,4 ml προγεμισμένη σύριγγα. * Η δραστηριότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστηριότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ:** IVORMAX 25.000 IU anti-Xa/ml, BTx2PF: SYRx0,2ML A.T.: 23,40€, IVORMAX 25.000 IU anti-Xa/ml, BTx2PF: SYRx0,3ML A.T.: 26,43€, IVORMAX 25.000 IU anti-Xa/ml BTx2PF: SYRx0,4ML A.T.: 23,33€

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένες σύριγγες. (Άχρωμο ή ελαφρώς κιτρινωπό, διαυγές διάλυμα, ελεύθερο ορατών σωματιδίων). **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Προϊόν της LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A., ΙΣΠΑΝΙΑ. **Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας:** BIANEE A.E., Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 N. Ερυθραία, Κηφισιά, Τηλ. 2108009111. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** 24481/26-02-2020, 24482/26-02-2020, 24483/26-02-2020.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 06-04-2023 (Ivor), 12-07-2023 (IvormaX)

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον ΚΑΚ κατόπιν αιτήσεως.



BIANEE A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEE A.E. • Έδρα : Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 N. Ερυθραία, Κηφισιά
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 N. Ερυθραία • Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573
E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμίου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης • Τηλ.: 2310 861683

AP. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



VE-24236-IVO-9/2024



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οργάνωση:

Εταιρεία Βιοεπιστημών

Σε συνεργασία με την:

Αιματολογική Κλινική του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Ημερομηνία διεξαγωγής:

30 Μαΐου - 01 Ιουνίου 2025

Τόπος διεξαγωγής:

Ξενοδοχείο RAMADA PLAZA THRAKI, Αλεξανδρούπολη
4ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Θεσσαλονίκης
68 100 Αλεξανδρούπολη
Τηλ. +30 25510 89100

Εγγραφές:

Η εγγραφή και η παρακολούθηση επιτρέπεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας, καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να πιστοποιήσουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα (όπως η ταυτότητα ιατρικού ή φαρμακευτικού συλλόγου, νοσηλευτική ή φοιτητική ταυτότητα).

Οδηγίες Φυσικής Παρακολούθησης:

Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό badge (barcode), το οποίο θα πρέπει να σκανάρουν κατά την είσοδο και έξοδο τους στην αίθουσα.

Οδηγίες Διαδικτυακής Παρακολούθησης:

Εάν είστε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο www.livemed.gr (πατήστε στο πεδίο **Register / Εγγραφή**). Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο **Livemed** χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε από το μενού την κατηγορία **Live**, το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο **Go Live** ή **Go Virtual**.



Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την «**Αίθουσα Συνεδριάσεων**».



Σημείωση: Εφόσον επιθυμείτε να παραλάβετε πιστοποιητικό, είναι απαραίτητο μετά τη σύνδεσή σας στο Livemed να μεταβείτε στην εικονική «**Γραμματεία Συνεδρίου**» και να ολοκληρώσετε την «**Εγγραφή**» σας στην επιστημονική εκδήλωση πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο,



Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης:

Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν 21 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits).



Παραλαβή πιστοποιητικού:

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου σε όσους συμμετέχοντες έχουν εγγραφεί και παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος.

Για την παραλαβή του πιστοποιητικού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης. Ο αριθμός των Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ECMECs by the EACCME), θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης που θα καταγραφεί στο σύστημα καταμέτρησης (στην είσοδο της αίθουσας, για τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία και στην πλατφόρμα Livemed, για τους διαδικτυακούς συμμετέχοντες).

Σημείωση: Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα για λήψη έως 12 μήνες από τη λήξη της εκδήλωσης.

Γραμματεία:



Events & Travel Solutions

Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σμύρνη

Τηλ.: 210 98 80 032 • Website: www.events.gr

E-mail: ets@events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η Ε.Τ.Σ. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr.

χορηγοί

abbio

abbvie

AOP
HEALTH

astellas

AstraZeneca

BIANEE A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΕΔΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Bristol Myers Squibb

ELPEN

FARAN
HEMATOLOGY

GENESIS
pharma

GILEAD
Creating Possible

GSK

INTEGRIS
PHARMA

Johnson & Johnson

Lilly
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

LYSIS
BIOTECH

medicair

Pfizer
Oncology

Roche

SANDOZ

sanofi

SERVIER
moved by you

sobi
rare strength

Swixx BioPharma
Modern Medicines for All

Takeda | ONCOLOGY

WinMedica

AGILE



Ivosidenib and Azacitidine in IDH1-Mutated Acute Myeloid Leukemia¹

ΤΟ TIBSOVO® ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΖΑΚΙΤΙΔΙΝΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΟΔΙΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (ΟΜΛ) ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΙΣΟΚΙΤΡΙΚΗΣ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ-1 (IDH1) R132, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΥΠΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ²

1. P. Montesinos et al. N Engl J Med. 2022;386:1519-1531.

2. TIBSOVO® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος.

▼ Τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση.

Για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευθείτε τη συνοπτική Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που συμπεριλαμβάνεται στο παρόν πρόγραμμα.

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.



Για την πλήρη ΠΧΠ παρακαλούμε
σκανάρετε τον κωδικό QR.

TIBSOVO® F.C. TAB 250mg/tab ΦΙΛΛΗ (HDPE) x 60 ΔΙΣΚΙΑ:
Λ.Τ. 15.621,37€ - Ν.Τ. 12.990,56€
(Σε περίπτωση τροποποίησης του Δ.Τ. ισχύει η νεότερη τιμή)

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα
πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα Φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

SERVIER 
moved by you

SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ.
Φραγκοκλησιάς 7, 15125 Μαρούσι.
Τηλ 210 9391000, www.servier.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

ΣΥΝΘΕΣΗ*. Tibsovo 250mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 250 mg ιβουσιδενίμπης. **ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ***. Το Tibsovo σε συνδυασμό με αζακινιδίνη ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με νεοδιαγνωσθείσα οξεία μυελογενή λευχαιμία (ΟΜΛ) με μετάλλαξη ισοκριντικής αφυδρογονάσης-1 (IDH1) R132, οι οποίοι δεν είναι επιλέξιμοι να λάβουν τυπική εισαγωγική χημειοθεραπεία. Η μονοθεραπεία με Tibsovo ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με τοπικά προχωρημένα ή μεταστατικά χολαγγειοκαρκίνωμα με μετάλλαξη IDH1 R132, οι οποίοι υποβλήθηκαν προηγουμένως σε θεραπεία με τουλάχιστον μία προηγούμενη γραμμική συστηματική θεραπεία. **ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ***. Η θεραπεία θα πρέπει να ξεκινά υπό την επίβλεψη ιατρών με εμπειρία στη χρήση αντικαρκινικών φαρμακευτικών προϊόντων. Πριν από τη λήψη του Tibsovo, οι ασθενείς πρέπει να έχουν επιβεβαιωθεί η μετάλλαξη IDH1 R132 χρησιμοποιώντας μια κατάλληλη διαγνωστική εξέταση. **Οξεία μυελογενής λευχαιμία**: Η συνιστώμενη δόση είναι 500 mg ιβουσιδενίμπης (2 x 250 mg δισκία) λαμβανόμενα από στόματος άπαξ ημερησίως. Η ιβουσιδενίμπη θα πρέπει να λαμβάνεται από στόμα 1 Ημέρα 1 σε συνδυασμό με αζακινιδίνη σε 75 mg/m² επιφάνειας σώματος, ενδοφλέβια ή υποδόρια, μία φορά ημερησίως τις Ημέρες 1-7 κάθε κύκλου 28 ημερών. Ο πρώτος κύκλος θεραπείας της αζακινιδίνης θα πρέπει να χορηγείται στο 100% της δόσης. Συνιστάται οι ασθενείς να λαμβάνουν θεραπεία για τουλάχιστον 6 κύκλους. Για τη δοσολογία και το τρόπο χορήγησης της αζακινιδίνης, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στις πλήρεις πληροφορίες προϊόντος για την αζακινιδίνη. Η θεραπεία θα πρέπει να συνεχίζεται μέχρι την πρόοδο της νόσου ή έως ότου η θεραπεία δεν είναι πλέον ανεκτή από τον ασθενή. **Χολαγγειοκαρκίνωμα**: Η συνιστώμενη δόση είναι 500 mg ιβουσιδενίμπης (2 x 250 mg δισκία) λαμβανόμενα από στόματος άπαξ ημερησίως. Η θεραπεία θα πρέπει να συνεχίζεται μέχρι την πρόοδο της νόσου ή έως ότου η θεραπεία δεν είναι πλέον ανεκτή από τον ασθενή. **Τρόπος χορήγησης**: Το Tibsovo είναι για από στόματος χρήση. Τα δισκία λαμβάνονται άπαξ ημερησίως περίπου την ίδια ώρα κάθε ημέρα. Οι ασθενείς δεν πρέπει να τρώνε τίποτα για 2 ώρες πριν και 1 ώρα μετά τη λήψη των δισκίων. Τα δισκία πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα με νερό. Συνιστάται τροποποιήσεις της δόσης για τη διαχείριση της ταυτόχρονης χορήγησης μερίων ή ισχυρών αναστολέων του CYP3A4, του συνδρόμου διαφοροποίησης, της λευκοκυττάρωσης, της παράτασης του διαστήματος QTc και των ανεπιθύμητων ενεργειών βαθμού 3 ή υψηλότερου. **ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ***. • Υπερευαίσθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. • Συγχρόνηση ισχυρών επαγωγών του CYP3A4 ή δαβιγανόνη (βλ. Αλληλεπιδράσεις). • Συγγενές σύνδρομο μακροκό αιφνίδιου θανάτου ή πολυμορφικής κοιλιακής αρρυθμίας. • Διάστημα QT/QTc > 500 msec, ανεξάρτητα από τη μέθοδο διόρθωσης. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ***. **Σύνδρομο διαφοροποίησης σε ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία**: Το σύνδρομο διαφοροποίησης μπορεί να είναι απειλητικό για τη ζωή ή θανατηφόρο εάν δεν αντιμετωπιστεί. Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται για τα σημεία και τα συμπτώματα του συνδρόμου διαφοροποίησης, να συμβουλευούνται να επικοινωνήσουν αμέσως με τον ιατρό τους εάν αυτά εμφανιστούν και για την ανάγκη να έχουν πάντα μαζί τους την Κάρτα Προειδοποίησης Ασθενούς. Διακόψτε τη θεραπεία με Tibsovo εάν τα σοβαρά σημεία/συμπτώματα εμμένουν για περισσότερο από 48 ώρες μετά την έναρξη των συστηματικών κορτικοστεροειδών. **Παράταση του διαστήματος QTc**: Οποιοσδήποτε διαταραχές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα. Σε περίπτωση ενδεικτικής συμπτωματολογίας, θα πρέπει να διενεργείται ΗΚΓ όπως ενδείκνυται κλινικά. Σε περίπτωση σοβαρού εμέτου και/ή διάρροιας, πρέπει να γίνει αξιολόγηση των ηλεκτρολυτικών διαταραχών ορού, ιδιαίτερα της υποκαλσιαιμίας και του μαγνησίου. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τον κίνδυνο παράτασης του QT, τα σημεία και τα συμπτώματά του (αίσθημα παλμών, ζάλη, συγκοπή ή ακόμη και καρδιακή ανακοπή) και να συμβουλευούνται να επικοινωνήσουν αμέσως με τον ιατρό τους εάν αυτά εμφανιστούν. Η συγχρόνηση φαρμακευτικών προϊόντων που είναι γνωστό ότι παρατείνουν το διάστημα QTc, ή μερίων ή ισχυρών αναστολέων του CYP3A4, μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο παράτασης του διαστήματος QTc και θα πρέπει να αποφεύγονται, εφόσον είναι εφικτό, κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Tibsovo. Οι ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια ή ηλεκτρολυτικές διαταραχές θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά, με περιοδική παρακολούθηση των ΗΚΓ και των ηλεκτρολυτών, κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ιβουσιδενίμπη. Η θεραπεία με Tibsovo θα πρέπει να διακόπτεται οριστικά εάν οι ασθενείς εμφανίσουν παράταση του διαστήματος QTc με σημεία ή συμπτώματα απειλητικής για τη ζωή αρρυθμίας. Η ιβουσιδενίμπη πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς που είτε έχουν επίπεδο ηπατοκαρπιακής ή/και νεφρικής λειτουργίας ή είναι λιποβαρείς. **Σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία**: Το Tibsovo θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία και αυτός ο πληθυσμός ασθενών θα πρέπει να παρακολουθείται στενά. **Ηπατική δυσλειτουργία**: Το Tibsovo θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με μέτρια και σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία και αυτός ο πληθυσμός

ασθενών θα πρέπει να παρακολουθείται στενά. Το Tibsovo θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με ήπια ηπατική δυσλειτουργία (Child-Pugh τάξη Α). **Έκδοχα**: Το Tibsovo περιέχει λακτόζη. Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δισκίο, δηλαδή είναι ουσιαστικά «ελεύθερο νατρίου». **ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ***. **Αντενδείκνυται**: Ισχυροί επαγωγείς του CYP3A4, δαβιγανόνη. **Δεν συνιστάται**: μέτρια ή ισχυροί αναστολείς του CYP3A4, φαρμακευτικά προϊόντα που είναι γνωστό ότι παρατείνουν το διάστημα QTc, υποσπράσματα των CYP3A4, CYP2B6, CYP2C8 ή CYP2C9 με στενό θεραπευτικό δείκτη ή υποσπράσματα του CYP2C19, πρακοναζόλη ή η κετοκοναζόλη, υποσπράσματα της UGT. **Προφυλάξεις**: ορμονικά αντισυλληπτικά **ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ* ΚΥΗΣΗ***. Το Tibsovo δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης καθώς και σε γυναίκες της αναπαραγωγικής ηλικίας χωρίς τη χρήση αντισυλληπτικής. **ΓΑΛΟΥΧΙΑ***. Ο θηλασμός πρέπει να διακόπτεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Tibsovo και για τουλάχιστον 1 μήνα μετά την τελευταία δόση. **ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ/ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ***. Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία θα πρέπει να πραγματοποιούν ένα τεστ εγκυμοσύνης πριν από την έναρξη της θεραπείας με Tibsovo και θα πρέπει να αποφεύγουν να μείνουν έγκυες κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία και οι άνδρες με γυναικές συντρόφους σε αναπαραγωγική ηλικία θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντισυλληπτική κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Tibsovo και για τουλάχιστον 1 μήνα μετά την τελευταία δόση. **ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ***. Η ιβουσιδενίμπη έχει μικρή επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων. Σε ορισμένους ασθενείς που λαμβάνουν ιβουσιδενίμπη έχουν αναφερθεί κόπωση και ζάλη και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της ικανότητας του ασθενή να οδηγεί ή να χειρίζεται μηχανήματα. **ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ***. **Στην ΟΜΛ**: • **Πολύ συχνές**: Σύνδρομο διαφοροποίησης, Παράταση του διαστήματος QTc, Λευκοκυττάρωση, Θρομβοπενία, Ουδετεροπενία, Αϋνία, Κεφαλαλγία, Ζάλη, Έμετος, Άλγος άκρων, Αρθραλγία, Οσφυαλγία. • **Συνχές**: Λευκοπενία, Περιφερική νευροπάθεια, Στοματοφαρυγγικό άλγος. **Στο χολαγγειοκαρκίνωμα**: • **Πολύ συχνές**: Αναμία, Όρεξη μειωμένη, Περιφερική νευροπάθεια, Κεφαλαλγία, Ασέπτες, Διάρροια, Έμετος, Ναυτία, Κοιλιακό άλγος, Εξάνθημα, Κόπωση, Ασπαστική αμνοτρανοσφαιρίνη αυξημένη, Χολερυθρίνη αίματος αυξημένη. • **Συνχές**: Παράταση του διαστήματος QTc, Ίκτερος χολστατικός, Υπερχολερυθρίνη, Αμνοτρανοσφαιρίνη αυξημένη, Αριθμός λευκοκυττάρων μειωμένος, Αριθμός αιμοπεταλίων μειωμένος. **Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών**. Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιπλέον η συνεχής παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς:

Ελλάδα Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα Τηλ: + 30 21 32040337 Ιστότοπος: http://www.eof.gr http://www.kitirinkarta.gr	Κύπρος Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Υπουργείο Υγείας CY-1475 Λευκωσία Τηλ: +357 22608607 Φαξ: +357 22608669 Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs
---	---

ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑ*. **ΚΑΤΑΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ**. Η ιβουσιδενίμπη είναι ένας αναστολέας του μεταλλαγμένου ενζύμου IDH1. Το μεταλλαγμένο IDH1 μετατρέπει το α-κετογλουταρικό οξύ (α-KG) σε 2-υδροξυ-γλουταρικό (2-HG), το οποίο εμποδίζει την κυτταρική διαφοροποίηση και προάγει την ογκογένεση τόσο σε αιματολογικές όσο και σε μη αιματολογικές κακοήθειες. Ο μηχανισμός δράσης της ιβουσιδενίμπης, πέραν της ικανότητάς της να μειώνει το 2-HG και να αποκαθιστά την κυτταρική διαφοροποίηση, δεν είναι πλήρως κατανοητός σε όλες τις ενδείξεις. **ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ***. Φιάλη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) με πόμω από πολυπροπυλένιο (PP) με κλείσιμο ασφαλείας για παιδιά και σφράγιση από πολυαιθυλένιο (PE) με θερμική επαγωγή. Κάθε φιάλη περιέχει 60 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία και ένα ξηραντικό γέλης πυριτίου σε δοχείο HDPE. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ**. Les Laboratoires Servier. 50, rue Carnot. 92284 Suresnes cedex . Γαλλία. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ** EU/1/23/1728/001. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ**. Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 04 Μαΐου 2023. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ** 12/2023.

Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων <http://www.ema.europa.eu>.

TIBSOVO F.C.TAB 250MG
A.T.: € 15621,37 N.T.: € 12990,56

Ελλάδα: ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.,
Φαραγκοκλισιάς 7, 151 25 Μαρούσι,
Τηλ.: 2109391000

Κύπρος: C.A. Papaelinas Ltd, Τηλ: +35722741741

SERVIER
moved by you

SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ.
Φαραγκοκλισιάς 7, 15125 Μαρούσι.
Τηλ 210 9391000, www.servier.gr



Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από τον τοπικό αντιπρόσωπο ή σκανάρετε τον κωδικό QR.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Ανατρέξτε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα Φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

7^ο ΕΤΟΣ
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο
ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ
ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΤΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ:
ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ και ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ

30 ΜΑΪΟΥ - 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ramada PLaza THRACI