

- **Διοργάνωση:** Ελληνική Εταιρεία Γριατρικής Ογκολογίας
- **Σε συνεργασία με:** Ογκολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
Εταιρεία Μελέτης Συμπαγών Νεοπλασιών (ΕΜΣυΝ) / Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα (HeCOG)
- **Υπό την αιγίδα:** Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας / Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας



Θα χορηγηθούν _____
22 Μόρια Συνεχιζόμενης
Ιατρικής Εκπαίδευσης
(CME-CPD) _____

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΜΕ HR+/HER2- mBC¹

IBRANCE
palbociclib
Made for mBC

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥΣ.^{2,3}

- ✓ Για πάνω από 8 χρόνια, το **IBRANCE** έχει καταφέρει να διατηρήσει στιγμές σαν αυτή²⁻⁵
- ✓ Υποστηρίζεται από ευρύ φάσμα δεδομένων, κλινικών μελετών και καθημερινής κλινικής πρακτικής^{1,2, 6-27}

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το IBRANCE, 125mg μια φορά την ημέρα από του στόματος για 21 μέρες σε κύκλο 28 ημερών (σχήμα 3/1), ενδείκνυται για τη θεραπεία του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου του μαστού ο οποίος είναι θετικός στους ορμονικούς υποδοχείς (HR) και αρνητικός στον υποδοχέα τύπου 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (HER2):

- σε συνδυασμό με αναστολέα της αρωματάσης
 - σε συνδυασμό με φουλβεστράντη σε γυναίκες που έχουν λάβει προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία
- Σε προ- ή περι-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες η ενδοκρινική θεραπεία πρέπει να συνδυάζεται με LHRH αγωνιστή.¹

Για το πλήρες κείμενο της δοσολογίας και του τρόπου χορήγησης συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το IBRANCE αντενδείκνυται σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα, καθώς και σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν σκευάσματα που περιέχουν υπερίκο/βαλσαμόχορτο (St. John's Wort). Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 20%) οποιουδήποτε βαθμού που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν palbociclib σε τυχαίοποιημένες κλινικές μελέτες ήταν ουδετεροπενία, λοιμώξεις, λευκοπενία, κόπωση, ναυτία, στοματίτιδα, αναμία, διάρροια, αλωπεκία και θρομβοπενία. Οι πιο συχνές (≥ 2%) ανεπιθύμητες ενέργειες Βαθμού ≥ 3 του palbociclib ήταν ουδετεροπενία, λευκοπενία, λοιμώξεις, αναμία, αυξημένη ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST), κόπωση και αυξημένη αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT).¹

Συντομογραφίες: **AST** = aspartate transaminase, **ALT** = alanine transaminase, **HER2** = human epidermal growth factor receptor, **HR** = hormone receptor, **HR+/HER2-** = hormone receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative, **LHRH** = luteinising hormone-releasing hormone, **mBC** = metastatic breast cancer.

Παραπομπές:

1. IBRANCE, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 10/2024.
2. Ruqo H, et al. Breast Cancer Res Treat. 2019;174(3):719-729.
3. Ruqo HS, et al. Ann Oncol. 2018;29:888-894.
4. <https://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn/4594-deltio-timwn-newn-farmakwn-anthrwpinhs-xrhshs-13-04-2017> (Πρόσβαση Ιανουάριος 2025)
5. George MA, et al. Front Oncol. 2021;11:693104.
6. Cristofanilli M, et al. Clin Cancer Res. 2022;28(16):3433-3442.
7. Finn RS, et al. N Engl J Med. 2016;375(20):1925-1936.
8. Gelmon K, et al. Breast. 2021;59:321-326.
9. Ruqo HS, et al. Eur J Cancer. 2018;101:123-133.
10. Turner NC, et al. Ann Oncol. 2018;29(3):669-680.
11. Cristofanilli F, et al. Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439.
12. Harbeck N, et al. Future Oncol. 2021;17(16):2107-2122.
13. Goyal RK et al. Cancer. 2023 Apr 1;129(7):1051-1063.
14. Richardson D, et al. Breast Cancer Res Treat. 2021;187(1):113-124.
15. De Michele A, et al. Breast Cancer Res. 2021;23:37.
16. Ruqo HS, et al. NPJ Breast Cancer. 2022;8(1):114.
17. Taylor-Stokes G, et al. Breast. 2019;43:22-27.
18. Waller J, et al. J Glob Oncol. 2019;5:JGO1800239.
19. Mycock K, et al. Future Oncol. 2022;18:349-362.
20. Mycock K, et al. Curr Oncol. 2021;28:678-688.
21. Mycock K et al. Cancer Treat Res Commun. 2022;32:100573.
22. Mycock K, et al. Clin Ther. 2022;44(12):1588-1601.
23. Slamon DJ et al. J Clin Oncol. 2024 Mar 20;42(9):994-1000.
24. Finn R, et al. Oncologist. 2021;26:e749-e755.
25. Diéras V, et al. Oncologist. 2019;24(12):1514-1525.
26. Verma S, et al. Oncologist. 2016;21(10):1165-1175.
27. Harbeck N, et al. Ann Oncol. 2016;27(6):1047-1054

Η συντετμημένη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος δημοσιεύεται σε διαφορετική σελίδα του παρόντος.



PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Α. Μεσογείων 243,
Ν. Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα, Τηλ. Επικοινωνίας
210-6785800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH) Λεωφόρος
Αθαλάσσιας 26, 2018 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.
Επικοινωνίας: +357 22 817690

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

5^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Παρόν και Μέλλον ΣΥΝΕΔΡΙΟ στην Ογκολογία

➤ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ _

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 5^ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Παρόν και Μέλλον στην Ογκολογία», το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως και τις 14 Ιουνίου 2025, στο ξενοδοχείο Achaia Beach στην Πάτρα.

Τα τελευταία χρόνια έχουν επιτευχθεί σημαντικές πρόοδοι στο πεδίο της έρευνας του καρκίνου, οι οποίες έχουν συνοδευθεί και από αντίστοιχη βελτίωση στη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών. Επιπλέον, η εξατομίκευση της θεραπείας έχει ανοίξει νέους ορίζοντες στην Ογκολογία και έχει συμβάλει σημαντικά στη βελτιστοποίηση της θεραπευτικής απόφασης. Οι εξελίξεις αυτές έχουν διαμορφώσει ένα νέο τοπίο στην ενημέρωση και εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στο πεδίο της Ογκολογίας, καθιστώντας πλέον επιτακτική την ανάγκη διάχυσης της νέας γνώσης. Επιπλέον, επιδίωξη του Συνεδρίου μας είναι και η αλληλεπίδραση με τις λοιπές ιατρικές ειδικότητες που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο, καθώς οι εξελίξεις στο πεδίο της Ογκολογίας έχουν καταστήσει τη συνεργασία τους ακόμα πιο σημαντική.

Προς ευόδωση των σκοπών αυτών, έχουν κληθεί να συμμετάσχουν καταξιωμένοι επιστήμονες, οι οποίοι θα μας εκθέσουν τα νεότερα δεδομένα στην έρευνα και την αντιμετώπιση του καρκίνου. Η θεματολογία του Συνεδρίου καλύπτει τις νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις στις συχνότερες συμπαγείς νεοπλασίες, καθώς και τις μελλοντικές προοπτικές.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, με χαρά αναμένουμε να σας υποδεχθούμε στο 5^ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Παρόν και Μέλλον στην Ογκολογία», προσβλέποντας στην ενεργό συμμετοχή σας και τη διαδραστική ανταλλαγή απόψεων.

Οι Πρόεδροι του Συνεδρίου



Άγγελος Κούτρας

Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας
Πανεπιστημίου Πατρών



Δημήτριος Καρδαμάκης

Ομότιμος Καθηγητής
Πανεπιστημίου Πατρών

ALYMSYS®

Bevacizumab



Πριν την
συνταγογράφηση
συμβουλευτείτε
την Περίληψη
Χαρακτηριστικών
Προϊόντος

Τοπικός Αντιπρόσωπος

WinMedica

Για περισσότερες πληροφορίες:
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Αγνισιάδου 6-8, Μαρούσι 151 23
Τηλ.: 210 7488821, Fax: 210 7488827
info@winmedica.gr
www.winmedica.gr

Για ενδοφλέβια χρήση μετά από αραίωση
Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή:
Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση.
Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους
επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοσδήποτε πιθανολογούμενος ανεπιθύμητος ενέργειες.

Νοσοκομειακές Τιμές:
ALYMSYS C/S SOLIN 25MG/ML VIAL X 16 ML: 586,28 €
ALYMSYS C/S SOLIN 25MG/ML VIAL X 4 ML: 150,24 €

Κάτοχος Άδειας
Κυκλοφορίας

mAbxience
From lab to life

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

• Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας

• Σε συνεργασία με: Ογκολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
Εταιρεία Μελέτης Συμπαγών Νεοπλασιών (ΕΜΣΝ) / Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα (HeCOG)

5^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Παρόν και Μέλλον ΣΥΝΕΔΡΙΟ στην Ογκολογία

➤ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ _

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδροι:

Α. Κούτρας

Δ. Καρδαμάκης

Μέλη:

Ρ. Αργυριάδη

Λ. Βαμβάκας

Ι. Βελισσάρη

Α. Βήχα

Γ. Γεωργακόπουλος

Φ.Ι. Δημητρακόπουλος

Α. Καραμπεάξης

Γ. Κατηνιώτης

Α. Κοττόρου

Η. Λιόλης

Θ. Μακατσώρης

Α. Νικολακόπουλος

Γ. Οικονόμου

Μ. Πανδή

Μ. Πισπιρίγκου

Γ. Πισσάκας

Μ. Πομώνη

Ε. Ρούσια

Χ. Σιρινιάν

Φ. Χρυσανθακόπουλος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδροι:

Α. Κούτρας

Φ.Ι. Δημητρακόπουλος

Μέλη:

Γ. Αντωνάκης

Κ. Ασημακόπουλος

Κ. Αυγουστάκης

Α. Βανταράκης

Δ. Βελισσάρης

Σ. Γεωργίου

Π. Γρίβας

Ι. Ελλούλ

Κ. Θωμόπουλος

Γ. Καλλέργη

Χ. Καλόφωνος

Δ. Καρδαμάκης

Κ. Καρκούλιας

Κ. Κατσάνος

Ε. Κωλέτσης

Θ. Μακατσώρης

Μ. Μαραγκός

Ν. Παπαθανασίου

Α. Παπαναστασίου

Δ. Παπαχρήστου

Σ. Περουκίδης

Δ. Σπυροπούλου

Α. Τζουβελέκης

Α. Τσιατά

Π. Χριστόπουλος

Α. Χριστοπούλου

DON'T MAKE THEM WAIT.

Start strong with CABOMETYX® + Nivolumab.



60% of aRCC patients don't reach 2L*2-4



67,6m FU results continue to support Cabometyx® - Nivolumab as a Standard of Care for previously untreated aRCC patients¹

Keep time on their side⁵

*Across three real-world studies, only 35-45% of patients received 2L²⁻⁴ References: 1. Motzer R, et al. Abstract 439. Presented at ASCO GU 2025. 2. Shah N, et al. Eur Urol. 2023;49:110-118. 3. Malik A, et al. Poster 19. Presented at IKCS 2023. 4. Lai G-S, et al. PLoS One. 2023;18(11):e0294039. 5. Bourlon MT, et al. Abstract 362, Presented at ASCO GU 2024.

IPSEN MON. ΕΠΕ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 9843324

E-mail: ipsenepe@ipsen.com

www.ipsen.com/greece

Τηλέφωνο φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930

ΔΤΦ: 04/01/2025

CABOMETYX F.C.TAB 20MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€

CABOMETYX F.C.TAB 40MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€

CABOMETYX F.C.TAB 60MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€



Περληψη Χαρακτηριστικών
Προϊόντος CABOMETYX®
Ημ. αναθεώρησης κειμένου,
06 Οκτωβρίου 2023

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

**CABOMETYX®**
(cabozantinib) tablets

10 CABO-A/MAR 2025

 **IPSEN**

5^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Παρόν και Μέλλον ΣΥΝΕΔΡΙΟ στην Ογκολογία

➤ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ _

Πέμπτη 12 Ιουνίου 2025

12:45-13:00

Προσέλευση - Εγγραφές

13:00-14:00

Θετική διάθεση και ευεξία στους ασθενείς με καρκίνο:
οξύμωρο σχήμα ή μία νέα πραγματικότητα;

Προεδρείο: **Κ. Ασημακόπουλος, Γ. Οικονόμου**

13:00-13:20

Ο ρόλος του τρόπου ζωής στην ολιστική
αντιμετώπιση του καρκίνου.

Σ. Ντρουφάκου

13:20-13:40

EUCanScreen: Κοινή Ευρωπαϊκή Δράση για την εφαρμογή
του προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου
για τον καρκίνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ι. Βελισσάρη

13:40-13:50

Συζήτηση

13:50-14:00

Σχολιασμός: **Α. Βανταράκης, Α. Βήχα**

14:00-15:30

**Ι. Επίκαιρα θέματα αλληλεπίδρασης του παθολόγου-ογκολόγου
με τις λοιπές ιατρικές ειδικότητες**

Προεδρείο: **Μ. Μαραγκός, Δ. Βελισσάρης**

14:00-14:15

Εμβολιασμοί σε ασθενείς με καρκίνο:
ποιοι είναι πραγματικά αναγκαίοι;

Μ. Λαγκαδινού

14:15-14:30

Ορθή χρήση αντιβιοτικών και χημειοπροφύλαξη
σε ογκολογικούς ασθενείς.

Λ. Λεωνίδου

Προεδρείο: **Α. Τζουβελέκης, Γ. Ευφραιμίδης**

14:30-14:45

Θεραπευτικές εφαρμογές της επεμβατικής πνευμονολογίας
σε ασθενείς με καρκίνο.

Γ. Στρατάκος

14:45-15:00

Η σημασία της επαρκούς λήψης υλικού για ιστολογική
και μοριακή ανάλυση στον καρκίνο του πνεύμονα.

Φ. Σαμψώνας

Προεδρείο: **Κ. Θωμόπουλος, Ι. Σταράκης**

15:00-15:15

Θεραπευτικές εφαρμογές της επεμβατικής
γαστρεντερολογίας σε ασθενείς με καρκίνο.

Γ. Διαμαντοπούλου

15:15-15:30

Χρόνια ηπατοπάθεια και καρκίνος.

Χ. Σωτηρόπουλος

Υπερβαίνοντας τον Φόβο του Τρυπήματος

Pelgraz.01.05/2025



➔
Για πλήρεις
συνταγογραφικές
πληροφορίες
συμβουλευτείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος

Νοσοκομειακή Τιμή

PELGRAZ INJ.SOL 6MG/0.6ML (10MG/ML) 1 PF. SYR με προστατευτικό ασφαλείας x 0.6 ML +1 τολύπιο με οινόπνευμα 301,93€
PELGRAZ INJ.SOL 6MG/0.6ML (10MG/ML) 1 προγεμισμένος εγχυτήρας +1 τολύπιο με οινόπνευμα 301,93€

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται, σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού

Τοπικός Αντιπρόσωπος

WinMedica

Για περισσότερες πληροφορίες:
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Αγροιλίου 6-8, Μαρούσι 151 23
Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827
info@winmedica.gr
www.winmedica.gr

Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας
Accord Healthcare S.L.U.

accord

We make it better

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανορώστε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Orlik G, Vichai V, Cornilewicz-Matucka J. Poster Board 071: Can Fear Of Injection Be Managed By Autologous Intercept-Synovial Fluid Healthcare Professionals About Neutropenic Patients. European Journal of Oncology Pharmacy, October 2016 Vol. 1, Issue 35-P14-65.

5^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Παρόν και Μέλλον ΣΥΝΕΔΡΙΟ στην Ογκολογία

Πέμπτη 12 Ιουνίου 2025

15:30-17:00

II. Επίκαιρα θέματα αλληλεπίδρασης του παθολόγου-ογκολόγου με τις λοιπές ιατρικές ειδικότητες

Προεδρείο: **Α. Μούγιου, Α. Λέκκου**

15:30-15:45

Διαταραχές πηκτικότητας σε ασθενείς με καρκίνο: τι πρέπει να γνωρίζουμε;

Β. Λαμπροπούλου

15:45-16:00

Αιματολογικές τοξικότητες και εμπύρετη ουδετεροπενία: υπάρχει κάτι νεότερο;

Μ. Λίγκα

Προεδρείο: **Σ. Γεωργίου, Ε. Γιαλελή**

16:00-16:15

Δερματική τοξικότητα αντινεοπλασματικών παραγόντων.

Χ. Οικονόμου

16:15-16:30

Παρανεοπλασματικές δερματικές εκδηλώσεις.

Γ. Κυριάκου

Προεδρείο: **Δ. Καρδαμάκης, Ν. Παπαθανασίου**

16:30-16:45

Επείγοντα προβλήματα σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία.

Μ. Πομώνη

16:45-17:00

Η συμβολή του PET/CT (PSMA) στη διαχείριση ασθενών με καρκίνο του προστάτη: ερωτήματα και προκλήσεις.

Ε. Σκούρα

17:00-17:30

Διάλειμμα καφέ

17:30-18:30

I. Συνήθεις ανεπιθύμητες ενέργειες της ανοσοθεραπείας: τι πρέπει να γνωρίζουμε;

Προεδρείο: **Ι. Ελλούλ, Α. Νικολακόπουλος**

17:30-18:00

Ανοσοεπαγόμενες νευρολογικές παρενέργειες: πόσο συχνές είναι και πόσο επηρεάζουν το θεραπευτικό πλάνο;

Α. Αργυρίου

18:00-18:30

Ανοσοεπαγόμενες ενδοκρινοπάθειες: προκλήσεις στη διάγνωση και την αντιμετώπιση.

Δ. Χαρτουμπέκης

LONQUEX[®]

lipegfilgrastim



teva

Τιμές πώλησης:

LONQUEX INJ.SOL 6MG/0,6ML PF.SYR BTx1 PF.SYRx0,6ML

N.T.

404,08€

LONQUEX INJ.SOL 6MG/0,6ML VIAL BT X 6 VIALS X 0,6 ML

2.150,51€

Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές.

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της Θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Τοπικός Αντιπρόσωπος : TEVA HELLAS A.E.

Έδρα: Λεωφ. Κηφισίας 44, 151 25, Μαρούσι. Τ: 210 8805000, F: 210 8805120,

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000228201000. www.teva.gr

Κ.Α.Κ.: Teva B.V., Swensweg 5, 2031, GA Haarlem, Ολλανδία



Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρετε το QR code ή απευθυνθείτε στην εταιρεία στο τηλέφωνο 2118805000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

5^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Παρόν και Μέλλον ΣΥΝΕΔΡΙΟ στην Ογκολογία

Πέμπτη 12 Ιουνίου 2025

18:30-19:30

**II. Συνθήσεις ανεπιθύμητες ενέργειες της ανοσοθεραπείας:
τι πρέπει να γνωρίζουμε;**

Προεδρείο: **Κ. Καρκούλιας, Α. Νικολακόπουλος**

18:30-19:00

Πνευμονίτιδα: βασικές αρχές διαγνωστικής
και θεραπευτικής προσέγγισης.

Δ. Λυκούρας

19:00-19:30

Καρδιοτοξικότητα: μία λιγότερο καλά αναγνωρισμένη
οντότητα που χρήζει μεγαλύτερης προσοχής;

Α. Καρανάσος

Παρασκευή 13 Ιουνίου 2025

09:30-10:30

Καρκίνος ανώτερου γαστρεντερικού

Προεδρείο: **Α. Αρδαβάνης, Χ. Πανόπουλος**

09:30-09:50

Γαστρο-οισοφαγικός καρκίνος: εξελίξεις στην ανάδειξη
βιοδεικτών και θεραπευτικών επιλογών.

Μ. Θεοχάρη

09:50-10:10

Νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις στον τοπικά
προχωρημένο και μεταστατικό καρκίνο του ήπατος
και των χοληφόρων.

Π. Παπαναστασόπουλος

10:10-10:20

Συζήτηση

10:20-10:30

Σχολιασμός: **Γ. Παπαξοΐνης, Χ. Τόλης**

10:30-11:00

Διάλεξη

Προεδρείο: **Η. Κοττέας, Γ. Καλλέργη**

10:30-10:50

Υγρή βιοψία και ctDNA για τη διάγνωση
και την εξατομικευμένη αντιμετώπιση του καρκίνου:
νεότερα δεδομένα.

Γ. Νασιούλας

10:50-11:00

Σχολιασμός: **Σ. Λαμπρόπουλος**

SUOMICON®

Dexamethasone

10mg/5ml, ποσ. διάλ., 50ml

20mg/5ml, ποσ. διάλ., 30ml

Με ιατρική συνταγή

NEO

PRELOCORTIL®

Prednisolone

5mg/tab, διαλυτά δισκία x30
20mg/tab, διαλυτά δισκία x30



Με ιατρική συνταγή

PIRVER®

Prednisolone

5mg/ml, ποσ. διάλ., 60ml

10mg/ml, ποσ. διάλ., 60ml

Με ιατρική συνταγή

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Συν-προώθηση SUOMICON & PIRVER
Medicair Bioscience Laboratories CY LTD

Συν-προώθηση PRELOCORTIL
S.J.A. PHARM Ε.Π.Ε.
Υπεύθυνος Ιατρικής Ενημέρωσης
Medicair Bioscience Laboratories S.A.
Λαρίσης 10, 15351 Παλλήνη, Αθήνα,
t-f 210 6669 603, e info@medicair.gr

www.medicair.gr

Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών των Προϊόντων,
επικοινωνήστε με τον επιστημονικά υπεύθυνο
της ιατρικής ενημέρωσης,
τηλ. επικοινωνίας: 210 669603,
e-mail: pharmacovigilance@medicair.gr, www.medicair.gr

PRELOCORTIL® SOLU.TAB 5MG/TAB BT x 30	18,30€
PRELOCORTIL® SOLU.TAB 20MG/TAB BT x 30	73,17€
PIRVER ORAL.SOL 5MG/ML BTx BOTTLE x 60ml	29,93€
PIRVER ORAL.SOL 10MG/ML BTx BOTTLE x 60ml	59,89€
SUOMICON ORAL.SOL 10MG/5ML BOTTLE x 50ml	49,44€
SUOMICON ORAL.SOL 20MG/5ML BOTTLE x 30ml	59,19€

5^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Παρόν και Μέλλον ΣΥΝΕΔΡΙΟ στην Ογκολογία

Παρασκευή 13 Ιουνίου 2025

11:00-12:00

Πρώιμος κολο-ορθικός καρκίνος

Προεδρείο: Δ. Πεκτασίδης, Ε. Βούλγαρης

11:00-11:20

Τοπικά προχωρημένοι καρκίνος του ορθού:
νεότερες εξελίξεις και αναδυόμενες επιλογές.

Γ. Ζαρκαβέλης

11:20-11:40

Ο αναπτυσσόμενος ρόλος της εισαγωγικής
συστηματικής θεραπείας.

Α. Στριμπάκος

11:40-11:50

Συζήτηση

11:50-12:00

Σχολιασμός: Π. Παπακώστας, Ι. Σγουρός

12:00-12:30

Διάλειμμα καφέ

12:30-13:30

Μεταστατικός καρκίνος του παχέος εντέρου

Προεδρείο: Ζ. Σαριδάκη, Κ. Τσιγαρίδας

12:30-12:50

Υπάρχουν ουσιαστικές εξελίξεις στη συστηματική θεραπεία
της προχωρημένης νόσου;

Χ. Μάρκελλος

12:50-13:10

Τοπικο-περιοχική αντιμετώπιση ηπατικών μεταστάσεων:
νεότερα δεδομένα.

Κ. Κατσάνος

13:10-13:20

Συζήτηση

13:20-13:30

Σχολιασμός: D. Mauri, Ν. Αλεβιζόπουλος

13:30-14:00

Διάλεξη

Προεδρείο: Ι. Βαρθαλίτης, Α. Παπαναστασίου

13:30-13:50

Η επίδραση του μικροβιώματος στην αντι-νεοπλασματική θεραπεία. Ε. Ζωγράφου

13:50-14:00

Σχολιασμός: Κ. Αυγουστάκης, Α. Τσιατά

14:00-15:00

Μεσημβρινή διακοπή - Ελαφρύ γεύμα



NUBEQA®
(darolutamide) 300 mg
tablets



ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

- Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 300 mg δαρολουταμίδης.
- Έκδοχο με γνωστή δράση: κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 186 mg μονοϋδρικής λακτόζης

Λιανική τιμή: 3031.95 €



Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας:
Bayer AG 51368, Leverkusen, Γερμανία

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας
Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αγησιόλου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα
Αρ. ΓΕΜΗ: 000299101000

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης
Τηλ: +30 210 6187742, Φαξ: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Το NUBEQA ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ανδρών με

- μη μεταστατικό, ανθεκτικό στον ευνοηχισμό καρκίνο του προστάτη (nmCRPC) οι οποίοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν μεταστατική νόσο
- μεταστατικό ορμονοεξασθετη καρκίνο του προστάτη (mHSPC) σε συνδυασμό με δοσεταξέλη και θεραπεία στήριξης ανδρογόνων



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που θα βρείτε σαρώνοντας το QRC ή ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/nubeqa-epar-product-information_el.pdf, ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 28/10/2024

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται
ιατρική συνταγή
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

PP-NUB-GR-0095-1
03.2025

5^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Παρόν και Μέλλον ΣΥΝΕΔΡΙΟ στην Ογκολογία

Παρασκευή 13 Ιουνίου 2025

15:00-16:30

Γυναικολογικός καρκίνος

Προεδρείο: Γ. Αντωνάκης, Χ. Παπαδημητρίου

15:00-15:20

Εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας:
εφικτή πιθανότητα ή υπερβολική προσδοκία;

Γ. Μιχαήλ

15:20-15:40

Καρκίνος του ενδομητρίου: εξατομίκευση της θεραπείας
στην εποχή της μοριακής ογκολογίας.

P. Ζακοπούλου

15:40-16:00

Καρκίνος των ωοθηκών: αναδυόμενοι θεραπευτικοί
στόχοι και μελλοντικές προοπτικές.

M. Λιόντος

16:00-16:15

Συζήτηση

16:15-16:30

Σχολιασμός: Σ. Σταματοπούλου, Μ. Πρεβεζάνου

16:30-17:30

Εισαγωγική και συμπληρωματική συστηματική θεραπεία: νέότερα δεδομένα και ανοικτά ερωτήματα

Προεδρείο: Ν. Τσουκαλάς, Δ. Πετράκης

16:30-16:50

Σαρκώματα μαλακών μορίων.

A. Κυριαζόγλου

16:50-17:10

Κακήθες μελάνωμα.

A. Κορογιάννος

17:10-17:20

Συζήτηση

17:20-17:30

Σχολιασμός: Δ. Παπαχρήστου, Σ. Κόκκαλη

17:30-17:50

Δορυφορική διάλεξη

sponsored by  Bristol Myers Squibb®

Προεδρείο: Α. Λασκαράκης, Δ. Πετράκης

Νεότερες προσεγγίσεις με ανοσοθεραπεία
στο μεταστατικό μελάνωμα.

Δ. Ζιώγας

17:50-18:30

Διάλειμμα καφέ

Fentanyl/Sandoz

Fentanyl citrate



Το μέγεθος των δισκίων που απεικονίζονται δεν είναι πραγματικό.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ειδική ιατρική συνταγή του Ν 3459/06 περί ναρκωτικών (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ).

FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 100MCG/TAB ΒΤx30x1 Λ.Τ.: 88,01 €, FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 200MCG/TAB ΒΤx30x1 Λ.Τ.: 92,73 €, FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 300MCG/TAB ΒΤx30x1 Λ.Τ.: 103,20 €, FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 400MCG/TAB ΒΤx30x1 Λ.Τ.: 103,20 €



Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

Η έντυπη μορφή της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του

Προϊόντος είναι επίσης διαθέσιμη από την εταιρεία Lavipharm Hellas A.E.,

τηλ.: 210 6691 000, e-mail: SafetyGreece@lavipharm.com

FENT/SAND/poster/LAV/02.2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΩΤΩΘΗΣΗΣ

Lavipharm Hellas A.E.

Οδός Αγίας Μαρίνας, 190 02 Παιανία Αττικής

Τηλ.: 210 6691 000

www.lavipharm.com

SANDOZ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova
ulica 57, SI-1000 Ljubljana, Σλοβενία.

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Φραγκοκκλησιάς 7B, 151 25 Μαρούσι

Τηλ.: +30 216 600 5000



5^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Παρόν και Μέλλον ΣΥΝΕΔΡΙΟ στην Ογκολογία

Παρασκευή 13 Ιουνίου 2025

18:30-20:00

Καρκίνος ουροποιοτικού

Προεδρείο: **Χ. Παπανδρέου, Ε. Κωστούρος**

18:30-18:50

Ορμονοευαίσθητος καρκίνος του προστάτη:
εξατομικευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Ε.Ι. Περδικούρη

18:50-19:10

Καρκίνος νεφρού: εστιάζοντας στο βέλτιστο θεραπευτικό
αλγόριθμο των συστηματικών θεραπειών προς
όφελος των ασθενών.

Κ. Κουτσούκος

sponsored by 

19:10-19:30

Νεότερες περι-εγχειρητικές θεραπευτικές επιλογές
στο εντοπισμένο μυοδιηθητικό ουροθηλιακό καρκίνωμα.

Π. Γρίβας

19:30-19:45

Συζήτηση

19:45-20:00

Σχολιασμός: **Α. Παπατσώρης, Ε. Μαραγκούλη**

20:00-20:30

Εναρκτήρια διάλεξη

Προεδρείο: **Α. Κούτρας, Μ. Ριζογιάννη**

Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης
στην αντιμετώπιση του καρκίνου: υπέρ και κατά.

Β. Μεγαλοικονόμου



innohep[®]

tinzaparin sodium



Χορηγείται με ιατρική συνταγή.
Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες επικοινωνήστε
με την LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

Για το ισχύον δελτίο τιμών
των φαρμάκων της LEO Pharma
σκανάρετε εδώ



LEO Pharmaceutical Hellas S.A
Παπανικολή 22Α, 15232, Χαλάνδρι
Τηλ: 212 222 5000
contact@leo-pharma.com
αφ. ΓΕΜΗ 117058301000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Advancing the care of
patients with thrombosis

© LEO Pharma copyright - GR_inn_adv_Nov_2024- MAT-71106.
All LEO Pharma trademarks mentioned belong to the LEO Pharma Group.

5^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Παρόν και Μέλλον ΣΥΝΕΔΡΙΟ στην Ογκολογία

Σάββατο 14 Ιουνίου 2025

09:30-11:00	Εξελίξεις στην αντιμετώπιση του μη μεταστατικού μη-μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (NSCLC)	
	Προεδρείο: Φ.Ι. Δημητρακόπουλος, Ε. Κωλέτσης	
09:30-09:50	Βέλτιστη ενσωμάτωση της εισαγωγικής και επικουρικής συστηματικής θεραπείας.	Ν. Καποδίστριας
09:50-10:10	Τι αλλάζει στη χειρουργική αντιμετώπιση των ασθενών;	Σ. Μητσός
10:10-10:30	Περιεχειρητική αντιμετώπιση NSCLC με στοχεύσιμες γενομικές αλλαγές.	Α. Ανδρικοπούλου
10:30-10:45	Συζήτηση	
10:45-11:00	Σχολιασμός: Α. Κωτσάκης, Ν. Παναγόπουλος	
11:00-11:30	Διάλειμμα καφέ	
11:30-13:00	Μεταστατικός μη-μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα	
	Προεδρείο: Χ. Κοσμάς, Ν. Περγαντάς	
11:30-12:00	Επιλέγοντας θεραπεία 1 ^{ης} γραμμής για ασθενείς με θετική έκφραση PDL-1, χωρίς οδηγούς μεταλλάξεις.	Α. Νικολακόπουλος
		sponsored by 
12:00-12:20	Καλύπτοντας το κενό με το διπλό ανοσο-αποκλεισμό στους ασθενείς με χαμηλή έκφραση PDL-1.	Α. Χριστοπούλου
		sponsored by 
12:20-12:40	Θεραπευτικά διλήμματα στην 1 ^{ης} γραμμής θεραπεία ασθενών με EGFR μεταλλάξεις.	Π. Χριστόπουλος
12:40-12:45	Συζήτηση	
12:45-13:00	Σχολιασμός: Μ. Βασιλαματζής, Π. Βλαχοστέργιος	

Letrafem®

Δισκία λετροζόλης 2.5 mg

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα
πο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ARITI A.E. ΑΘΗΝΑ: Λεωφ. Τατοΐου 52,
13677 Αχαρνές
Τηλ.: 210 8002650 - Fax: 210 6207503
www.ariti.gr - info@ariti.gr

ariti®

στη
στον άνθρωπο

5^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Παρόν και Μέλλον ΣΥΝΕΔΡΙΟ στην Ογκολογία

Σάββατο 14 Ιουνίου 2025

13:00-13:30

Δορυφορική διάλεξη

sponsored by



Προεδρείο: Ε. Σαμαντάς, Η. Λιόλης

Στοχεύοντας με συνέπεια στη μακροχρόνια επιβίωση των ασθενών με ΜΜΚΠ.

Π. Οικονομοπούλου

13:30-14:30

Μεσημβρινή διακοπή - Ελαφρύ γεύμα

14:30-16:00

Βέλτιστη αντιμετώπιση ασθενών με πρώιμο καρκίνο του μαστού

Προεδρείο: Χ. Καλόφωνος, Ν. Κεντεποζίδης

14:30-15:00

Δεδομένα συνολικής επιβίωσης και πώς η ανοσοθεραπεία διαμορφώνει την αντιμετώπιση του πρώιμου TNBC.

Ε.Σ. Τριποδάκη

sponsored by



15:00-15:20

Ορμονοθετική νόσος.

Ε. Σκαφίδα

15:20-15:40

HER2-θετικός καρκίνος.

Δ. Ζούκη

15:40-15:50

Συζήτηση

15:50-16:00

Σχολιασμός: Ε. Τιμοθεάδου, Σ. Αμπντουλάχ

16:00-17:30

Αποκλιμάκωση της θεραπείας στην πρώιμη νόσο: είναι εφικτή και σε ποιες περιπτώσεις;

Προεδρείο: Α. Κούτρας, Δ. Σπυροπούλου

16:00-16:20

Η θέση του παθολόγου-ογκολόγου.

Ε. Μοιρογιώργου

16:20-16:40

Η άποψη του χειρουργού μαστού.

Ι. Χαβελές

16:40-17:00

Η τοποθέτηση του ακτινοθεραπευτή ογκολόγου.

Μ. Τριχάς

17:00-17:15

Συζήτηση

17:15-17:30

Σχολιασμός: Γ. Ζωγράφος, Χ. Χριστοδούλου

17:30-18:00

Διάλειμμα καφέ



RYBREVANT®

(amivantamab)

Ενέσιμο διάλυμα για ενδοφλέβια χρήση
350 mg/ 7mL (50 mg/mL)

Το RYBREVANT® ενδείκνυται:

Σε συνδυασμό με καρβοπλατίνη και πεμετρεξίδη για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) με διαγραφές στο Εξώνιο 19 του EGFR ή μεταλλάξεις υποκατάστασης L858R στο Εξώνιο 21 μετά την αποτυχία προηγούμενης θεραπείας που περιλαμβάνει αναστολέα τυροσινικής κινάσης (TKI) του EGFR¹.

Το RYBREVANT® είναι το πρώτο εγκεκριμένο διειδικό αντίσωμα (EGFR-MET) με τριπλό μηχανισμό δράσης^{1,3}

52%

μείωση κινδύνου εξέλιξης της νόσου ή θανάτου σε σχέση με τη χημειοθεραπεία²

Median PFS: 6.3 months (95% CI: 5.6–8.4) vs. 4.2 months (95% CI: 4.0–4.4) (HR=0.48 [95% CI: 0.36–0.64]; p<0.001)²

Επίσης ενδείκνυται σε συνδυασμό με καρβοπλατίνη και πεμετρεξίδη για τη θεραπεία πρώτης γραμμής ενήλικων ασθενών με προχωρημένο ΜΜΚΠ με ενεργοποιητικές μεταλλάξεις ένθεσης στο Εξώνιο 20 του EGFR. Ως μονοθεραπεία για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με προχωρημένο ΜΜΚΠ με ενεργοποιητικές μεταλλάξεις ένθεσης στο Εξώνιο 20 του EGFR, μετά την αποτυχία θεραπείας με βάση την πλατίνη. Η MARIPOSA-2 είναι μια τυχαίοποιημένη (2:2:1), ανοικτής επισημάνσης, πολυκεντρική μελέτη Φάσης 3 σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό ΜΜΚΠ με διαγραφές στο Εξώνιο 19 του EGFR ή μεταλλάξεις υποκατάστασης L858R στο Εξώνιο 21 μετά από αποτυχία προηγούμενης θεραπείας συμπεριλαμβανομένου ενός τρίτης γενιάς αναστολέα τυροσινικής κινάσης (TKI) του EGFR. Πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν η PFS.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες (ΑΕ) του RYBREVANT® + χημειοθεραπεία ήταν κυρίως αιματολογικές, σχετιζόμενες με την έγχυση, με το EGFR ή με το MET και ήταν συμβατές με τα γνωστά προφίλ ΑΕ των επιμέρους θεραπευτικών σχημάτων.^{1,2}

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ	ΔΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
C/S.SOLIN 350MG/7ML/VIAL	BT x 1 VIAL x 7ml	1.080,62 €	1.337,68 €

HR: Hazard ratio, CI: διάστημα εμπιστοσύνης, PFS: Progression free survival, EGFR: Epidermal growth factor receptor, MET: Mesenchymal epithelial transition, AUC: area under the plasma drug concentration-time curve, IRR: infusion related reactions, PVC: Polyvinyl chloride, PP: Polypropylene, PE: Polyethylene, RESIST: Κράτημα Αξιολόγησης της Ανταπόκρισης σε Συμπτωτικές Ογκούς, ΣmpC/ΠΧΠ: Summary of Product Characteristics / Περιγραφή των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέπει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λεωφόρος Ειρήνης 56, 151 21, Πεύκη, Αθήνα, Τηλ.: 210 8090000
janssen.com/greece



ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΕΔΩ

Βιβλιογραφία:
1- Rybrevant. Περιγραφή Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
2- Passaro A, et al. Ann Oncol 2024;35(1):77-90.
3- Brazier D & Nagasaka M, Respir Res 2023;24, 256.

Johnson & Johnson

• Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Γυναικείας Ογκολογίας

• Σε συνεργασία με: Ογκολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
Εταιρεία Μελέτης Συμπαγών Νεοπλασιών (ΕΜΣΝ) / Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα (HeCOG)

5^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Παρόν και Μέλλον ΣΥΝΕΔΡΙΟ στην Ογκολογία

Σάββατο 14 Ιουνίου 2025

18:00-19:00

Μεταστατικός καρκίνος του μαστού

Προεδρείο: **Φ. Ζαγουρή, Σ. Περουκίδης**

18:00-18:20

Ορμονοθετική, HER2-αρνητική νόσος: βέλτιστη αντιμετώπιση μετά τους CDK4/6 αναστολείς.

Μ. Καπαρέλου

sponsored by **INTEGRIS**
PHARMA

18:20-18:40

Συζευγμένα αντισώματα (ADCs) στην ορμονοθετική και τριπλά-αρνητική νόσο: ποια είναι η θέση τους στον θεραπευτικό αλγόριθμο;

Μ. Γραμμουσιάνου

18:40-18:50

Συζήτηση

18:50-19:00

Σχολιασμός: **Ε. Σαλούστρος, Ε. Γαλάνη**

19:00-19:30

Δορυφορική διάλεξη

sponsored by AstraZeneca  

Προεδρείο: **Δ. Τρυφωνόπουλος, Α. Κουμαριανού**

Εξελίξεις στη θεραπεία του HER2-θετικού μεταστατικού καρκίνου του μαστού με την ενσωμάτωση των νεότερων ADCs.

Ε. Λιανός

19:30-20:00

Δορυφορική διάλεξη

sponsored by



Προεδρείο: **Α. Κούτρας, Φ.Ι. Δημητρακόπουλος**


Νέος PI3Ka αναστολέας στη θεραπεία 1^{ης} γραμμής ασθενών με ορμονοθετικό καρκίνο του μαστού.

Α. Νικολαΐδη

20:00-20:30

Κλείσιμο - Συμπεράσματα

Α. Κούτρας



5^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Παρόν και Μέλλον ΣΥΝΕΔΡΙΟ στην Ογκολογία

➤ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ – ΠΡΟΕΔΡΩΝ

MAURI DAVIDE	Αν. Καθηγητής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
ΑΜΠΝΤΟΥΛΑΧ ΣΟΥΖΑΝΑ	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Ογκολογικό Τμήμα, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Διευθυντής, Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Διευθυντής, Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	MD, PhD, Νευρολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Νευρολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»
ΑΡΔΑΒΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής-Επιστημονικός Υπεύθυνος Α' Παθολογικής-Ογκολογικής Κλινικής, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και Ανάλυσης, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Καθηγητής Υγιεινής, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών
ΒΑΣΙΛΑΜΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος, Ογκολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός-Πολυκλινική» Ν.Π.Δ.Δ.
ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Παθολόγος Ογκολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής, Α' Ογκολογική Κλινική, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ	Νοσηλεύτρια, MPh, PhD, Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών
ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Καθηγητής Παθολογίας- Εντατικολογίας, Ιατρικό Τμήμα, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών
ΒΗΧΑ ANNA	Νοσηλεύτρια MSc, PhD, Προϊσταμένη Ημερησίας Νοσηλείας, Π.Γ.Ν. Πατρών
ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	MD, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Cornell, ΗΠΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ογκολογική Κλινική, «ΙΑΣΩ» Θεσσαλίας
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	MD, PhD, Στρατιωτικός Ιατρός, Παθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογικό Ιατρείο, 404 Γ.Σ.Ν., Λάρισα

5^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Παρόν και Μέλλον ΣΥΝΕΔΡΙΟ στην Ογκολογία

ΓΑΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια, Β' Ογκολογική Κλινική, «Metropolitan» Hospital

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Δερματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών

ΓΙΑΛΕΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, τ. Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική

ΓΡΑΜΜΟΥΣΤΙΑΝΟΥ ΜΑΙΡΗ

MD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Thoracic Oncology Department, Hôpital Européen George Pompidou, Paris, France

ΓΡΙΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

MD PhD, Professor, Department of Medicine, Division of Hematology Oncology, Clinical Director, Genitourinary Cancers Program, University of Washington, Professor, Clinical Research Division, Fred Hutch Cancer Center

**ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ**

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογικό Τμήμα & Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Γαστρεντερολόγος Επιμελήτρια Α', Π.Γ.Ν. Πατρών

ΕΛΛΟΥΛ ΙΩΑΝΝΗΣ

Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πνευμονολόγος, Συντονιστής Διευθυντής, Πνευμονολογική Κλινική, Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

ΖΑΓΟΥΡΗ ΦΛΩΡΑ

Παθολόγος Ογκολόγος, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ

Παθολόγος Ογκολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Β' Π.Π.Κ., Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Α' Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

ΖΟΥΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Α' Ογκολογική Κλινική, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου ΑΥΣ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΕΝΗ

MD, PhD, Επιστημονικός Συνεργάτης, Θεραπευτική Κλινική, Γ.Ν. Αλεξάνδρα, Ε.Κ.Π.Α.

ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

Παθολόγος Ογκολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

5^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Παρόν και Μέλλον ΣΥΝΕΔΡΙΟ στην Ογκολογία

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής, Γαστρεντερολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Πατρών

ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ

Αν. Καθηγήτρια Βιοχημείας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, «Ολύμπιον» Θεραπευτήριο, Πάτρα

ΚΑΠΑΡΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Παθολόγος Ογκολόγος MD, MSc, PhD, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Θεραπευτική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Επιστημονικά Υπεύθυνος, Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν. Κέρκυρας

ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Επεμβατικής Καρδιολογίας, Π.Γ.Ν. Πατρών

ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Γηριατρικής Ογκολογίας

ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Πνευμονολόγος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

MSc, MD, PhD, EBIR, Καθηγητής Επεμβατικής Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας-Αγγειογραφίας, Π.Γ.Ν. Πατρών

ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, MD, PhD, MSc, Διευθυντής, Δ' Ογκολογική Κλινική, «Metropolitan General»

ΚΟΚΚΑΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

MD, MSc, Επιμελήτρια Παθολογικής Ογκολογίας, Β' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, «Mediterraneo Hospital», Αθήνα

ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

MD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής & Επιστημονικά Υπεύθυνος, Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα & Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

ΚΟΤΤΕΑΣ ΗΛΙΑΣ

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ANNA

MD, PhD, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Παθολόγος Ογκολόγος, Αιματολογική-Ογκολογική Μονάδα, Δ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Π.Ν.Α. «Αττικόν»

5^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Παρόν και Μέλλον ΣΥΝΕΔΡΙΟ στην Ογκολογία

ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας
Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα,
Π.Γ.Ν. Πατρών

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Β' Ογκολογική Κλινική, «Metropolitan»
Hospital

ΚΥΡΙΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Α', Δερματολογική
Κλινική, Γ.Ν. Πατρών

ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Χειρουργός Θώρακος, Αν. Καθηγητής, Καρδιοθωρακοχειρουργική
Κλινική, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

Παθολόγος Ογκολόγος, Π.Γ.Ν. Πατρών

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Αν. Διευθυντής, Γ' Ογκολογική Κλινική,
Νοσοκομείο «Υγεία»

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας, Αιματολογικό
Τμήμα Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Πατρών

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος MD, MSc, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα και
Κέντρο Κλινικών Μελετών, «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

ΛΕΚΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Πανεπιστημιακή
Παθολογική Κλινική & Τμήμα Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. Πατρών

ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας,
Π.Γ.Ν. Πατρών

ΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Παθολογικό Ογκολογικό
Τμήμα, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

ΛΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ

Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α' Ε.Σ.Υ., Μονάδα Μεταμόσχευσης
Μυελού των Οστών, Π.Γ.Ν. Πατρών

ΛΙΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

MD, Bsc, Msc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογικό Τμήμα
Παθολογικού Τομέα, Π.Γ.Ν. Πατρών

ΛΙΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Παθολόγος Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Θεραπευτικής
Ογκολογίας Ε.Κ.Π.Α., Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

ΛΥΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Πνευμονολόγος MSc, PhD, Επιμελητής, Πνευμονολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Πατρών

5^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Παρόν και Μέλλον ΣΥΝΕΔΡΙΟ στην Ογκολογία

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων, Διευθυντής, Παθολογική Κλινική & Τμήμα Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. Πατρών

ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ

Παθολόγος Ογκολόγος, Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Τρικάλων

ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΜΗΤΣΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Θωρακοχειρουργός, Επιμελητής Α', Πανεπιστημιακή Θωρακοχειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αν. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Υπεύθυνος, Ιατρείο Κολποσκόπησης, Π.Γ.Ν. Πατρών

ΜΟΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

MD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Β' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

ΜΟΥΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ

MD, PhD, Αιματολόγος, Διευθύντρια, Κέντρο Αίματος, Π.Γ.Ν. Πατρών

ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

PhD, Επιστημονικός Διευθυντής Genekor I.A.E

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

Παθολόγος Ογκολόγος, Αν. Διευθύντρια, Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Μητέρα»

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, MD, PhD, Εντεταλμένος Διδάσκων Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

ΝΤΡΟΥΦΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Παθολόγος Ογκολόγος, Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Ιασώ»

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Παθολόγος Ογκολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογικής Ογκολογίας Ε.Κ.Π.Α., Β' ΠΠΚ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

PhD, Ψυχολόγος, Ογκολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. Πατρών

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΥΣΑ

Δερματολόγος Αφροδισιολόγος, cPhD, Επιμελήτρια Β', Δερματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Χειρουργός Θώρακος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής, Θωρακοχειρουργικό Τμήμα, «Ολύμπιον» Θεραπευτήριο, Πάτρα

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, «Ευρωκλινική» Αθηνών

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνος, Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Α. «Αρεταίειο»

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής & PET/CT, Π.Γ.Ν. Πατρών

5^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Παρόν και Μέλλον ΣΥΝΕΔΡΙΟ στην Ογκολογία

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Β' Ογκολογική Κλινική,
«Metropolitan General»

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

MD, PhD, PharmD, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής,
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

MSc, PgDip (Onc), MRCP, CCT (UK), Ογκολόγος, Μονάδα
Χημειοθεραπείας, «Ολύμπιον» Θεραπευτήριο, Γενική Κλινική
Πατρών, Medical Director, PPD- Thermo Fisher

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ομ. Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας, Α.Π.Θ.

ΠΑΠΑΞΟΪΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Β' Παθολογική Κλινική,
Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

MD, MSc, PhD, FEBU, FES, Πρωτοβάθμιος Καθηγητής
Ουρολογίας Ε.Κ.Π.Α., Β' Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Παθολογοανατόμος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου
Πατρών, Professor of Pathology, Univ. of Pittsburgh, School of
Medicine, Pittsburgh, PA, USA, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής
Ομάδας Σαρκωμάτων και Σπανίων Όγκων (ΕΟΣΣΟ), Συντονιστής της
Ομάδας Οστών και Μαλακών Μορίων της Ελληνικής
Παθολογοανατομικής Εταιρίας (ΕΕΠΑ)

ΠΕΚΤΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής,
Γ' Ογκολογικό Τμήμα, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Α' Παθολογική Ογκολογική
Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ-ΙΣΙΔΩΡΑ

MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Γ.Ν. Βόλου
«Αχιλλοπούλειο»

ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Υπεύθυνος, Ογκολογικό
Τμήμα, Γ.Π.Ν. Τρίπολης

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α' Ογκολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

ΠΟΜΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Μονάδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Π.Γ.Ν.
Πατρών

ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

Παθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. Πατρών

ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΑ

Αρχισυντάκτρια και Ιατρική Συντάκτρια, Εφημερίδα
«Πελοπόννησος»

ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Αν. Καθηγητής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών
Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

5^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Παρόν και Μέλλον ΣΥΝΕΔΡΙΟ στην Ογκολογία

ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Β' Ογκολογική Κλινική,
«Metropolitan» Hospital

ΣΑΜΨΩΝΑΣ ΦΩΤΗΣ

MD, PhD, Επ. Καθηγητής Πνευμονολογίας, Π.Γ.Ν. Πατρών

ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ

MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθύντρια, Α' Ογκολογική
Κλινική, «Metropolitan» Hospital Αθήνα, Επιστημονικός Υπεύθυνος,
Ογκολογικό Τμήμα, «Ασκληπιός ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ», Ηράκλειο Κρήτης

ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΣΗΦ

Παθ. Ογκολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνος, Παθολογική-Ογκολογική
Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

ΣΚΑΦΙΔΑ ΕΥΘΥΜΙΑ

Παθολόγος Ογκολόγος, Νοσοκομείο «Αρεταίειο», Νοσοκομείο
«Ιασώ»

ΣΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

MSc, PhD Πυρηνικός Ιατρός, Αν. Διευθύντρια, Τμήμα Πυρηνικής
Ιατρικής, Υπεύθυνη, PET/CT, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Επ. Καθηγήτρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Διευθύντρια,
Μονάδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Π.Γ.Ν. Πατρών

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Παθολόγος Ογκολόγος, Γ.Ν. Καλαμάτας

ΣΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας

ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Καθηγητής Επεμβατικής Πνευμονολογίας Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Βρογχολογίας και Επεμβατικής
Πνευμονολογίας

ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ ΑΛΕΞΗΣ

MRCR, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Ε' Παθολογική
Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Υγεία»

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Γαστρεντερολόγος, Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Παθολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Πατρών

ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Καθηγητής Πνευμονολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής,
Πνευμονολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών

ΤΙΜΟΘΕΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Αν. Καθηγήτρια Παθολογίας Ογκολογίας Α.Π.Θ., Διευθύντρια,
Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας, Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

ΤΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Oncoderm
Center (ΜΗΝ) Ιωάννινα

ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ ΕΛΛΗ-ΣΟΦΙΑ

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Παθολογική Ογκολογική Κλινική,
Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

ΤΡΙΧΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης,
Νοσοκομείο «Ιασώ»

ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Β' Παθολογική Ογκολογική
Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

• Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Γενιατρικής Ογκολογίας

• Σε συνεργασία με: Ογκολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
Εταιρεία Μελέτης Συμπαγών Νεοπλασιών (ΕΜΣΝ) / Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα (HeCOG)

5^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Παρόν και Μέλλον ΣΥΝΕΔΡΙΟ στην Ογκολογία

ΤΣΙΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Φαρμακοποιός, Διευθύντρια, Φαρμακείο, Π.Γ.Ν. Πατρών

ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Αν. Διευθυντής, Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Υγεία»

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, MSc Βιοπληροφορική, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, 417 ΝΙΜΤΣ, Επιστημονικός Συνεργάτης, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

ΧΑΒΕΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

MD, cMS, PhD, Χειρουργός Μαστού, Διδάκτωρ Ιατρικής, Πανεπιστημίου Πατρών

ΧΑΡΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

MD, PhD, Ενδοκρινολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας-Μοριακή Ενδοκρινολογία, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ


Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Β', Ογκολογική Κλινική, «Metropolitan» Hospital

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Professor of Medicine at Heidelberg University, MD, PhD, Hematologist & Medical Oncologist in the Thoraxklinik and National Center for Tumor Diseases (NCT) at Heidelberg University Hospital, Germany

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια-Υπεύθυνη, Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»



Οργάνωση: _____

Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας

Σε συνεργασία: _____

Ογκολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

Εταιρεία Μελέτης Συμπαγών Νεοπλασιών (ΕΜΣυν)

Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα (HeCOG)

Υπό την αιγίδα: _____

Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας

Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας

Ημερομηνία διεξαγωγής: _____

12-14 Ιουνίου 2025

Τόπος διεξαγωγής: _____

Ξενοδοχείο Achaia Beach

Μήλου 44, Πάτρα 264 42

Εγγραφές: _____

Η εγγραφή και η παρακολούθηση επιτρέπεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας, καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να πιστοποιήσουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα (όπως η ταυτότητα ιατρικού ή φαρμακευτικού συλλόγου, νοσηλευτική ή φοιτητική ταυτότητα).

Οδηγίες φυσικής παρακολούθησης: _____

Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό badge (barcode), το οποίο θα πρέπει να σκανάρουν κατά την είσοδο και έξοδο τους στην αίθουσα.

Οδηγίες διαδικτυακής παρακολούθησης: _____

Εάν είσατε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο www.livemed.gr (πατήστε στο πεδίο Register/Εγγραφή). Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε την κατηγορία Live και το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο Go Live ή Go Virtual. Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγете από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την «Αίθουσα Συνεδριάσεων». Εάν σας ενδιαφέρει να παραλάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο Συνέδριο μέσω της Εικονικής Γραμματείας, πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο «Εγγραφή», ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος.

Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης: _____

Θα χορηγηθούν 22 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ECMECs).

Παραλαβή πιστοποιητικού: _____

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου, σε όσους συμμετέχοντες έχουν εγγραφεί και παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης. Ο αριθμός των Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ECMECs), θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης που θα καταγραφεί στο σύστημα καταμέτρησης (στην είσοδο της αίθουσας, για τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία και στην πλατφόρμα Livemed, για τους διαδικτυακούς συμμετέχοντες).

Σημείωση: Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα για λήψη έως 12 μήνες από τη λήξη της εκδήλωσης.

Γραμματεία: _____



Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σμύρνη

- Τηλ.: 210 98 80 032
- Website: www.events.gr
- E-mail: ets@events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η E.T.S. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr (πολιτική απορρήτου).



• Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας

• Σε συνεργασία με: Ογκολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
Εταιρεία Μελέτης Συμπαγών Νεοπλασιών (ΕΜΣΝ) / Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα (HeCOG)

5^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Παρόν και Μέλλον ΣΥΝΕΔΡΙΟ στην Ογκολογία

➔ ΧΟΡΗΓΟΙ _

abbvie

anaBIOsis

ariti® *για το μέλλον*

astellas

AstraZeneca

Bayer

BIANEE A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΣΗΣ

Bristol Myers Squibb

Daiichi-Sankyo

EIZO

ELPEN

FARAN ONCOLOGY

Galenica a.e.

GENE analysis
EndoPredict

Genekor
Committed to Biotechnological Innovation

GENESIS pharma

GILEAD
Oncology

GSK

HEMOGLOBE
WHEN TECHNOLOGY SERVES HUMAN

innovis
Future health today

INTEGRIS PHARMA

IPSEN

Johnson & Johnson

Lavipharm

LEO

Lilly
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

medicair

MERCK

MSD

Pfizer
Oncology

Pierre Fabre
FARMAKA S.A.

RAFARM

Roche

SERVIER
moved by you

Takeda

teva

WinMedica

IBRANCE (palbociclib)
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ 75 mg, 100 mg και 125 mg

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Υπερευαίσθηση στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Χρήση σκευασμάτων που περιέχουν υπερικό/βαλσαμόχορτο (St. John's Wort).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Προ/περιεμνηνοπαυσιακές γυναίκες: Όταν το IBRANCE χορηγείται σε προ/περιεμνηνοπαυσιακές γυναίκες σε συνδυασμό με αναστολέα αρωματάσης, είναι υποχρεωτική η ωοθηκτομή ή η καταστολή της λειτουργίας των ωοθηκών με χορήγηση αγωνιστή LHRH, λόγω του μηχανισμού δράσης των αναστολέων της αρωματάσης. Ο συνδυασμός του palbociclib με τη φουλβεστράντη σε προ/περιεμνηνοπαυσιακές γυναίκες έχει μελετηθεί μόνο σε συνδυασμό με ένα αγωνιστή LHRH. Κρίσιμη απλαγγκική νόσος: Η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του palbociclib δεν έχουν μελετηθεί σε ασθενείς με κρίσιμη απλαγγκική νόσο. Διαταραχές διατροφής: Για ασθενείς που εμφανίζουν ουδετεροπενία Βαθμού 3 ή 4 συνιστάται διακοπή της δόσης, μείωση της δόσης ή καθυστέρηση στην έναρξη των κύκλων της θεραπείας. Θα πρέπει να διεξάγεται κατάλληλη παρακολούθηση (βλ. παράγραφο «ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ»). Διάμεση πνευμονοπάθεια/πνευμονίτιδα: Μπορεί να παρουσιαστεί βαριάς μορφής, απειλητική για τη ζωή ή θανατηφόρα ILD ή/και πνευμονίτιδα σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με IBRANCE, όταν λαμβάνεται σε συνδυασμό με ενδοκρινική θεραπεία. Σε κλινικές μελέτες (PALOMA-1, PALOMA-2, PALOMA-3), το 1,4% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με το IBRANCE παρουσίασε ILD/πνευμονίτιδα οποιουδήποτε βαθμού, 0,1% παρουσίασε βαθμίου 3, ενώ δεν αναφέρθηκαν περιπτώσεις βαθμού 4 ή θανατηφόρες περιπτώσεις. Επιπλέον περιπτώσεις ILD/πνευμονίτιδας έχουν παρατηρηθεί μετά την κυκλοφορία στην αγορά, με την αναφορά θανατηφόρων περιστατικών (βλ. παράγραφο «ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ»). Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για πνευμονικά συμπτώματα ενδεικτικά ILD/πνευμονίτιδας (π.χ. υποξεία, βήχας, δύσπνοια). Σε ασθενείς που παρουσιάζουν νέα ή επιδεινούμενα αναπνευστικά συμπτώματα και υπάρχει η υποψία ανάπτυξης ILD/πνευμονίτιδας, το IBRANCE θα πρέπει να διακόπτεται αμέσως και ο ασθενής θα πρέπει να αξιολογείται. Το IBRANCE θα πρέπει να διακόπτεται οριστικά σε ασθενείς με βαριάς μορφής ILD ή πνευμονίτιδα. Λοιμώξεις: Καθώς το IBRANCE έχει μυελοκατασταλτικές ιδιότητες, μπορεί να προδιαθέσει τους ασθενείς για λοιμώξεις. Λοιμώξεις έχουν αναφερθεί σε υψηλότερο ποσοστό σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με το IBRANCE σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες σε σύγκριση με ασθενείς που έλαβαν θεραπεία στο αντίστοιχο σκέλος σύγκρισης. Λοιμώξεις Βαθμού 3 και Βαθμού 4 εμφανίστηκαν αντίστοιχα στο 5,6% και το 0,9% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με το IBRANCE σε οποιονδήποτε συνδυασμό (βλ. παράγραφο «ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ»). Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για σημεία και συμπτώματα λοίμωξης και τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις ιατρικές ενδείξεις. Οι γιατροί θα πρέπει να ενημερώνουν τους ασθενείς ώστε να αναφέρουν αμέσως οποιαδήποτε επεισόδια πυρετού. Φλεβική θρομβοβίωση/βλάβη: Συμβαίνει φλεβικής θρομβοβίωσης αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με το IBRANCE (βλ. παράγραφο «ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ»). Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για σημεία και συμπτώματα εν το Βάθει φλεβικής θρόμβωσης και πνευμονικής εμβολής και να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις ιατρικές ενδείξεις. Ηπατική δυσλειτουργία: Το IBRANCE θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, υπό στενή παρακολούθηση για σημεία τοξικότητας. Νεφρική δυσλειτουργία: Το IBRANCE θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία, υπό στενή παρακολούθηση για σημεία τοξικότητας. Ταυτόχρονη θεραπεία με αναστολείς ή επαγωγείς του CYP3A4: Οι ισχυροί αναστολείς του CYP3A4 μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένη τοξικότητα. Θα πρέπει να αποφευχθεί η ταυτόχρονη χρήση ισχυρών αναστολέων του CYP3A κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το palbociclib. Το ενδεχόμενο συγχρόνησης θα πρέπει να εξετάζεται μόνο μετά από προσεκτική αξιολόγηση των δυνητικών οφελών και κινδύνων. Εάν η συγχρόνηση με ισχυρό αναστολέα του CYP3A δεν μπορεί να αποφευχθεί, μειώστε τη δόση του IBRANCE στα 75 mg μία φορά την ημέρα. Όταν διακοπεί ο ισχυρός αναστολέας, η δόση του IBRANCE θα πρέπει να αυξάνεται (μετά από 3 - 5 ημιπεριόδους ζωής του αναστολέα) έως τη δόση που χρησιμοποιούσατε πριν την έναρξη του ισχυρού αναστολέα του CYP3A. Η συγχρόνηση επαγωγών του CYP3A μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη έκθεση στο palbociclib και κατά συνέπεια σε κίνδυνο έλλειψης αποτελεσματικότητας. Συνεπώς, η ταυτόχρονη χρήση του palbociclib με ισχυρούς επαγωγείς του CYP3A4 θα πρέπει να αποφευχθεί. Δεν απαιτείται καμία προσαρμογή της δόσης για τη συγχρόνηση του palbociclib με μέτριους επαγωγείς του CYP3A. Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία ή οι σύντροφοί τους: Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία ή οι άνδρες σύντροφοί τους πρέπει να χρησιμοποιούν μία μέθοδο αντισύλληψης υψηλής αποτελεσματικότητας ενώ παίρνουν το IBRANCE. **ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:** Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Το συνολικό προφίλ ασφάλειας του IBRANCE βασίζεται σε συγκεντρωτικά δεδομένα από 872 ασθενείς που έλαβαν palbociclib σε συνδυασμό με ενδοκρινική θεραπεία (N = 527 σε συνδυασμό με λετροζόλη και N = 345 σε συνδυασμό με φουλβεστράντη) σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες σε HR-θετικό, HER2-αρνητικό προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 20%) οποιουδήποτε βαθμού που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν palbociclib σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ήταν ουδετεροπενία, λοιμώξεις, κόπωση, ναυτία, στοματίτιδα, αναμία, διάρροια, αλωπεκία και θρομβοπενία. Οι πιο συχνές (≥ 2%) ανεπιθύμητες ενέργειες Βαθμού ≥ 3 του palbociclib ήταν ουδετεροπενία, λευκοπενία, λοιμώξεις, αναμία, αυξημένη ασπартική αμινοτρανσφεράση (AST), κόπωση και αυξημένη αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT). Μειώσεις της δόσης ή τροποποιήσεις της δόσης λόγω οποιουδήποτε ανεπιθύμητης ενέργειας αναφέρθηκαν στο 38,4% των ασθενών που έλαβαν το IBRANCE σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ανεξαρτήτως συνδυασμού. Οριστική διακοπή λόγω ανεπιθύμητης ενέργειας αναφέρθηκε στο 5,2% των ασθενών που έλαβαν το IBRANCE σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ανεξαρτήτως συνδυασμού. Παράκατω αναφέρονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες από το συγκεντρωτικό σύνολο δεδομένων 3 τυχαιοποιημένων μελετών. Η διάμεση διάρκεια της θεραπείας με palbociclib στο συγκεντρωτικό σύνολο δεδομένων κατά την τελική ανάλυση της συνολικής επιβίωσης (OS) ήταν 14,8 μήνες. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται ανά κατηγορία συχνότητας. Οι κατηγορίες συχνότητας ορίζονται ως ακολούθως: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), ή και όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100). **Προτιμώμενος όρος (PT)** Πολύ συχνές: Λοιμώξεις^a, ουδετεροπενία^a, λευκοπενία^a, αναμία^a, θρομβοπενία^a, μειωμένη όρεξη, στοματίτιδα^a, ναυτία, διάρροια, έμετος, εξάνθημα^a, αλωπεκία, ηπιοδερμία, κόπωση, εξασθένιση, πυρετός, ALT αυξημένη, AST αυξημένη, Συχνές: Εμπύρετη ουδετεροπενία, δυσανεμία, όραση θαμπή, δακρύρροια αυξημένη, ερυσθραμία, φλεβική θρομβοβίωση, επίσπαση, ILD/πνευμονίτιδα^a, σύνδρομο παλαιο-πελματιαίας ερυθροδυσαισθησίας, κρεατινίνη αίματος αυξημένη. Όχι συχνές: Δερματικές ερυθματώδεις αλλοίες, πολυμορφο ερύθημα, ALT=αμινοτρανσφεράση της αλανίνης, AST=ασπартική αμινοτρανσφεράση, ILD=διάμεση πνευμονοπάθεια, N/n = αριθμός ασθενών, N/A=δεν εφαρμόζεται. ^aΟι PT αναγράφονται σύμφωνα με το MedDRA 171. ^bΟι λοιμώξεις περιλαμβάνουν όλους τους PT που αποτελούν μέρος της Κατηγορίας Οργανικού Συστήματος «Λοιμώξεις και παρασιτώσεις». ^cΗ ουδετεροπενία περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Ουδετεροπενία. Αριθμός ουδετεροφίλων μειωμένος. ^dΗ λευκοπενία περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Λευκοπενία. Αριθμός λευκοκυττάρων μειωμένος. ^eΗ αναμία περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Αναμία, Αιμοσφαιρίνη μειωμένη, Αιματοκρίτης μειωμένος. ^fΗ θρομβοπενία περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Θρομβοπενία, Αριθμός αιμοπεταλίων μειωμένος. ^gΗ στοματίτιδα περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Αφθώδης στοματίτιδα, Χειλίτιδα, Γλωσσίτιδα, Γλωσσόδυνια, Εξέλιξη του στόματος, Φλεγμονή βλεννογόνου, Άλγος του στόματος, Στοματοφαρυγγική δυσφορία, Στοματοφαρυγγικό άλγος, Στοματίτιδα. ^hΤο εξάνθημα περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Εξάνθημα, Κηλιδωπατώδεις εξάνθημα, Κνησμός εξάνθημα, Ερυθματώδεις εξάνθημα, Βλατιδώδεις εξάνθημα, Δερματίτιδα, Δερματίτιδα ομοιάζουσα με ακμή, Τοξικό εξάνθημα δέρματος. ⁱΗ ILD/πνευμονίτιδα περιλαμβάνει κάθε αναφερόμενο PT που αποτελεί μέρος του τυποποιημένου Ερωτηματολογίου MedDRA για τη διάμεση πνευμονοπάθεια (ή με στενή έννοια). ^jΗ φλεβική θρομβοβίωση περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: πνευμονική εμβολή, εμβολή, εν το Βάθει φλεβική θρόμβωση, περιφερικός εμβολισμός, θρόμβωση.

Στον παρακάτω Πίνακα αναφέρονται οι εργαστηριακές παθολογικές τιμές που παρατηρήθηκαν σε συγκεντρωτικό σύνολο δεδομένων 3 τυχαιοποιημένων μελετών (N = 872).

Εργαστηριακές παθολογικές τιμές	IBRANCE συν λετροζόλη ή φουλβεστράντη			Σκέλη συγκριτικού παράγοντα*		
	Κάθε Βαθμίου %	Βαθμού 3 %	Βαθμού 4 %	Κάθε βαθμίου %	Βαθμού 3 %	Βαθμού 4 %
WBC μειωμένα	97,4	41,8	1,0	26,2	0,2	0,2
Ουδετερόφιλα μειωμένα	95,6	57,5	11,7	17,0	0,9	0,6
Κρεατινίνη αίματος αυξημένη	95,5	1,6	0,3	86,8	0,0	0,0
Αναμία	80,1	5,6	Δ/1	42,1	2,3	Δ/1
Αιμοπετάλια μειωμένα	65,2	1,8	0,5	13,2	0,2	0,0
AST αυξημένη	55,5	3,9	0,0	43,3	2,1	0,0
ALT αυξημένη	46,1	2,5	0,1	33,2	0,4	0,0

WBC=λευκά αιμοσφαίρια, AST=ασπартική αμινοτρανσφεράση, ALT=αμινοτρανσφεράση της αλανίνης, N=αριθμός ασθενών, Δ/1=δεν ισχύει. Σημείωση: Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων θα διαβάζονται ανάλογα με τον βαθμό βαρύτητας της έκδοσης 4.0 των NCI CTCAE. * Λετροζόλη ή φουλβεστράντη. **Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών.** Συνολικά, ουδετεροπενία οποιουδήποτε βαθμού αναφέρθηκε σε 716 (82,1%) ασθενείς που έλαβαν IBRANCE ανεξαρτήτως συνδυασμού, με ουδετεροπενία Βαθμού 3 να έχει αναφερθεί σε 500 (57,3%) ασθενείς και ουδετεροπενία Βαθμού 4 να έχει αναφερθεί σε 97 (11%) ασθενείς. Ο διάμεσος χρόνος μέχρι το πρώτο επεισόδιο ουδετεροπενίας οποιουδήποτε βαθμού ήταν 15 ημέρες (12-700 ημέρες) και η διάμεση διάρκεια ουδετεροπενίας Βαθμού ≥ 3 στις 3 τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ήταν 7 ημέρες. Εμπύρετη ουδετεροπενία αναφέρθηκε στο 0,9% των ασθενών που έλαβαν IBRANCE σε συνδυασμό με φουλβεστράντη και στο 1,7% των ασθενών που έλαβαν palbociclib σε συνδυασμό με λετροζόλη. Εμπύρετη ουδετεροπενία αναφέρθηκε σε περίπου 2% των ασθενών που εκτέθηκαν στο IBRANCE κατά τη διάρκεια του συνολικού κλινικού προγράμματος. **Παιδιατρικός πληθυσμός:** Το palbociclib, σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, έχει αξιολογηθεί σε 79 παιδιατρικούς ασθενείς με συμπτωτικές όγκους, συμπεριλαμβανομένου του υποτροπιάζοντος ή ανθεκτικού σαρκώματος του Ewing (EWS) στη μελέτη A5481092. Το προφίλ ασφάλειας του palbociclib σε αυτόν τον παιδιατρικό πληθυσμό ήταν συνεπές με το γνωστό προφίλ ασφάλειας στον πληθυσμό ενηλίκων. **Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών.** Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπεται η συνηχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενο ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω: **Ελλάδα:** Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 248, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040337, Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitinkitarka.gr>. **Κύπρος:** Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Τηλ: +357 22608607, Φαξ: + 357 22608669, Ιστοτόπος: <http://www.moh.gov.cy/phs>. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Βέλγιο. **ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:** Pfizer Ελλάς Α.Ε., Λ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα, Τηλ.: +30 210 6785800. **ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:** Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch), Λεωφόρος Αθαλάσσας 26, Κτίριο Στεφανίδη, 2^{ος} Όροφος, 2018 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22 817690. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** EU/1/16/1147/010, 012, 014. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 10/2024. **75 MG BT X 21 TABS, 100 MG BT X 21 TABS, 125 MG BT X 21 TABS, ΔΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΞΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ - ΕΛΛΑΔΑ:** Α.Τ.: 2.278,31 €, Ν.Τ.: 1.876,22€. **ΔΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ - ΚΥΠΡΟΣ:** Α.Τ.: 2.501,69€. **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής. **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:** Με ιατρική συνταγή. **ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ.**

