

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:



Ελληνική Εταιρεία
Γηριατρικής Ογκολογίας

Διημερίδα

Ογκολογικά Επίκαιρα

13-14
ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

Ξενοδοχείο MONASTY
Θεσσαλονίκη

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



Akynzeo®

netupitant/palonosetron

Ένα καψάκιο περιέχει 300 mg netupitant και 0,5 mg palonosetron

 **Galenica α.ε.**

ΑΘΗΝΑ: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 145 64, τηλ.: 210 5281700
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Χάλκης 8, Πυλαία 555 35, τηλ.: 2310 540478
Επιστημονικό Τμήμα τηλ.: 210 5281731
Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης τηλ.: 210 5281805
www.galenica.gr

 **HELSINN**
Building quality cancer care together

Διανέμεται κατόπιν αδείας της Helsinn Healthcare S.A, Ελβετία

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Περαιτέρω πληροφορίες περιλαμβάνονται στη
συνοπτική Περιγραφή Χαρακτηριστικών Προϊόντος



Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Είναι μεγάλη τιμή και χαρά μας να σας υποδεχόμαστε για 6η συνεχόμενη χρονιά στη Θεσσαλονίκη στην επιστημονική διημερίδα «Ογκολογικά Επίκαιρα» στις 13 - 14 Ιουνίου 2025, η οποία τελεί υπό την οργάνωση της Ελληνικής Εταιρείας Γηριατρικής Ογκολογίας.

Είναι αναμφισβήτητο ότι οι αλματώδεις εξελίξεις στην Ογκολογία, όπως αυτές αποτυπώνονται στις καινοτόμες επιστημονικές πληροφορίες και γνώσεις που μεταφέρονται συνεχώς στην καθημερινή πράξη, δίνουν υποσχέσεις πως ο καρκίνος πλέον μπορεί να αντιμετωπιστεί έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια, δορυφορικές διαλέξεις και ανακοινώσεις, που καλύπτουν επίκαιρα θέματα και πραγματεύονται τις νεώτερες εξελίξεις και τα σύγχρονα δεδομένα σε όλο το φάσμα της Ογκολογίας.

Πιστεύουμε ότι η παρουσίαση αυτών των θεμάτων από διακεκριμένους ομιλητές με πλούσιο κλινικό και ερευνητικό έργο αλλά και από νεότερους συναδέλφους με σημαντική κλινική εμπειρία και ποικίλα ερευνητικά ενδιαφέροντα αποτελεί εχέγγυο για το υψηλό επίπεδο της διημερίδας.

Η θεματολογία της διημερίδας καλύπτει ευρύ φάσμα των αντικειμένων της ογκολογίας με έμφαση στις κυριότερες εξελίξεις των θεραπειών και την καλύτερη αξιοποίηση των νέων όπλων που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας.

Είμαστε σίγουροι ότι η διημερίδα αυτή θα συντελέσει αποτελεσματικά στην ενημέρωση για τα εντυπωσιακά επιτεύγματα της σύγχρονης έρευνας και τις νέες θεραπευτικές δυνατότητες που παρέχονται και ελπίζουμε να αποτελέσει εφελκυστικό γνώσης, διαλόγου, επικοινωνίας και άμεσης συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων.

Η συμμετοχή σας στην παρακολούθηση του προγράμματος είτε με φυσική είτε με διαδικτυακή παρουσία, θα μας τιμήσει ιδιαίτερα και θα συμβάλλει στην επιτυχία της Διημερίδας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Οι Πρόεδροι του Συνεδρίου

Αναστάσιος Βαγιωνάς
Παθολόγος-Ογκολόγος

Δημήτριος Καρδαμάκης
Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος

▽ Jemperli
(dostarlimab) Injection 500 mg


Zejula
niraparib
tablets 100 mg

ZEJULA - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Το κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει μονοδουρική τοσουλκή νιραπαρίμπη που ισοδυναμεί προς 100 mg νιραπαρίμπη.

Λιανική Τιμή: 3764,13€

% επικύρωσης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%, κατόπιν ένταξης του προϊόντος στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Περιορισμένη Ιατρική συνταγή. Η ένταξη της Θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευτείτε την Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος η οποία είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK. ©2024 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Ομίλου GSK.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

JEMPERLI - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Ένα φιαλίδιο πυκνού διαλύματος για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση των 10 ml περιέχει 500 mg dostarlimab. Κάθε ml πυκνού διαλύματος για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση περιέχει 50 mg dostarlimab. Το dostarlimab είναι ένα ανθρακοπολυμερές μονοκλωνικό αντίσωμα (mAb) ανοσοσφαιρίνης G₄ (IgG₄) κατά της πρωτεΐνης προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου-1 (PD-1), παράγεται με τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA σε κύτταρα ωσθικών κινεζικού κρικτού (CHO).

Λιανική Τιμή: 6011,33€

% επικύρωσης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%, κατόπιν ένταξης του προϊόντος στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευτείτε την Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος η οποία είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

▽ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες αν επιθυμητές ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και:

Ανεφέρετε:

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για

ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



www.kitritinikarta.gr

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
www.gr.gsk.com

GSK



Επιτροπές

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδροι: Α. Βαγιωνάς - Δ. Καρδαμάκης

Μέλη:

Λ. Βαμβακάς	Γ. Κατηνιώτης
Ι. Γαλητσιάνος	Ν. Μαλλιαρού
Γρ. Γεωργακόπουλος	Γ. Πισσάκας
Γ. Καϊάφα	Μ. Πομώνη
Αθ. Καραμπεάξης	Χ. Σαββόπουλος

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδροι: Α. Βαγιωνάς - Δ. Καρδαμάκης

Μέλη:

Α. Valavanis	Σ. Μπάκα
Κ. Αρβανίτη	Ν. Μπακάλης
Α. Αυγερινός	Α. Μπόκας
Ρ. Αυγερινός	Κ. Μπόνιου
Δ. Βαλούκας	Κ. Μποτσόλης
Ι. Γαλητσιάνος	Α. Μπούτης
Ι. Γουλής	Μ. Νικολάου
Δ. Δρούγκας	Σ. Νταϊλιάνης
Ι. Ελευσινιώτης	Μ. Παντούρα
Χ. Εμμανουηλίδης	Π. Παπακοτούλας
Γ. Καϊάφα	Ε.Ι. Περδικούρη
Ν. Καποδίστριας	Χ. Σαββόπουλος
Α. Καραμπεάξης	Δ. Σπυράτος
Δ. Καραχάλιος	Ε. Τιμοθεάδου
Φ. Κυριακίδης	Ι. Τριανταφυλλίδης
Θ. Λάμπουρα	Σ. Τσαγκαρόπουλος
Κ. Λόγα	Γ. Ταγαράκης
Α. Μακραντωνάκης	Θ. Τσιούδα
Π. Μακραντωνάκης	Γ. Τσουλφάς
Ν. Μαλλιαρού	Χ. Φορούλης
Δ. Μισαηλίδου	

DON'T MAKE THEM WAIT.

Start strong with CABOMETYX® + Nivolumab.



60% of aRCC patients don't reach 2L*2-4



67,6m FU results continue to support Cabometyx® - Nivolumab as a Standard of Care for previously untreated aRCC patients¹

Keep time on their side⁵

*Across three real-world studies, only 35-45% of patients received 2L²⁻⁴

References: 1. Motzer R, et al. Abstract 439. Presented at ASCO GU 2025. 2. Shah N, et al. Eur Urol. 2023;49:110-118. 3. Malik A, et al. Poster 19. Presented at IKCS 2023. 4. Lai G-S, et al. PLoS One. 2023;18(11):e0294039. 5. Bourlon MT, et al. Abstract 362, Presented at ASCO GU 2024.

IPSEN MON. ΕΠΕ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 9843324

E-mail: ipsenepe@ipsen.com

www.ipsen.com/greece

Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930

ΔΤΦ: 04/01/2025

CABOMETYX F.C.TAB 20MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€

CABOMETYX F.C.TAB 40MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€

CABOMETYX F.C.TAB 60MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€



Περίληψη Χαρακτηριστικών
Προϊόντος CABOMETYX®
Ημ. αναθεώρησης κειμένου,
06 Οκτωβρίου 2023

**CABOMETYX®**
(cabozantinib) tablets

10 CABO-A/MAR 2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

 **IPSEN**

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13 ΙΟΥΝΙΟΥ

2025

09:00 - 09:30	Προσέλευση - Εγγραφές	
09:30 - 11:00	Στρογγυλό Τραπέζι- Ομάδα Νέων Ελλήνων Ογκολόγων (ΟΝΕΟ) Επιλέγοντας επαγγελματικά το εξωτερικό. Εκπαίδευση ή επαγγελματική αποκατάσταση; Προεδρείο: Π. Βλαχοστέργιος, Α. Valavanis	
09:30 - 09:50	Ιταλία: Χ. Κουκουτζέλη	
09:50 - 10:10	Γαλλία: Μ. Γραμμουσσιάνου	
10:10 - 10:30	Μ. Βρετανία: Ι. Τήκας	
10:30 - 11:00	Σχολιαστής: Λ. Χέλης (Εμπειρία από Αραβικά Κράτη)	
11:00 - 11:30	Διάλειμμα καφέ	
11:30 - 12:30	Στρογγυλό τραπέζι: Κοστολόγηση Ιατρικών Πράξεων με το σύστημα των DRG στη σύγχρονη Ογκολογική Πρακτική Προεδρείο: Γ. Ταγαράκης, Β. Φυντανίδου, Ι. Γαλητσίανος	
11:30 - 12:00	Νεότερα Δεδομένα στην Κοστολόγηση των Ιατρικών Πράξεων: Η εφαρμογή του Μοντέλου των DRG στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας και η Αντιμετώπιση των Ειδικών Προκλήσεων στην Ογκολογία	Ι. Γαλητσίανος
12:00 - 12:30	Αποκλίσεις Κόστους και Μέσης Διάρκειας Νοσηλείας στα Ογκολογικά DRG	Σ. Καρακόλιας
12:30 - 14:00	Στρογγυλό Τραπέζι Μελάνωμα Προεδρείο: Σ. Μπάκα, Ν. Καποδίστριας, Α. Μπούτης	
12:30 - 13:00	Εξελίζει στην χειρουργική προσέγγιση ασθενών με μελάνωμα (surgical margins, lymph node basins, and in-transit disease)	Α. Μουτσούδης
13:00 - 13:30	Περιεγχειρητικές θεραπείες στην πρώιμη νόσο του μελανώματος	Α. Ραδουνισλής
13:30 - 14:00	Νεότερες εξελίξεις στην Ανοσοθεραπεία του μελανώματος	Σ. Νταϊλιάνης
14:00 - 15:00	Μεσημβρινή Διακοπή	

Lilly

A MEDICINE COMPANY



ALIMTA PD.C.SO.IN. 500mg/VIAL BTx1 VIAL

CYRAMZA CS.SOL.INF. 10MG/ML BTx2 VIALx10ML

VERZENIOS F.C.TAB 50, 100 και 150MG/TAB BTx28 δισκία σε BLISTERS PCTFE/PE/PVC/Alu

RETSEVMO F.C. CAP 40 και 80MG/CAP BTx56 σκληρά καψάκια σε BLISTERS PCTFE/PE/PVC/Alu

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών κάθε Προϊόντος είναι στη διάθεσή σας.
Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή στον υπερασύνδεσμο
<https://www.lilly.gr/landing-pages/spcs-oncology> ή σκανάρετε τον κωδικό QR



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

15° χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά,

ΤΗΛ.: 210 6294600, FAX.: 2106294610

Για παραγγελίες: ΤΗΛ.: 210 6294629, e-mail: orders@lilly.gr, www.lilly.gr

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα





15:00 - 17:00

Στρογγυλό Τραπέζι**Καρκίνος Πνεύμονα- Early stage**Προεδρείο: **Χ. Φορούλης, Θ. Τσιούδα, Δ. Καραχάλιος, Π. Παντελάκος**

15:00 - 15:30

Πρώιμος καρκίνος του πνεύμονα-Χειρουργείο

Σ. Τσαγκαρόπουλος

15:30 - 16:00

Πρώιμος καρκίνος του πνεύμονα- Θεραπείες

Κ. Αρβανίτη

16:00 - 16:30

Ενδείξεις cyberknife στο early stage του NSCLC ότι νεότερο στο χώρο

Π. Παντελάκος

16:30 - 17:00

Πρώιμος και τοπικά εκτεταμένος καρκίνος του πνεύμονα- Ακτινοθεραπεία

Κ. ΜπόνιουΣχολιασμός: **Μ. Κλιματσίδας, Μ. Κουκουράκης, Μ. Σαρόγλου**

17:00 - 17:30

Δορυφορική Διάλεξη

sponsored by

Προεδρείο: **Ε. Λάλλα**

17:00 - 17:25

Ο ρόλος της παρατεταμένης επικουρικής θεραπείας στις HER2+/HR+ ασθενείς με πρώιμο καρκίνο μαστού

Σ. Λέββα

17:25 - 17:30

Συζήτηση

17:30 - 19:00

Στρογγυλό Τραπέζι**Καρκίνος μαστού**Προεδρείο: **Ε. Τιμοθεάδου, Β. Μπαρμπούνης, Χ. Εμμανουηλίδης**

17:30 - 18:00

Νεότερα από τους αντι CDK4/6 αναστολείς στον καρκίνο του Μαστού

Μ. Τζήμου

18:00 - 18:30

Στοχεύοντας την ESR1 μετάλλαξη στον καρκίνο του μαστού. Η σημαντικότητα του sequence

Ν. Μαλλιαρού

18:30 - 18:50

Εξατομικευμένη θεραπευτική ακολουθία στον καρκίνο του μαστού με PI3K αναστολείς

Ε. Σόγκα

sponsored by



Σχολιασμός

vegzelma™ ▼ bevacizumab



Το ταξίδι της ζωής συνεχίζεται

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από τον Κ.Α.Κ.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ : Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από ιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία

Ενδείκνυται για τη θεραπεία σε ενήλικες ασθενείς

▼ Αυτό το φάρμακο τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιασδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών

Λιανική τιμή : VEGZELMA C/S.SOL.IN 25MG/ML BT X 1 VIAL X 16ML / Α.Τ.: 572,61 € VEGZELMA C/S.SOL.IN 25MG/ML BT X 1 VIAL X 4ML / Α.Τ.: 161,00 €



BIANEX Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΕΝΙΚΑΚΟΠΟΥΔΟΥ

BIANEX Α.Ε. - Έδρα : Οδός Βαρυμύτης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά,
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία, Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573
E-mail: mail@bianex.gr • WEBSITE: www.bianex.gr • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113,
562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης • Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

 **HEALTHCARE
CELLTRION**

Βεβαιώστε να γίνεται το φάρμακο που αγοράζετε και
λειτουργεί
ΟΛΕΣ τις αναγκαίες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΕΣΤΡΙΑΝ ΚΑΡΤΑ»

BE-25006-VEG-4/2025



Ογκολογικά Επίκαιρα

Ξενοδοχείο MONASTY

Θεσσαλονίκη

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13 ΙΟΥΝΙΟΥ

2025

18:50 - 19:30

Δορυφορική Διάλεξη

Decreasing the Burden of Therapy For Our Patients

The Emerging Role of Subcutaneous Therapy

Chairs: **Μ. Νικολάου, Ε. Δροσάκη, Α. Τιτοπούλου, Κ. Τσιακιτζής**

sponsored by



19:30 - 20:00

Συζήτηση-Σχολιασμός: **Ε.Ι. Περδικούρη, Χ. Ανδρεάδης, Γ. Καπετανάκης**

ΣΑΒΒΑΤΟ

14 ΙΟΥΝΙΟΥ

2025

09:15 - 10:45

Στρογγυλό τραπέζι

Τραπέζι Γηριατρικής Ογκολογίας

Προεδρείο: **Δ. Καρδαμάκης, Δ. Μισαηλίδου**

09:15 - 09:35

Γηριατρικοί ασθενείς και ακτινοθεραπεία στον πρώιμο καρκίνο του πνεύμονα

Α. Γκανταΐφη

09:35 - 09:55

Ακτινοθεραπεία σε γηριατρικούς ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου

Μ. Τριχάς

09:55 - 10:15

Ο ρόλος της σύγχρονης Ακτινοθεραπείας στη δημιουργία ενός πολιτισμικά ευαίσθητου οικοσυστήματος γηριατρικής ογκολογίας

Α. Μπαγκατζούνης

10:15 - 10:45

Σχολιασμός-Συζήτηση

10:45 - 11:00

Διάλειμμα καφέ

Υπερβαίνοντας τον Φόβο του Τρυπήματος



➤
Για πλήρεις
συνταγογραφικές
πληροφορίες
συμβουλευτείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος

Νοσοκομειακή Τιμή

PELGRAZ INJ.SOL 6MG/0.6ML (10MG/ML) 1 PF. SYR με προστατευτικό ασφαλείας x 0.6 ML +1 τολύπιο με ανόπνευμα 301,93€
PELGRAZ INJ.SOL 6MG/0.6ML (10MG/ML) 1 προγεμισμένος εγχυτήρας +1 τολύπιο με ανόπνευμα 301,93€

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται, σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού

Τοπικός Αντιπρόσωπος

WinMedica

Για περισσότερες πληροφορίες:
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Αγασιλίου 6-8, Μαρούσι 151 23
Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827
info@winmedica.gr
www.winmedica.gr

Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας
Accord Healthcare S.L.U.

accord
We make it better

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανταρξέτε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»





Ογκολογικά Επίκαιρα

Ξενοδοχείο MONASTY

Θεσσαλονίκη

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΣΑΒΒΑΤΟ

14 ΙΟΥΝΙΟΥ

2025

11:00 - 11:30

Δορυφορική Διάλεξηsponsored by  Bristol Myers SquibbΠροεδρείο: **Δ. Σπυράτος**

11:00 - 11:25

Καλύπτοντας το κενό με τον διπλό ανοσοαποκλεισμό στους ασθενείς με μεταστατικό ΜΜΚΠ και χαμηλή έκφραση PD-L1

Θ. Φλώρος

11:25 - 11:30

Συζήτηση

11:30 - 12:00

Δορυφορική Διάλεξηsponsored by  GENESIS
pharmΠροεδρείο: **Α. Βαγιωνάς**

11:30 - 11:55

Επαναπροσδιορίζοντας τις Θεραπευτικές Επιλογές πρώτης γραμμής για ασθενείς με μεταστατικό ΜΜΚΠ και θετική έκφραση PDL-1

Σ. Λαμπάκη

11:55 - 12:00

Συζήτηση

12:00 - 13:15

Στρογγυλό τραπέζι**Μεταστατικός καρκίνος του πνεύμονα**Προεδρείο: **Π. Παπακοτούλας, Π. Δημόπουλος, Κ. Νεανίδης**

12:00 - 12:30

Highlights για τους ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) και μεταλλάξεις του EGFR-Πιθανός Αλγόριθμος 1^{ης}, 2^{ης} γραμμής**Α. Μπόκας**

12:30 - 12:55

Highlights για τους ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) και ALK fusions -Πιθανός Αλγόριθμος 1^{ης}, 2^{ης} γραμμής**Κ. Λόγα**sponsored by  Pfizer
Oncology

12:55 - 13:00

Συζήτηση

13:00 - 13:30

Highlights ανοσοθεραπείας στην αντιμετώπιση των ασθενών με SCLC

Λ. ΚατσικάΣχολιαστής: **Δ. Βαλούκας**

13:30 - 14:30

Μεσημβρινή Διακοπή



Ogivri[®]

(trastuzumab)

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

Λ.Τ. σύμφωνα με το Δ.Τ. 12/2023*

OGIVRI 150MG BTx1VIAL: 322,59 €

OGIVRI 420MG BTx1VIAL: 995,36 €

*Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου δελτίου τιμών, θα ισχύουν οι νεότερες τιμές.



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη Περιληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σαρώνοντας τον QR κωδικό.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:
BIOSIMILAR COLLABORATIONS
IRELAND LIMITED, IRELAND
Unit 35/36, Grange Parade, Baldoyle
Industrial Estate, Dublin 13, Ireland D13
R20R

Τοπ. Αντιπρ. Ελλάδα:
BIOCON BIOLOGICS GREECE
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., ΕΛΛΑΔΑ
Λεωφόρος Κηφισίας 280, 15232 Χαλάνδρι,
Αθήνα, Ελλάδα.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοσέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Πρωτεύεται από την εταιρεία:

DEMO ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21^ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας, Κρυσνέρι 145 68, Αττική
t +30 210 81 61 802, f +30 210 81 61 587, info@demo.gr
www.demo.gr



Ογκολογικά Επίκαιρα

Ξενοδοχείο MONASTY
Θεσσαλονίκη

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΣΑΒΒΑΤΟ

14 ΙΟΥΝΙΟΥ

2025

14:30 - 16:30

Στρογγυλό τραπέζι**Θέματα αιχμής στην ογκολογική χειρουργική ήπατος και χοληφόρων**Προεδρείο: **Ι. Γαλάνης, Α. Μιχαλόπουλος, Ι. Τριανταφυλλίδης**

14:30 - 15:00

Χειρουργική αντιμετώπιση ηπατικών μεταστάσεων από
κολο-ορθικό καρκίνο.**Θ. Λάμπουρα**

15:00 - 15:30

Περτυλαίο χολαγγειοκαρκίνωμα: διάγνωση, καθορισμός
εξαιρεσιμότητας και εγχειρητικός σχεδιασμός**Ι. Τριανταφυλλίδης**

15:30 - 16:00

Διαχείριση ασθενή με ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα

Ν. Μπακάλης

16:00 - 16:30

Διαχείριση ασθενή με καρκίνο χοληδόχου κύστης

Ρ. ΑυγερινόςΣχολιασμός: **Δ. Γιακουστίδης**

16:30 - 17:00

Διάλεξη**Ογκολογική Μεταμόσχευση**Προεδρείο: **Γ. Τσουλάφας, Ι. Γουλής**Παρουσίαση πρωτοκόλλου Ογκολογικής μεταμόσχευσης με
ασθενείς με ορθοκολικό καρκίνο και ηπατικές μεταστάσεις μετά
από 1^η ή 2^η γραμμή χημειοθεραπείας**Α. Βαγιωνάς**

17:00 - 17:30

Διάλεξη**Ηπατοκυτταρικός καρκίνος**Προεδρείο: **Ι. Ελευσινιώτης, Α. Αυγερινός**

Πρώτης γραμμής θεραπείες στον ηπατοκυτταρικό καρκίνο

Ε. Καραμητρούσης

17:30 - 19:00

Στρογγυλό τραπέζι**Γαστρεντερικός καρκίνος**Προεδρείο: **D. Mauri, Α. Καραμπεάκης, Χ. Εμμανουηλίδης**

17:30 - 18:00

Επίκαιρα ογκολογικά στον θεραπευτικό αλγόριθμο
χολαγγειοκαρκινώματος**Κ. Μποτσόλης**

18:00 - 18:30

Η ανοσοθεραπεία στον θεραπευτικό αλγόριθμο της 1^{ης}
γραμμής μεταστατικού καρκίνου στομάχου.**Μ. Αυγουστίδου**

sponsored by MSD

18:30 - 19:00

Η εξέλιξη της ανοσοθεραπείας στον κολοορθικό καρκίνο.

Highlights

Φ. Κυριακίδης

Σχολιασμός

SANDOZ



ZARZIO[®]
filgrastim



ZIEXTENZO[®]
pegfilgrastim

ZARZIO

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Νοσοκομειακή τιμή σύμφωνα με το δελτίο αναθεωρημένων τιμών Δεκέμβριος 2024

Νοσοκομειακή τιμή:

ZARZIO 48 MIU: 78,56 €,

ZARZIO 30 MIU: 57,97 €

Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές

ZIEXTENZO

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση &/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο & μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Νοσοκομειακή τιμή σύμφωνα με το δελτίο αναθεωρημένων τιμών Δεκέμβριος 2024

Νοσοκομειακή τιμή:

ZIEXTENZO INJ.SO.PFS 6MG BTx1 PF.SYR 234,94 €

Σε περίπτωση έκδοσης νέου

Δελτίου Τιμών Φαρμάκων,

ισχύουν οι νεότερες τιμές

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας τον παρακάτω σύνδεσμο:



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

SANDOZ

KAK: Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Αυστρία

Τοπικός Αντιπρόσωπος:

SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Φραγκοκκλησιάς 7B, 151 25 Μαρούσι

Τηλ: +30 216 600 5000



Ογκολογικά Επίκαιρα

Ξενοδοχείο MONASTY

Θεσσαλονίκη

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΣΑΒΒΑΤΟ

14 ΙΟΥΝΙΟΥ

2025

19:00 - 21:00

Στρογγυλό Τραπέζι

Καρκίνος ουροποιητικού

Προεδρείο: **Χ. Παπανδρέου, Π. Μακραντωνάκης, Ε.Ι. Περδικούρη**

19:00 - 19:30

Ο λόγος της πυρηνικής ιατρικής στη διάγνωση και αντιμετώπιση
του καρκίνου του προστάτη**Δ. Δρούγκας**

19:30 - 20:00

Θεραπευτικός αλγόριθμος του μεταστατικού καρκίνου
του προστάτη. Με ορμονοευαισθησία και χωρίς
ορμονοευαισθησία.**Α.Ε. Μακραντωνάκης**

20:00 - 20:25

Καρκίνος νεφρού: Εστιάζοντας στον βέλτιστο θεραπευτικό
αλγόριθμο των συστηματικών θεραπειών προς όφελος
των ασθενών**Α. Ανδρεάδου**sponsored by  **IPSEN**

20:25 - 20:30

Συζήτηση

20:30 - 20:55

Navigating the Landscape: Treatment Strategies for Metastatic
Bladder Cancer**Γ. Πολυχρονίδου**sponsored by  **MERCK**

20:55 - 21:00

Συζήτηση

Χαιρετισμός - **P. Grivas**

21:00 - 21:10

Κλείσιμο Διημερίδας

Vectibix®

panitumumab

Η προσθήκη Vectibix στη
χημειοθεραπεία 1^{ης} γραμμής
βελτίωσε τη συνολική επιβίωση σε
ασθενείς με mCRC και KRAS WT*
με αριστερή εντόπιση και στο σύνολο
του πληθυσμού**1

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος <https://cloud.amgeninfo.com/vbxgr21>

Για ενδοφλέβια χορήγηση μόνο.

Τρόπος Διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από
γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.

Λιανική τιμή: VECTIBIX C/S.SOL.IN 100MG/5ML VIAL BT x 1 VIAL x 5 ML: 344,47 €

VECTIBIX C/S.SOL.IN 400MG/20ML VIAL BT x 1 VIAL x 20 ML: 1.307,65 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
συμπεριλαμβανομένης της "ΚΥΠΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα
αναφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενέργειων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
(ΕΟΦ) Τηλ: 2132040380, Fax: 2106540585, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας διεκδίκησης
και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ: www.eof.gr για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή
εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς, Φαρμακευτικό Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 2103447000.

*mCRC: metastatic colorectal cancer,
KRAS WT: Kirsten rat sarcoma viral
oncogene homologue Wild type

**συγκριτικά με bevacizumab

1. Watanabe J, et al. JAMA; 2023;329(15)
1271-82

AMGEN

AMGEN HELLAS ΕΠΕ

Αγ. Κωνσταντίνου 59-61

Green Plaza, κτίριο Γ, 15 124 Μαρούσι

Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050

Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr



Τίτλοι Ομιλητών - Προέδρων

Grivas Petros	Fred Hutchinson Cancer Research Center
Mauri David	Αναπληρωτής Καθηγητής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Valavanis Athinodoros	Consultant Neurologist, Clinical lead of Neurology Department, Royal Surrey Foundation Trust Guildford Surrey
Ανδρεάδης Χαράλαμπος	MD, PhD Παθολόγος – Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
Ανδρεάδου Άννα	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α' Γ' Ογκολογικής Κλινικής, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Αρβανίτη Κωνσταντίνα	Παθολόγος Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Επιστημ. Συνεργάτης Μονάδας Χημειοθεραπείας, Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
Αυγερινός Αντώνιος	Γαστρεντερολόγος
Αυγερινός Ραφαήλ	Ειδικευόμενος Χειρουργικής
Αυγουστίδου Μαρία	MD, FÄ, f. Deputy Director of St. Lukas Klinik Solingen, Medical Oncology, Palliative medicine, Germany
Βαγιωνάς Αναστάσιος	Παθολόγος Ογκολόγος, MD, MSc, PhD, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.
Βαλούκας Δημήτριος	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Βλαχοστέργιος Παναγιώτης	MD, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Cornell, ΗΠΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ογκολογική Κλινική «ΙΑΣΩ» Θεσσαλίας
Γαλάνης Ιωάννης	Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ., Διευθυντής Β' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο
Γαλητσιάνος Ιωάννης	MD, MSc, Καρδιολόγος Επιμελητής Α', Εντατικολόγος, Επειγοντολόγος Π.Γ.Ν.Θ. Α.Χ.Ε.Π.Α. Τ.Ε.Π
Γιακουστίδης Δημήτριος	MD, PhD, Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ, Α' Χειρουργική Κλινική, ΓΝΘ Παπαγεωργίου, Διευθυντής Ε' Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
Γκανταΐφη Αρετή	MD, PhD, Επίκουρη Καθηγήτρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Α.Π.Θ, Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ
Γουλής Ιωάννης	Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Α.Π.Θ., Δ' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

What science can do

Κλινική καινοτομία

Οι ψηφιακές τεχνολογίες δημιουργούν πρωτόγνωρες ευκαιρίες συλλογής δεδομένων από τους ασθενείς σε πραγματικό χρόνο.

Στην AstraZeneca αναπτύσσουμε τις ψηφιακές μας δυνατότητες σε όλο το φάσμα της Έρευνας και Ανάπτυξης, για να ανακαλύψουμε καλύτερους τρόπους τροφοδότησης των κλινικών μας μελετών με επικαιροποιημένη γνώση και να βοηθήσουμε τους ασθενείς στην πρόληψη, τη διαχείριση και τη θεραπεία της ασθένειάς τους.



ΤΙΤΛΟΙ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Γραμμουσιάνου Μαρία	Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Ογκολογικό Τμήμα, Γ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
Δημόπουλος Προκόπιος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμ. Α', Β' Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Δροσάκη Ευαγγελία	ΤΕ Νοσηλεύτρια, MSc, Προϊσταμένη Μ.Η.Ν. «Νίκος Κούρκουλος», Α. Ν. Θ Θεαγενειο
Δρούγκας Δημήτριος	Πυρηνικός Ιατρός, Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος PET/CT Βιοϊατρικής Θεσσαλονίκης
Ελευσινιώτης Ιωάννης	Καθηγητής Παθολογίας & Ηπατολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Εμμανουηλίδης Χρήστος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Πρώην Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου UCLA, Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Καπετανάκης Γεώργιος	Πρόεδρος ΔΣ, Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου-ΕΛΛΟΚ
Καποδίστριας Νικόλαος	PhD, Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Ογκολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «Αγία Ειρήνη»
Καρακόλιας Στέφανος	Διδάκτωρ Οικονομικών της Υγείας
Καραμητρούσης Ευάγγελος	MD, PhD, MSc, BSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Β', Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Καραμπεάζης Αθανάσιος	MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής 401 ΓΣΝΑ & Εξωτ. Συνεργάτης Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center
Καραχάλιος Δημήτριος	MD, MSc, Επιμελητής Ογκολογικής Κλινικής, 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Καρδαμάκης Δημήτριος	Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Γηριατρικής Ογκολογίας
Κατσικά Λασκαρίνα	Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Κλιματσίδας Μιχαήλ	Θωρακοχειρουργός
Κουκουράκης Μιχαήλ	Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Κουκουτζέλη Χρυσάνθη	Παθολόγος-Ογκολόγος
Κυριακίδης Φίλιππος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Λάλλα Ευθαλεία	Παθολόγος-Ογκολόγος, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

Letrafem®

Δισκία λετροζόλης **2.5 mg**

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα
πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ARITI A.E. ΑΘΗΝΑ: Λεωφ. Τατοΐου 52,
13677 Αχαρνές
Τηλ.: 210 8002650 - Fax: 210 6207503
www.ariti.gr - info@ariti.gr

ariti®

στηλα
στον άνθρωπο



ΤΙΤΛΟΙ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Λαμπάκη Σοφία	MD, PhD, Reader Πνευμονολογίας Καρκίνου του Πνεύμονα ΑΠΘ, Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ, Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας Χημειοθεραπειών, Γ.Ν. Γ. Παπανικολάου
Λάμπουρα Θεοδώρα	Ειδικευόμενη Χειρουργικής Γ.Ν. Καβάλας
Λέββα Σοφία	Παθολόγος-Ογκολόγος, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Λόγα Κωνσταντία	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β Πανεπιστημιακή Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας ΑΠΘ ΓΝΘ Παπαγεωργίου
Μακραντωνάκης Ανδρέας - Ευάγγελος	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Πτυχιούχος Ιατρικού Βελονισμού, Ε' Ογκολογική Κλινική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Διδάκτωρ Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μακραντωνάκης Πάρις	MD, MSc, PhD Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε' Ογκολογικής-Παθολογικής Κλινικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Μαλλιαρού Νικολέτα	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Γ.Ν. Καβάλας
Μισαηλίδου Δέσποινα	Ακτινοθεραπεύτρια - Ογκολόγος, Διπλωματούχος AMERICAN BOARD OF RADIOLOGY, Διευθύντρια Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος, Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη
Μιχαλόπουλος Αντώνιος	Καθηγητής Χειρουργική ΑΠΘ
Μουτσούδης Ανδρέας	Πλαστικός χειρουργός, MD, MSc, Επιστημονικός Συνεργάτης Α' Δερματολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη
Μπαγκατζούνης Αθανάσιος	Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος
Μπάκα Σοφία	Παθολόγος Ογκολόγος, Αν. Καθηγήτρια Μοριακής Ιατρικής Α.Π.Θ., Διευθύντρια Κλινικής Μοριακής Ιατρικής, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Μπακάλης Νικόλαος	Ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργικής, Νοσοκομείο Καβάλας
Μπαρμπούνης Βασίλειος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Ε' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Ιασώ»
Μπόκας Αλέξανδρος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Μπόνιου Κωνσταντίνα	Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Ακτινοθεραπευτικό Ογκολογικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Μποτσόλης Κωνσταντίνος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Ογκολογική Κλινική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκη
Μπούτης Αναστάσιος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Γ' Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Νεανίδης Κωνσταντίνος	MD, MSc, Παθολόγος - Ογκολόγος & Κλινικός Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Fentanyl/Sandoz

Fentanyl citrate



Το μέγεθος των δισκίων που απεικονίζονται δεν είναι πραγματικό.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ειδική ιατρική συνταγή του Ν 3459/06 περί ναρκωτικών (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ).

FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 100MCG/TAB BTx30x1 Λ.Τ.: 88,01 €, FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 200MCG/TAB BTx30x1 Λ.Τ.: 92,73 €, FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 300MCG/TAB BTx30x1 Λ.Τ.: 103,20 €, FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 400MCG/TAB BTx30x1 Λ.Τ.: 103,20 €



Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

Η έντυπη μορφή της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του

Προϊόντος είναι επίσης διαθέσιμη από την εταιρεία Lavipharm Hellas A.E.,

τηλ.: 210 6691 000, e-mail: SafetyGreece@lavipharm.com

FENT/SAND/poster/LAV/02.2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοηφέρετε
ΟΑΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΩΤΩΘΗΣΗΣ

Lavipharm Hellas A.E.

Οδός Αγίας Μαρίνας, 190 02 Παιανία Αττικής

Τηλ.: 210 6691 000

www.lavipharm.com

SANDOZ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Sandoz Pharmaceuticals d.d., Veronškova

ulica 57, SI-1000 Ljubljana, Σλοβενία.

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Φραγκοκκλησιάς 7B, 151 25 Μαρούσι

Τηλ: +30 216 600 5000



Lavipharm

ΤΙΤΛΟΙ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Νικολάου Μιχαήλ	MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α΄, Α΄ Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Νταϊλιάνης Στέφανος	MD, MSc, Ειδικευόμενος Παθολογίας Ογκολογίας, Πανεπιστημιακή Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπαγεωργίου»
Παντελάκος Παναγιώτης	MD, PhD, Διευθυντής Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής και Ακτινοθεραπείας, Όμιλος Ιατρόπολης
Παπακοτούλας Παύλος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Α΄ Χημειοθεραπευτικό - Ογκολογικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Παπανδρέου Χρήστος	Ομ. Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας, Α.Π.Θ.
Περδικούρη Ελένη Ισιδώρα	MD, MSc, PhD, Επιμελήτρια Α΄, Παθολόγος-Ογκολόγος, Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
Πολυχρονίδου Γενοβέφα	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Ραδουνισλής Αναστάσιος	Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Γ΄ Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Σαρόγλου Μαρία	Πνευμονολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Σόγκα Ελένη	Παθολόγος Ογκολόγος, Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Σπυράτος Διονύσιος	Επίκουρος Καθηγητής Πνευμονολογίας Α.Π.Θ., Πνευμονολογική Κλινική Α.Π.Θ. Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Ταγαράκης Γεώργιος	Καθηγητής Καρδιοθωρακοχειρουργικής Α.Π.Θ.
Τζήμου Μαρία	MD, MSc, PhD(c) ΕΚΠΑ,Ειδικός Παθολόγος Ογκολόγος, Β΄ Ογκολογική Κλινική Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο»
Τήκας Ιωάννης	Oncology Clinical Fellow, Charing Cross Hospital, Imperial College Healthcare NHS Trust
Τιμοθεάδου Ελένη	Αν. Καθηγήτρια, Διευθύντρια, Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Τιτοπούλου Αλεξάνδρα	Υποδιοικήτρια στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης
Τριανταφυλλίδης Ιωάννης	Διευθυντής Χειρουργικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας
Τριχάς Μιλτιάδης	Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Νοσοκομείο «Ιασώ»
Τσαγκαρόπουλος Σωκράτης	Επιμελητής Α΄, Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική, ΑΧΕΠΑ
Τσιακιτζής Καρυοφύλλης	Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός, Διευθυντής ΕΣΥ, Δ/ντής Φαρμακείου «Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου»



onivyde[®]
pegylated liposomal irinotecan

Σχεδιάστηκε για να κάνει τη διαφορά ως 1^η γραμμής θεραπεία στον μεταστατικό παγκρεατικό καρκίνο

mOS **11.1** μήνες

mPFS **7.4** μήνες

ORR **41.8** %



1. Onivyde[®] Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος.
2. Wainberg ZA et al. Lancet. 2023;S0140-6736(23)01366-1.

Για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευθείτε τη συνοπτική Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που συμπεριλαμβάνεται στο παρόν πρόγραμμα.

Τρόπος Διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή.
Μόνο για Νοσοκομειακή Χρήση.

Onivyde sol.in 4.3mg/ml VL 10ml: Λ.Τ. €903.07 | Ν.Τ. €722.65
(Σε περίπτωση τροποποίησης του Δ.Τ. ισχύουν οι νεότερες τιμές)

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα Φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

SERVIER 
moved by you

SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
Φραγκοκλησιάς 7, 15125 Μαρούσι
Τηλ. 210 9391000
www.servier.gr



Ογκολογικά Επίκαιρα

Ξενοδοχείο MONASTY
Θεσσαλονίκη

ΤΙΤΛΟΙ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΩΝ



Τσιούδα ΘεοδώραPost Doc. Dipl., MD, MSc, PhD, Πνευμονολόγος, Δ/ντρια,
Πνευμονολογικό - Ογκολογικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»**Τσουλφάς Γεώργιος**MD, PhD, FACS, Καθηγητής Χειρουργικής Μεταμοσχεύσεων, ΑΠΘ
Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων, ΑΠΘ Κέντρο
Έρευνας και Καινοτομίας στη Μεταμόσχευση Συμπαγών Οργάνων,
ΑΠΘ**Φλώρος Θεοφάνης**MD, Παθολόγος Ογκολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός, Διευθυντής 5ης
Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Metropolitan General», Αθ.
Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, τ.
ResFac, University of Pittsburgh Cancer Institute (UPCI), University of
Pittsburgh School of Medicine (UPSOM)**Φορούλης Χριστόφορος**

Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Α.Π.Θ.

Φυντανίδου ΒαρβάραMD, PhD, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ.,
Διευθύντρια Κλινικής Επείγουσας Ιατρικής Α.Π.Θ.**Χέλης Λεωνίδας**Consultant Medical Oncologist, Oncology Excellence Center, Adult
Oncology Department, King Fahad Specialist Hospital Dammam, K.S.A

ALYMSYS[®]

Bevacizumab



ALYMS 03.02/2022

WinMedica
Serving Health for Life

Για περισσότερες πληροφορίες:
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής
Οδού 33-35, 15238 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827
info@winmedica.gr
www.winmedica.gr

Για ενδοφλέβια χρήση μετά από αραίωση

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Νοσοκομειακές Τιμές:

ALYMSYS C/S SOLIN 25MG/ML VIAL X 16 ML 728,89 €
ALYMSYS C/S SOLIN 25MG/ML VIAL X 4 ML 186,89 €

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Κάτοχος Άδειας
Κυκλοφορίας

mAbxience
From lab to life

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Γενικές Πληροφορίες

Διοργάνωση

Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας

Ημερομηνία διεξαγωγής

13-14 Ιουνίου 2025

Χώρος Διεξαγωγής

Ξενοδοχείο MONASTY
26ης Οκτωβρίου 48,
Θεσσαλονίκη 546 27
τηλ. 231 001 7000

Η διημερίδα θα προβάλλεται ταυτόχρονα διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας **www.livemed.gr**

Οδηγίες Διαδικτυακής Παρακολούθησης

Εάν είστε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο **www.livemed.gr** (πατήστε στο πεδίο **Register / Εγγραφή**). Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο **Livemed** χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε από το μενού την κατηγορία **Live**, το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο **Go Live** ή **Go Virtual**.



Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την «**Αίθουσα Συνεδριάσεων**».



Εάν σας ενδιαφέρει να παραλάβετε πιστοποιητικό, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο συνέδριο μέσω της εικονικής «Γραμματείας», πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο «Εγγραφή» ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος παρακολούθησης.



Παραλαβή πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα είναι διαθέσιμο μετά το πέρας των εργασιών της Διημερίδας σε όσους σύνεδρους έχουν κάνει εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης της Διημερίδας. Πιστοποιητικό δε μπορεί να δοθεί για την ondemand παρακολούθηση.

Η εκδήλωση καλύπτεται φωτογραφικά, βιντεοσκοπείται και προβάλλεται σε ζωντανή μετάδοση.



Ογκολογικά Επίκαιρα

Ξενοδοχείο MONASTY
Θεσσαλονίκη

Γραμματεία



Events & Travel Solutions

Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210 98 80 032 • Website: www.events.gr
E-mail: ets@events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η Ε.Τ.Σ. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr.

Διημερίδα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:



Ελληνική Εταιρεία
Γηριατρικής Ογκολογίας

13-14

ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

Ογκολογικά Επίκαιρα

Ξενοδοχείο MONASTY
Θεσσαλονίκη

Χορηγοί

AMGEN

anaBIOsis

ariti®
next to human

astellas

AstraZeneca

BIANEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
STANDARDS FOR GREEK PHARMACOLOGY

biokon
MEDICAL & BIOTECH
PRODUCTS LTD

Bristol Myers Squibb®

DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ELPEN

FARAN
ONCOLOGY

Galenica

gene pharm

GENESIS
pharma

GILEAD
Oncology

GSK

ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

innovis
Future health today

INTEGRIS
PHARMA

IPSEN

Lavipharm

LEO

Lilly
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

MEDITECK
SYSTEMS

MERCK

ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΚΑΤΑΜΕΤΕΩΡΙΑΣ Α.Ε.

MSD

NUTRICIA
LIFE-TRANSFORMING NUTRITION

Pfizer
Oncology

Pierre Fabre
FARMAKA S.A.

Roche

SANDOZ

SERVIER
moved by you

Takeda

teva


WinMedica

XGEVA[®]

(denosumab)

Υπάρχει μία ιστορία γραμμένη στα οστά τους

Προστατέψτε τα με XGEVA[®]



Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή.

Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Λιανική τιμή: XGEVA INJ.SOL 120MG/1,7ML (70MG/ML) BTx1VIAL: 277,08 €

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΑΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"**

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενέργειών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) Τηλ: +30 2132040337, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας διαθεσίμης και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, www.eof.gr, www.kitrikarta.gr για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή ενδελεχτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ: +30 2103447000



Πριν τη
συνταγογράφηση
συμβουλευθείτε
την Περίληψη
Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος.

AMGEN

Αγ. Κωνσταντίνου 59-61
Green Plaza, κτίριο Γ, 15 124 Μαρούσι
Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050
Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr

ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML ΠΥΚΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ*

Ένα φιαλίδιο των 10 ml πυκνού διαλύματος περιέχει 43 mg άνδρους ιρινοτεκάνης ελεύθερης βάσης (ως άλας οκταθεϊκής σακχαρόζης ιρινοτεκάνης σε πεγκυλωμένο λιποσωματικό σκεύασμα).

Έκδοχο με γνωστή δράση

Ένα ml πυκνού διαλύματος περιέχει 0,144 mmol (3,31 mg) νατρίου.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ*

Το ONIVYDE pegylated liposomal ενδείκνυται:

- σε συνδυασμό με οξαλιπлатίνη, 5φθοροουρακίλη (5FU) και λευκοβορίνη (LV) για την θεραπεία πρώτης γραμμής σε ενήλικες ασθενείς με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα παγκρέατος,
- σε συνδυασμό με 5FU και LV για την θεραπεία μεταστατικού αδενοκαρκινώματος του παγκρέατος σε ενήλικες ασθενείς που έχουν παρουσιάσει εξέλιξη μετά από θεραπεία με βάση τη γεματιρίνη.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ*

Το ONIVYDE pegylated liposomal πρέπει να συνταγογραφείται και να χορηγείται σε ασθενείς μόνο από επαγγελματίες υγείας με εμπειρία στη χρήση αντικαρκινικών θεραπειών.

Το ONIVYDE pegylated liposomal δεν είναι ισοδύναμο με τα μη λιποσωματικά σκεύασματα ιρινοτεκάνης και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εναλλάξ.

Δεν θα πρέπει να χορηγείται ως μεμονωμένος παράγοντας και θα πρέπει να συνεχίζεται μέχρι την εξέλιξη της νόσου ή μέχρι να μην είναι πλέον ανεκτό από τον ασθενή.

Δοσολογία

Η συνιστώμενη δόση του ONIVYDE pegylated liposomal σε συνδυασμό με οξαλιπлатίνη, 5FU και LV είναι 50 mg/m² ενδοφλεβίως σε διάστημα 90 λεπτών, ακολουθούμενα από οξαλιπлатίνη 60 mg/m² ενδοφλεβίως σε διάστημα 120 λεπτών, ακολουθούμενα από LV 400 mg/m² ενδοφλεβίως σε διάστημα 30 λεπτών, ακολουθούμενα από 5FU 2.400 mg/m² ενδοφλεβίως σε διάστημα 46 ωρών. Αυτό το σχήμα θα πρέπει να χορηγείται κάθε 2 εβδομάδες. Η συνιστώμενη δόση έναρξης του ONIVYDE pegylated liposomal σε ασθενείς που είναι γνωστό ότι είναι ομόζυγοι για το αλληλόμορφο UGT1A1*28 δεν αλλάζει. Η συνιστώμενη δόση του ONIVYDE pegylated liposomal σε συνδυασμό με 5FU και LV είναι 70 mg/m² ενδοφλεβίως σε διάστημα 90 λεπτών, ακολουθούμενα από LV 400 mg/m² ενδοφλεβίως σε διάστημα 30 λεπτών, ακολουθούμενα από 5FU 2.400 mg/m² ενδοφλεβίως σε διάστημα 46 ωρών, χορηγούμενα κάθε 2 εβδομάδες.

Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρήσης μειωμένων δόσεων έναρξης ONIVYDE pegylated liposomal ίσης με 50 mg/m² για ασθενείς που είναι γνωστό ότι είναι ομόζυγοι για το αλληλόμορφο UGT1A1*28. Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης της δόσης του ONIVYDE pegylated liposomal σε 70 mg/m², εάν είναι ανεκτό σε συνεχόμενους κύκλους.

Προσαρμογές της δόσης συνιστώνται για την αντιμετώπιση τοξικοτήτων που σχετίζονται με το ONIVYDE pegylated liposomal.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ*

Ιστορικό υπερευαίσθησίας βαριάς μορφής στην ιρινοτεκάνη ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

Θλασμός.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ*

Το ONIVYDE pegylated liposomal είναι ένα λιποσωματικό σκεύασμα ιρινοτεκάνης με διαφορετικές φαρμακοκινητικές ιδιότητες συγκριτικά με τη μη λιποσωματική ιρινοτεκάνη. Η συγκέντρωση και η περικτιοτικότητα της δόσης είναι διαφορετικές συγκριτικά με τις μη λιποσωματικές ιρινοτεκάνες.

Μυελοκαταστολή/ουδετεροπενία

Συνιστάται παρακολούθηση με γενικές εξετάσεις αίματος κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ONIVYDE pegylated liposomal. Οι ασθενείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει κίνδυνος ουδετεροπενίας, καθώς και η σημασία του πυρετού. Η εμπύρετη ουδετεροπενία (θερμοκρασία σώματος > 38 °C και αριθμός ουδετεροφίλων ≤ 1.000 κύτταρα/μm³) θα πρέπει να αντιμετωπίζεται επειγόντως στο νοσοκομείο, με ενδοφλέβια αντιβιοτικά ευρέος φάσματος. Σηψαιμία με ουδετεροπενικό πυρετό και επακόλουθη σηπτική καταπληξία με μοιραία έκβαση έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος που έλαβαν θεραπεία με ONIVYDE pegylated liposomal.

Σε ασθενείς που αντιμετωπίσαν αιματολογικά συμβάντα βαριάς μορφής, συνιστάται η μείωση της δόσης ή η διακοπή της θεραπείας. Ασθενείς με ανεπαρκή μυελού των οστών βαριάς μορφής δεν θα πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία με ONIVYDE pegylated liposomal. Το ιστορικό προηγούμενης ακτινοβολίας της κοιλίας αυξάνει τον κίνδυνο ουδετεροπενίας βαριάς μορφής και εμπύρετης ουδετεροπενίας μετά τη θεραπεία με ONIVYDE pegylated liposomal. Συνιστάται στενή παρακολούθηση με εξετάσεις αίματος, ενώ θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρήσης αυξητικών παραγόντων μυελοκυττάρων για ασθενείς με ιστορικό ακτινοβολίας της κοιλίας. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί σε ασθενείς στους οποίους χορηγείται ONIVYDE pegylated liposomal ταυτόχρονα με ακτινοβολία.

Οι ασθενείς με ανεπαρκή γλυκορρονιδίωση της χολερυθρίνης, όπως αυτοί με σύνδρομο Gilbert, μπορεί να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο μυελοκαταστολής κατά τη λήψη θεραπείας με ONIVYDE pegylated liposomal.

Ανοσοκατασταλτικές επιδράσεις και εμφόδια

Η χορήγηση εμφολίων με ζώντες ή ζώντες εξασθενημένους μικροοργανισμούς σε ασθενείς με ανοσοκαταστολή λόγω χημειοθεραπευτικών φαρμακευτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του ONIVYDE pegylated liposomal, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ή θανατηφόρες λοιμώξεις. Συνεπώς, ο εμφολισμός με εμφόλια με ζώντες μικροοργανισμούς θα πρέπει να αποφευχθεί. Επιτρέπεται η χορήγηση εμφολίων με θανατημένους ή αδρανιστικούς μικροοργανισμούς. Ωστόσο, η ανταπόκριση σε αυτά τα εμφόλια μπορεί να είναι μειωμένη.

Αλληλεπιδράσεις με ισχυρούς επαγωγείς του CYP3A4

Το ONIVYDE pegylated liposomal δεν θα πρέπει να συγχρηγείται με ισχυρούς επαγωγείς

του ενζύμου CYP3A4 , εκτός εάν δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές επιλογές θεραπείας. Η κατάλληλη δόση έναρξης για ασθενείς που λαμβάνουν αυτά τα αντιπαρασωματικά ή άλλους ισχυρούς επαγωγείς δεν έχει καθοριστεί. Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο υποκατάστασής τους με θεραπείες που δεν προκαλούν ενζυμική επαγωγή τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν από την έναρξη της θεραπείας με ONIVYDE pegylated liposomal.

Αλληλεπιδράσεις με ισχυρούς αναστολείς του CYP3A4 ή ισχυρούς αναστολείς του UGT1A1

Το ONIVYDE pegylated liposomal δεν θα πρέπει να συγχρηγείται με ισχυρούς αναστολείς του ενζύμου CYP3A4 . Οι ισχυροί αναστολείς του CYP3A4 θα πρέπει να διακόπτονται τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν από την έναρξη της θεραπείας με ONIVYDE pegylated liposomal.

Το ONIVYDE pegylated liposomal δεν θα πρέπει να συγχρηγείται με ισχυρούς αναστολείς του UGT1A1, εκτός εάν δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές επιλογές θεραπείας.

Διάρροια

Το ONIVYDE pegylated liposomal μπορεί να προκαλέσει σοβαρή και επικίνδυνη για τη ζωή διάρροια. Το ONIVYDE pegylated liposomal δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με απώραξη του εντέρου και χρόνια φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Διάρροια μπορεί να παρουσιαστεί πρώιμα (εμφάνιση σε < 24 ώρες μετά την έναρξη χορήγησης του ONIVYDE pegylated liposomal) ή οψίμα (> 24 ώρες).

Σε ασθενείς που παρουσιάζουν πρώιμη διάρροια ή χολινεργικά συμπτώματα, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης προφυλακτικής και θεραπευτικής αγωγής με ατροπίνη, εκτός εάν αντενδείκνυται. Οι ασθενείς θα πρέπει να γνωρίζουν τον κίνδυνο καθυστερημένης διάρροιας, που μπορεί να είναι εξουθενωτική και, σε σπάνιες περιπτώσεις, απειλητική για τη ζωή, καθώς οι επίμονες χαλαρές ή υδαρείς κενώσεις μπορεί να προκαλέσουν αφυδάτωση, διαταραχές των ηλεκτρολυτών, κοιλίδια, εξέλκωση του γαστρεντερικού (ΓΕ) σωλήνα, λοιμώξη ή σηψαιμία.

Μόλις παρουσιαστεί η πρώτη υγρή κένωση, ο ασθενής θα πρέπει να ξεκινήσει να πίνει μεγάλες ποσότητες ποτών που περιέχουν ηλεκτρολύτες. Οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν άμεση διαβίωση λοπεραμίδη (ή ισοδύναμο) για την έναρξη της θεραπείας για διάρροια. Θα πρέπει να ξεκινήσει η χρήση λοπεραμίδης κατά την πρώτη εμφάνιση όχι καλά σχηματισμένων ή χαλαρών κοπράνων ή κατά την πιο πρώιμη εμφάνιση κενώσεων με συχνότητα υψηλότερη από την κανονική. Θα πρέπει να χορηγείται λοπεραμίδη μέχρι ο ασθενής να παραμείνει χωρίς διάρροια για τουλάχιστον 12 ώρες. Για να αποφύγετε τη σοβαρή διάρροια, σταματήστε όλα τα προϊόντα που περιέχουν λακτόζη, διατηρήστε την ενυδάτωση και ακολουθήστε μια διατροφική χαμηλή σε λιπαρά.

Εάν η διάρροια εμμένει ενόσω ο ασθενής λαμβάνει λοπεραμίδη για περισσότερες από 24 ώρες, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο προσθήκης αντιβιοτικής υποστήριξης από τον στόματο (π.χ. φθοροκινολόνη για 7 ημέρες). Η λοπεραμίδη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για πάνω από 48 διαδοχικές ώρες λόγω του κινδύνου παραλυτικού ελλείους. Εάν η διάρροια εμμένει για περισσότερες από 48 ώρες, διακόψτε τη χορήγηση λοπεραμίδης, παρακολουθήστε και αναπληρώστε τους υγρούς ηλεκτρολύτες και συνεχίστε την υποστήριξη με αντιβιοτικά μέχρι να υποχωρήσουν τα συνδρά συμπτώματα. Δεν θα πρέπει να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος θεραπείας μέχρι η διάρροια να υποχωρήσει σε βαθμό ≤ 1 (23 κενώσεις/ημέρα περισσότερες από τη συχνότητα κενώσεων πριν από τη θεραπεία).

Μετά από διάστημα βαθμού 3 ή 4, η επόμενη δόση του ONIVYDE pegylated liposomal θα πρέπει να μειωθεί.

Χολινεργικές αντιδράσεις

Η πρώιμη εμφάνιση διάρροιας μπορεί να συνοδεύεται από χολινεργικά συμπτώματα όπως ρινίτιδα, αυξημένη έκκριση σπένου, έλαψη, διαφόρηση, βραδυκαρδία, μύση και υπερπεριστάλτιο. Σε περίπτωση εμφάνισης χολινεργικών συμπτωμάτων, θα πρέπει να χορηγηθεί ατροπίνη.

Αντιδράση υπερευαίσθησίας συμπεριλαμβανομένων οξείων αντιδράσεων στην έγχυση

Αναφέρθηκαν αντιδράσεις στην έγχυση, που περιλάμβαναν κυρίως εξάνθημα, κνίδωση, περιφερικό οίδημα ή κνήμες, σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με ONIVYDE pegylated liposomal. Παρουσιάστηκαν νέα συμβάντα (όλα βαθμού 1 ή βαθμού 2), γενικά πρώιμα, κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ONIVYDE pegylated liposomal, και μόνο 2 από τους 10 ασθενείς παρουσίασαν συμβάντα μετά την πέμπτη δόση. Ενδέχεται να παρουσιαστούν αντιδράσεις υπερευαίσθησίας, συμπεριλαμβανομένης της οξείας αντίδρασης στην έγχυση. Το ONIVYDE pegylated liposomal θα πρέπει να διακόπτεται σε περίπτωση αντιδράσεων υπερευαίσθησίας βαριάς μορφής.

Προηγούμενη επέμβαση Whipple

Οι ασθενείς με ιστορικό επέμβασης Whipple παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών λοιμώξεων μετά τη λήψη ONIVYDE pegylated liposomal σε συνδυασμό με 5FU και λευκοβορίνη. Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για σημεία λοιμώξεων.

Αγγειακές διαταραχές

Το ONIVYDE pegylated liposomal έχει συσχετιστεί με θρομβοεμβολικά επεισόδια όπως πνευμονική εμβολή, φλεβική θρόμβωση και αρτηριακή θρομβοεμβολή. Πρέπει να λαμβάνεται λεπτομερής ιατρικό ιστορικό προκειμένου να εντοπίζονται οι ασθενείς με πολλούς παράγοντες κινδύνου εκτός από το υποκείμενο νεόπλασμα. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τα σημεία και τα συμπτώματα της θρομβοεμβολής και να έχουν ενημερωθεί με επικοινωνιόνο αμέσως με τον γιατρό ή τον νοσηλεύτη τους σε περίπτωση εμφάνισης τέτοιων σημείων ή συμπτωμάτων.

Πνευμονική τοξικότητα

Παρουσιάστηκαν συμβάντα τύπου διάμεσης πνευμονοπάθειας (ILD) που οδήγησαν σε θάνατο, σε ασθενείς που λάμβαναν μη λιποσωματική ιρινοτεκάνη. Δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις συμβάντων τύπου ILD κατά τη θεραπεία με ONIVYDE pegylated liposomal σε κλινικές μελέτες. Στους παράγοντες κινδύνου συγκαταλέγονται η προϋπάρχουσα πνευμονοπάθεια, η χρήση πνευμονοτοξικών φαρμακευτικών προϊόντων, παραγόντων διέγερσης αποκρίνης ή η λήψη προηγούμενης ακτινοθεραπείας. Οι ασθενείς με παράγοντες κινδύνου θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά για αναπνευστικά συμπτώματα πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ONIVYDE pegylated liposomal. Σε μικρό ποσοστό ασθενών που εγγράφηκαν σε μια κλινική μελέτη με την ιρινοτεκάνη, παρατηρήθηκε ένα δικτυοσώδες μοτίβο στην ακτινογραφία θώρακα. Σε περίπτωση νέας ή προοδευτικής εξελισσόμενης δύσπνοιας, βήχα και πυρετού θα πρέπει να διακοπεί η θεραπεία με ONIVYDE pegylated liposomal, για όσο διάστημα εκκρεμεί η διαγνωστική εκτίμηση. Το ONIVYDE pegylated liposomal θα πρέπει να διακόπτεται σε ασθενείς με επιβεβαιωμένη διάγνωση ILD.

Ηπατική δυσλειτουργία

Οι ασθενείς με υπερχοληρυθριναιμία είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις ολικής

SN38 και, συνεπώς, ο κίνδυνος ουδετεροπενίας είναι αυξημένος. Θα πρέπει να πραγματοποιείται τακτική παρακολούθηση με γενικές εξετάσεις αίματος σε ασθενείς με ολική χοληρυθρίνη 10,2,0 mg/dl. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία (χοληρυθρίνη > 2 φορές το ανώτατο φυσιολογικό όριο [ULN] τρανοσαμίνδης > 5 φορές το ULN). Απαιτείται προσοχή όταν το ONIVYDE pegylated liposomal χορηγείται σε συνδυασμό με άλλα ηπατοτοξικά φαρμακευτικά προϊόντα, ειδικά σε ασθενείς με προϋπάρχουσα ηπατική δυσλειτουργία.

Ελλιποβαρείς ασθενείς (βείκτης μάζας σώματος < 18,5 kg/m²)

Στην NΑΡΟLΙ-1, 5 από τους 8 ελλιποβαρείς ασθενείς παρουσίασαν μια ανεπιθύμητη ενέργεια βαθμού 3 ή 4, κυρίως μυελοκαταστολή, ενώ για 7 από τους 8 ασθενείς απαιτήθηκε τροποποίηση της δόσης, όπως καθυστέρηση, μείωση ή διακοπή της δόσης. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση του ONIVYDE pegylated liposomal σε ασθενείς με δείκτη μάζας σώματος <18,5 kg/m².

Εξδοχα

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει 33,1 mg νάτριο ανά φιαλίδιο, που ισοδυναμεί με το 1,65% της συνιστώμενης από τον ΠΟΥ μέγιστης ημερήσιας πρόσληψης 2g νατρίου για έναν ενήλικα.

ΑΛΛΗΛΕΠΑΡΑΣΕΙΣ*

Η συγχρόνηση του ONIVYDE pegylated liposomal με επαγωγείς του CYP3A4 (αντισπασμωδικά φάρμακα, ριφαμπικίνη, ρισαμπουτρίνη, βαλοσαμολόγο-St John's wort) μπορεί να μειώσει τη συστηματική έκθεση στο ONIVYDE pegylated liposomal.

Η συγχρόνηση του ONIVYDE pegylated liposomal με άλλους αναστολείς του CYP3A4 (π.χ. χυμό γκρέιφρουτ, κλαριθρομυκίνη, ινιδινάβηρι, ιτρακοναζόλη, λοπιναβίρη, νεφαζοδόνη, νεφαναβίρη, ριτοναβίρη, σακουναβίρη, τελαπρεβίρη, βορικοναζόλη) και του UGT1A1 (π.χ. αταξαναβίρη, γεμφιβροζόλη, ινιδινάβηρι, ρεγοραφενίμη) μπορεί να αυξήσει τη συστηματική έκθεση στο ONIVYDE pegylated liposomal. Η συγχρόνηση με αντνεοπλασματικούς παράγοντες (συμπεριλαμβανομένης της φλουκυτοσίνης) μπορεί να επιδεινώσει τις ανεπιθύμητες ενέργειες του ONIVYDE pegylated liposomal.

ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ*

Πριν ξεκινήσει η χορήγηση ONIVYDE pegylated liposomal, εξετάστε το ενδοχόμενο να συμπεριλεύεστε τους ασθενείς σχετικά με τη διατήρηση των γαμετών.

ΚΥΗΣΗ*

Δε συνιστάται.

ΓΑΛΟΥΧΙΑ*

Αντενδύκενται.

ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ*

Οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντισύλληψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ONIVYDE pegylated liposomal και για 7 μήνες από εκεί και έπειτα. Οι άνδρες θα πρέπει να χρησιμοποιούν προφυλακτικά κατά τη διάρκεια της ONIVYDE pegylated liposomal και για 4 μήνες από εκεί και έπειτα.

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ*

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, οι ασθενείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί κατά την οδήγηση ή τον χειρισμό μηχανημάτων.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ*

ONIVYDE pegylated liposomal σε συνδυασμό με οξαλιπλατίνη/5-FU/LV:

Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες: Αναμία, Ουδετεροπενία, Θρομβοπενία, Υποκαλιμία, Μειωμένη όρεξη, Περιφερική νευροπάθεια, Δυσγευσία, Παρασβήση, Διάρροια, Ναυτία, Έμετος, Κολικό αλγος/δυσφορία, Στοματίτιδα, Αλωπεκία, Εξασθένιση, Φλεγμονή βλεννογόνου, Σωματικό βάρος μειωμένο, Αντίδραση σχετιζόμενη με την έγχυση

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες: Σηψαιμία, Λοίμωξη ουροποιητικού συστήματος, Λοίμωξη από Candida, Ρινοφαρυγγίτιδα, Εμπύρετη ουδετεροπενία, Λευκοπενία, Λεμφοπενία, Αφιδότωση, Υπονατριαιμία, Υποφωσφαταιμία, Υπομαγνησιαμία, Υποαλβουμιναιμία, Υποπρωτεϊναιμία, Τρόμος, Νευροτοξικότητα, Δυσαισθησία, Χολινεργικό σύνδρομο, Κεφαλαλγία, Ζάλη, Όραση θάμνη, Ταχυκαρμία, Υπόταση, Θρομβοεμβολικά συμβάντα, Πνευμονική εμβολή, Λόξυγας, Δύσπνοια, Επιστάξη, Κολίτιδα, Εντεροκολίτιδα, Δυσκοιλιότητα, Ξηρό στόμα, Μετεωρισμός, Διάταση κοιλιάς, Δυσπεψία, Γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος, Αιμορροΐδες, Δυσφαγία, Υπερχοληστεριναιμία, Ξηρό δέρμα, Σύνδρομο παλμοπαλεμιαίας ερυθροδυσαισθησίας, Εξάνθημα, Υπέρχρωση του δέρματος, Μυϊκή αδυναμία, Μυαλγία, Μυϊκοί σπασμοί, Εξέλιξη νευρική βλάβη, Πυρεξία, Οίδημα, Ριγή, Αυξημένες τρανοσαμίνδεις (ALT και AST), Αυξημένη αλκαλική φωσφατάση αίματος, Αυξημένη γ-γλουταμυλτρανσφεράση, Αυξημένη κρεατινίνη αίματος

Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες: Εκκολοματίτιδα, Πνευμονία, Απόστημα τουπρωκτού, Εμπύρετη λοίμωξη, Γαστρεντερίτιδα, Λοίμωξη βλεννογόνου, Μυκητιασική λοίμωξη του στόματος, Λοίμωξη από Clostridium difficile, Επιπεφυκίτιδα, Δοθηνία, Απλός έρπητας, Λαρυγγίτιδα, Περιοδοντίτιδα, Εξάνθημα φυλκταινώδες, Παραρρινοκολίτιδα, Οδοντική λοίμωξη, Αιδοιοκολπική μυκητίαση, Περιγονικό οίδημα, Πανκυταροπενία, Αιμολυτική αναμία, Υπερευαισθησία, Διαταραχή ισορροπίας των ηλεκτρολυτών, Υπερασβεστιαιμία, Κυτταρικός θάνατος, Υπογλυκαιμία, Πόδαγρα, Υποηλυκαιμία, Υπερκαλιμία, Ανεπάρκεια σιδήρου, Υποσιτισμός, Αϋπνία, Συγκυτική κατάσταση, Κατάθλιψη, Νεύρωση, Επιληπτική κρίση, Εγκεφαλική αιμορραγία, Εγκεφαλική ισχαιμία, Ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, Ανομία, Αγευσία, Διαταραχή ισορροπίας, Υπερπνία, Υπαιοσθρία, Νοητική αναπηρία, Λήθαργος, Εξασθένιση της μνήμης, Προσγκοπή, Συγκοπή, Παροδικό ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, Ερεθισμός οφθαλμού, Μειωμένη οπτική οξύτητα, Ίλιγγος, Στήθαγχη, Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, Αιθμία παλμών, Υπέρταση, Περιφερική αίσθηση ψυχρού, Αμιάτωμα, Φλεβίτιδα, Στοματοφαρυγγικό άλγος, Βήχας, Υπεροξυγόνωση, Ρινική φλεγμονή, Ατελεκτασία, Δυσφωνία, Πνευμονίτιδα, Γαστρεντερική τοξικότητα, Απόφραξη δωδεκαδακτύλου, Ακράτεια πρωκτού, Αφθώδες έλκος Δυσαισθησία του στόματος, Άλγος στόματος, Διαταραχή της γλώσσας, Ραγάδα του πρωκτού, Γυναικική χελίτιδα, Δυσχεσία, Στοματική παραίσθησία, Οδοντική τερηδόνα, Ερύνη, Γαστρική διαταραχή, Γαστρίτιδα, Διαταραχή των ούλων, Άλγος των ούλων, Αιματοχεσία, Υπεραισθησία οδόντων, Παραλυτικός ελκος, Πρήξιμο χείλους, Εξέλκωση στόματος, Σπασμός του οισοφάγου, Περιοδοντική νόσος, Αιμορραγία ορθού, Κνησμός, Υπεριδρωσία, Δερματίτιδα πομφολυγώδης, Δερματίτιδα αποφολιδωτική γενικευμένη, Ερύθημα, Τοξικότητα ονύχων, Βλατίδα, Πετέχειες, Ψωρίαση, Ενδοσθιτο δέρμα, Αποφολιδωση δέρματος, Δερματική βλάβη, Τηλεαγγειεκτασία, Κνίδωση, Αρθραλγία, Πόνος σε ράχη, Οστικό άλγος, Άλγος σε άκρο, Πολυαρθροπάθεια, Νευρική δυσλειτουργία, Νευρική ανεπάρκεια, Δυσουρία, Πρωτεϊνουρία, Αιδοιοκολπική ήξη, Αιθμία κακουχίας, Επίδεινωση της γενικής φυσικής κατάστασης, Φλεγμονή, Σύνδρομο πολυοργανικής δυσλειτουργίας, Γριπώδης συνδρομή, Μη καρδιακό θωρακικό άλγος,

Άλγος μασχάλης, Θωρακικό άλγος, Υποθερμία, Άλγος, Διόγκωση προσώπου, Δυσανεξία στη θερμοκρασία, Ξήρωση, Αυξημένος διενθής κανονικοποιημένος λόγος, Μειωμένη ολική πρωτεΐνη, Μειωμένη νεφρική καθαρότητα κρεατινίνης, Ηλεκτροκαρδιογράφημα με παρατεταμένο QT, Αυξημένος αριθμός μονοκυττάρων, Αυξημένη τροπονίνη I

ONIVYDE pegylated liposomal σε συνδυασμό με 5-FU/LV:

Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες: Ουδετεροπενία, Λευκοπενία, Αναμία, Θρομβοπενία, Υποκαλιμία, Υπομαγνησιαμία, Αφιδότωση, Μειωμένη όρεξη, Ζάλη, Διάρροια, Έμετος, Ναυτία, Κολικό αλγος, Στοματίτιδα, Αλωπεκία, Πυρεξία, Περιφερικό οίδημα, Φλεγμονή βλεννογόνου, Κόπωση, Εξασθένιση, Μείωση βάρους.

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες: Σηπτική Καταπληξία, Σηψαιμία, Πνευμονία, Εμπύρετη Ουδετεροπενία, Γαστρεντερίτιδα, Καντιντίαση του στόματος, Λεμφοπενία, Υποηλυκαιμία, Υπονατριαιμία, Υποφωσφαταιμία, Αϋπνία, Χολινεργικό Σύνδρομο, Δυσγευσία, Υπόταση, Πνευμονική Εμβολή, Θρομβοεμβολικά Επεισόδια, Δύσπνοια, Δυσφωνία, Κολίτιδα, Αιμορροΐδες, Υποελευκταίναια, Κνησμός, Οξεία Νευρική Ανεπάρκεια, Αντίδραση που σχετίζεται με την έγχυση, Οίδημα, Αυξημένη χοληρυθρίνη, Αυξημένες τρανοσαμίνδεις (ALT και AST), Αυξημένο Διενθές Κανονικοποιημένο Πηκτικό.

Όχι Συχνές Ανεπιθύμητες Ενέργειες: Σηψαιμία των χοληφόρων, Υπερευαισθησία, Υποξία, Διάμεση πνευμονοπάθεια (συμπεριλαμβανομένης πνευμονίτιδας), Οισοφαγίτιδα, Πρωκτίτιδα, Κνίδωση, Εξάνθημα, Δυσχρωματισμός ονύχων.

Μη γνωστές: Αναφυλακτική/αναφυλακτοειδής αντίδραση, Αγγειοοίδημα, Ερύθημα.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών

Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού τους συστήματος αναφοράς:

Ελλάδα

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογίων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040337
Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>
<http://www.kitirinkarta.gr>

Κύπρος

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Υγείας
CY-1475 Λευκωσία
Τηλ: +357 22608607
Φαξ: +357 22608669
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs

ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑ*

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ*

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: αντνεοπλασματικοί παράγοντες, άλλοι αντνεοπλασματικοί παράγοντες, κυκλικοί ATC: L01XC19

Η δραστική ουσία του ONIVYDE pegylated liposomal είναι η ιρινοτεκάνη (αναστολέας της τοπαιοισμεράσης I), η οποία είναι ενκαψυλιωμένη σε κυστίδιο διπλοστιβάδας λιπιδίων ή λιπόσωμα. Η ιρινοτεκάνη είναι παράγωγο της καμποθηκίνης. Οι καμποθηκίνες δρουν ως ειδικοί αναστολείς του ενζύμου DNA τοπαιοισμεράση I. Η ιρινοτεκάνη και ο δραστικός μεταβολίτης της, το SN38, προσδένονται αναστρέψιμα στο σύμπλοκο τοπαιοισμεράση IDNA και επάγουν βλάβες σε μονοκλωνικά DNA που αποκλίνουν τη διχάλη αντιγραφής DNA και είναι υπεύθυνες για την κυτταροτοξικότητα. Η ιρινοτεκάνη μεταβολίζεται από την καρβοξυλεστεράση σε SN38. Το SN38 είναι περίπου 1.000 φορές ισχυρότερο από την ιρινοτεκάνη ως αναστολέας της τοπαιοισμεράσης I, που έχει καθαριστεί από κυτταρικές σειρές όγκων ανθρώπων και τρωκτικών.

ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΤΙΧΟΥ

Φιαλίδιο από γυαλί τύπου Ι με γκρι πώμα εισχώρησης χλωροβουτυλίου και σφράγιση αλουμινίου με αποσπώσιμο πώμα, που περιέχει 10 ml πυκνού διαλύματος. Κάθε συσκευασία περιέχει ένα φιαλίδιο.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Les Laboratoires Servier
50, rue Carnot
92284 Suresnes cedex
Γαλλία

ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΣΥΣΤΕΥΑΣΜΕΝΟ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ONIVYDE SOLIN 4.3MG/ML 1 VIAL x10 ML (EU/16/1300/01): Ν.Τ. Ε 722,65, Α.Τ. Ε 903,07
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
09/2024



*Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευτείτε την πλήρη Περίληψη Χαρακτηριστικών του προϊόντος που διατίθεται από τον Κάτοχο της Άδειας Κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως ή που μπορείτε να βρείτε σκανάροντας τον κωδικό QR.



SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

Φραγκοκλησιάς 7, 15125 Μαρούσι
Τηλ. 210 9391000
www.servier.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Ανακράτετε:

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα Φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Σημειώσεις

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There is no handwriting or other markings on the paper.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:



Ελληνική Εταιρεία
Γηριατρικής Ογκολογίας

Διημερίδα
**Ογκολογικά
Επίκαιρα**

13-14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

Ξενοδοχείο MONASTY Θεσσαλονίκη