

Οργάνωση:

Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας

Σε συνεργασία με:

- Μονάδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Π.Ν. Πατρών «Παναγία η Βοήθεια»
- Ογκολογικό Τμήμα Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο - Πανάειο»
- Ογκολογική Κλινική Γ.Ν. Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»
- Εταιρεία Στήριξης Αντικαρκινικής Έρευνας (Ε.Σ.Α.Ε.)

Υπό την αιγίδα:

- Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.)
- Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Α.Ο)
- Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας (Ε.Σ.Ν.Ε.)

10-11 Οκτωβρίου | 2025

Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

XANIA

11^η Χρονιά

Επιστημονική Διημερίδα

**Διεπιστημονική
εκπαίδευση
για τη θεραπεία των
νεοπλασματικών
νοσημάτων**

Χορηγούνται
13,5 Μόρια
Συνεχιζόμενης
Ιατρικής
Εκπαίδευσης
(CME - CPD)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

DON'T MAKE THEM WAIT.

Start strong with CABOMETYX® + Nivolumab.



60% of aRCC patients don't reach 2L*2-4



67,6m FU results continue to support Cabometyx® - Nivolumab as a Standard of Care for previously untreated aRCC patients¹

Keep time on their side⁵

*Across three real-world studies, only 35-45% of patients received 2L²⁻⁴ References: 1. Motzer R, et al. Abstract 439. Presented at ASCO GU 2025. 2. Shah N, et al. Eur Urol. 2023;49:110-118. 3. Malik A, et al. Poster 19. Presented at IKCS 2023. 4. Lai G-S, et al. PLoS One. 2023;18(11):e0294039. 5. Bournal MT, et al. Abstract 362, Presented at ASCO GU 2024.

IPSEN MON. ΕΠΕ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 9843324
E-mail: ipsenepe@ipsen.com
www.ipsen.com/greece

Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930

ΔΤΦ: 04/01/2025

CABOMETYX F.C.TAB 20MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€
CABOMETYX F.C.TAB 40MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€
CABOMETYX F.C.TAB 60MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€



Περίληψη Χαρακτηριστικών
Προϊόντος CABOMETYX®
Ημ. αναθεώρησης κειμένου,
20 Αυγούστου 2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπεληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

**CABOMETYX®**
(cabozantinib) tablets

10 CABO-A/MAR 2025

 **IPSEN**

Επιστημονική Διημερίδα

**Διεπιστημονική εκπαίδευση για
τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων**



Χαιρετισμός

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Αγαπητές και αγαπητοί Συνεργάτες,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλούμε για μια ακόμα χρονιά στην Επιστημονική Διημερίδα «Διεπιστημονική εκπαίδευση για τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων» που θα πραγματοποιηθεί στο «φυσικό» της χώρας, στα Χανιά, στο «Δημοτικό Θέατρο ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ», στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2025.

Όπως και στις προηγούμενες 10 χρονιές, έτσι και φέτος, η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή προσπάθησε να διατηρήσει τον πολυθεματικό χαρακτήρα της Διημερίδας, εστιάζοντας στις σύγχρονες εξελίξεις της Ογκολογίας που καλύπτουν τις σωματικές, ψυχικές και κοινωνικές ανάγκες του ογκολογικού ασθενή.

Πιστεύουμε ότι περισσότερο από άλλες εποχές, οι επαγγελματίες υγείας καλούνται να εφαρμόσουν όλες τις διαθέσιμες διαγνωστικές και θεραπευτικές λύσεις στον ασθενή, ακόμα και όταν το σύστημα υπηρεσιών υγείας δεν δύναται λόγω εγγενών οικονομικών και λειτουργικών αδυναμιών να ανταποκριθεί.

Σας καλούμε και φέτος να ενισχύσετε με τη φυσική σας παρουσία και ενεργή συμμετοχή τη Διημερίδα μας.

Καλή αντάμωση στα Χανιά.

Οι Πρόεδροι
της Οργανωτικής Επιτροπής
Δ. Καρδαμάκης - Ν. Ανδρουλάκης

Οι Πρόεδροι
της Επιστημονικής Επιτροπής
Η. Μπομπολάκη - Ε. Σαλούστρος

What science can do

Κλινική καινοτομία

Οι ψηφιακές τεχνολογίες δημιουργούν πρωτόγνωρες ευκαιρίες συλλογής δεδομένων από τους ασθενείς σε πραγματικό χρόνο.

Στην AstraZeneca αναπτύσσουμε τις ψηφιακές μας δυνατότητες σε όλο το φάσμα της Έρευνας και Ανάπτυξης, για να ανακαλύψουμε καλύτερους τρόπους τροφοδότησης των κλινικών μας μελετών με επικαιροποιημένη γνώση και να βοηθήσουμε τους ασθενείς στην πρόληψη, τη διαχείριση και τη θεραπεία της ασθένειάς τους.



Επιστημονική Διημερίδα

Διεπιστημονική εκπαίδευση για
τη θεραπεία των νεοπλησματικών νοσημάτων



Επιτροπές

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδροι: Ν. Ανδρουλάκης, Δ. Καρδαμάκης

Μέλη: Α. Καραμπεάζης
Λ. Βαμβακάς
Μ. Πομώνη
Γρ. Γεωργακόπουλος
Γ. Πισσάκας
Γ. Κατηνιώτης
Δ. Παπαγεωργίου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδροι: Η. Μπομπολάκη, Ε. Σαλούστρος

Μέλη: Ι. Βαρθαλίτης
Ι. Δροσίτης
Α. Καστανάκη
Ε. Κοντοπόδης
Δ. Μαυρουδής
Μ. Μπαχλιτζανάκη
Β. Μποζιονέλου
Ε. Πλαϊίτης
Ν. Σκανδαλάκη
Δ. Στολτίδης
Ι. Στουπής
Γ. Σφακιωτάκη
Ν. Συμσερίδης
Μ. Τόλια

Opdualag™

(nivolumab /relatlimab)

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ¹⁻²

**ΔΙΠΛΟΣ ΑΝΟΣΟΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
LAG-3 ΚΑΙ PD-1³⁻⁵**

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέπει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Ένδειξη Το Opdualag ενδείκνυται για τη θεραπεία πρώτης γραμμής του προχωρημένου (μη χειρουργήσιμου ή μεταστατικού) μελανώματος σε ενήλικες και εφήβους ηλικίας 12 ετών και άνω με έκφραση του PD-L1 στα κύτταρα του όγκου < 1%.

Περίληψη του προφίλ ασφάλειας Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι κόπωση (41%), μυοσκελετικός άλγος (32%), εξάνθημα (29%), αρθραλγία (26%), διάρροια (26%), κνησμός (26%), κεφαλαλγία (20%), ναυτία (19%), βήχας (16%), μειωμένη όρεξη (16%), υποθυρεοειδισμός (16%), κοιλιακό άλγος (14%), λεύκη (13%), πυρετός (12%), δυσκοιλιότητα (11%), ουρολοίμωξη (11%), δύσπνοια (10%) και έμετος (10%). Οι πιο συχνές σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι επινεφριδιακή ανεπάρκεια (1,4%), αναμία (1,4%), ασφυγμία (1,1%), κολίτιδα (1,1%), διάρροια (1,1%), μυοκαρδίτιδα (1,1%), πνευμονία (1,1%) και ουρολοίμωξη (1,1%). Η επίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών βαθμού 3-5 σε ασθενείς με προχωρημένο (μη χειρουργήσιμο ή μεταστατικό) μελάνωμα ήταν 43% για ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με nivolumab σε συνδυασμό με relatlimab και 35% για ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με nivolumab.

ΕΛΛΑΔΑ	
Φαρμακευτικό προϊόν	Λιανική Τιμή (συμπ. 6% ΦΠΑ)
OPDUALAG C/S.SOL.IN (240+80)MG/VIAL BT X 1 VIAL X 20ML	€ 6.719,75

Σύμφωνα με το Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης της 4ης Ιανουαρίου 2025

1. OPDUALAGTM, Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, 7/2025. 2. Tawbi HA, et al. N Engl J Med. 2022;386(1):24-34. 3. Gellrich FF, et al. J Clin Med. 2020;9(1):223. 4. Long L, et al. Genes Cancer. 2018;9(5-6):176-189. 5. Woo S-R, et al. Cancer Res. 2012;72(4):917-927.

Τρόπος διάθεσης (BLUE BOX) του φαρμακευτικού προϊόντος Opdualag:

Ελλάδα: «Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία». **Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας:** 110339/22/20-02-2023

Κύπρος: «Με ιατρική συνταγή».

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:

Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040337, Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitrinikarta.gr>
Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Τηλ: +357 22608607, Φαξ: +357 22608669, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs

ΚΥΠΡΟΣ	
Φαρμακευτικό προϊόν	Μέγιστη Δυνατή Λιανική Τιμή (συμπ. 6% ΦΠΑ)
OPDUALAG C/S.SOL.IN (240+80)MG/VIAL BT X 1 VIAL X 20ML	€ 6.532,49

Σύμφωνα με τον Ενιαίο Τιμοκατάλογο με ισχύ από 1ης Φεβρουαρίου 2025

Έντυπη μορφή της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος διατίθεται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την ισχύουσα Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σαρώνοντας τον παρακάτω QR code.

Ημερομηνία αναθεώρησης κειμένου: 07/2025



Επιστημονική Διημερίδα

Διεπιστημονική εκπαίδευση για
τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2025

08:45-09:00

Προσέλευση - Εγγραφές

09:00-09:30

Χαιρετισμοί – Έναρξη Νοσηλευτικού Προγράμματος

09:30-10:00

Διάλεξη

Προεδρείο: Α. Πρινάρη, Ε. Πατηράκη

Η φιλαυτία ως παράγοντας επίδρασης στη φροντίδα
υγείας

Δ. Παπαγεωργίου

Σχολιασμός: Ε. Πανάγου

10:00-10:30

Διάλεξη

Προεδρείο: Μ. Σπινθούρη, Θ. Κωνσταντινίδης

Ασφάλεια Ογκολογικών Ασθενών – Πρόκληση για το
Δημόσιο Νοσοκομείο

Ε. Μακράκη

Σχολιασμός: Χ. Σωτηριάδου

10:30-11:30

Στρογγυλό Τραπέζι

Ογκολογική Νοσηλευτική – Το Ελληνικό Project

Προεδρείο: Ε. Κυρίτση, Ο. Γκοβίνα, Ε. Δροσάκη

Εξειδίκευση στην Ογκολογία στην Ελλάδα

Ι. Κωτσιούμπα

Γενετική Συμβουλευτική και Νοσηλευτική

Α. Πελέκη

Ευρωπαϊκά Προγράμματα – Δυσκολίες της Ελληνικής
Πραγματικότητας

Ν. Πολίτης

Μετάβαση από την ασθενοκεντρική στην ολιστική
φροντίδα υγείας

Α. Γαβαλά, Ξ. Τυμπακιανάκη

Νέοι Νοσηλευτές στην Ογκολογία

Σ. Πλούκου

Σχολιασμός: Π.Μ. Πράπα, Ε. Θρουβάλα, Δ. Αρτεμάκη

11:30-12:00

Διάλειμμα

mPFS IMPROVEMENT WITH ENHERTU VS CHEMOTHERAPY AFTER 1 OR 2 LINES OF ET^{1,2} IN HR+ /HER2-LOW AND HER2-ULTRALOW mBC¹



▼ Το φάρμακο τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +302132040337, Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitrinikarta.gr>

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ¹

Καρκίνος του μαστού

• HER2-Θετικός καρκίνος του μαστού

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό HER2-θετικό καρκίνου του μαστού που έχουν λάβει ένα ή περισσότερα προηγούμενα σχήματα βασισμένα σε αγωγή έναντι του HER2

• Χαμηλής έκφρασης HER2 και εξαιρετικά χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνος του μαστού

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό:

- θετικό στον ορμονικό υποδοχέα (HR), χαμηλής έκφρασης HER2 ή εξαιρετικά χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνου του μαστού που έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία σε μεταστατική κατάσταση και δεν θεωρούνται κατάλληλες για ενδοκρινική θεραπεία ως επόμενη γραμμή θεραπείας
- χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνου του μαστού που έχουν λάβει προηγούμενη χημειοθεραπεία σε μεταστατική κατάσταση ή έχουν παρουσιάσει υποτροπή της νόσου κατά τη διάρκεια ή εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση της επικουρικής χημειοθεραπείας

Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (MMKP)

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο MMKP των οποίων ο καρκίνος έχει μια ενεργοποιητική μετάλλαξη του HER2 (ERBB2) και οι οποίοι χρήζουν συστηματικής θεραπείας μετά από χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνη, με ή χωρίς ανοσοθεραπεία.

Καρκίνος του στομάχου.

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο HER2-θετικό αδενοκαρκίνωμα του στομάχου ή της γαστροοισοφαγικής συμβολής (ΓΟΣ) που έχουν λάβει ένα προηγούμενο σχήμα βασισμένο στην ττραστοζουμάμπη

Σύνοψη του προφίλ ασφαλείας Enherthu 5,4 mg/kg (κλινικές μελέτες σε πολλαπλούς τύπους όγκων)¹.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ναυτία (71,1%), κόπωση (55,3%), έμετος (37,3%), αλωπεκία (36,1%), αναμία (35,9%), ουδετεροπενία (35,1%), δυσκοιλιότητα (31,7%), μειωμένη όρεξη (30,6%), διάρροια (30,1%), αυξημένες τρανσαμινάσες (26,6%), μυοσκελετικό άλγος (23,6%), θρομβοπενία (23,1%) και λευκοπενία (21,5%).

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 3 ή 4 σύμφωνα με τα Κοινά Κριτήρια Ορολογίας για Ανεπιθύμητες Ενέργειες του Εθνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ (NCI-CTCAE v.5.0) ήταν ουδετεροπενία (18,0%), αναμία (10,5%), κόπωση (7,8%), λευκοπενία (6,0%), θρομβοπενία (3,9%), ναυτία (4,9%), λεμφοπενία (3,9%), υποκαλιαιμία (3,8%), αυξημένες τρανσαμινάσες (3,5%), διάρροια (έμετος (2,4%), μειωμένη όρεξη (1,8%), πνευμονία (1,3%) και μειωμένο κλάσμα εξώθησης (1,0%). Ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 5 παρουσιάστηκαν στο 1,4% των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της ΔΠΠ/πνευμονίτιδας (1,1%).

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις¹

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Enherthu σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχουν τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Το Enherthu δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι γυναίκες δεν πρέπει να θηλάζουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Enherthu ή για 7 μήνες μετά την τελευταία δόση. Επίσης οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία θα πρέπει να προτρέπονται να χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντισύλληψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για τουλάχιστον 7 μήνες μετά την τελευταία δόση του Enherthu.

Προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή¹

- Το Enherthu είναι εμετογόνο, πράγμα που περιλαμβάνει όψιμη ναυτία ή/και έμετο. Πριν από κάθε δόση του Enherthu, οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή με ένα συνδυαστικό σχήμα δύο ή τριών φαρμακευτικών προϊόντων (π.χ. δεξαμεθαζόνη με ανταγωνιστή των υποδοχέων 5-HT₃ ή/και με ανταγωνιστή των υποδοχέων NK1, καθώς και με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα, όπως ενδείκνυται) για την πρόληψη της ναυτίας και του εμέτου που προκαλούνται από τη χημειοθεραπεία

Χονδρική Τιμή: 1596,15€, Νοσοκομειακή Τιμή: 1435,13€, Λιανική Τιμή: 1755,37€.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ¹: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία. **Δοσολογία Καρκίνος του μαστού** Η συνιστώμενη δόση του Enherthu είναι 5,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενα με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. **Καρκίνος του στομάχου** Η συνιστώμενη δόση του Enherthu είναι 6,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενα με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. Η αρχική δόση θα πρέπει να χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση διάρκειας 90 λεπτών. Εάν η προηγούμενη έγχυση ήταν καλά ανεκτή, οι επόμενες δόσεις του Enherthu μπορούν να χορηγηθούν με εγχύσεις διάρκειας 30 λεπτών. Ο ρυθμός έγχυσης του Enherthu θα πρέπει να επιβραδύνεται ή να διακόπτεται προσωρινά εάν ο ασθενής εμφανίσει συμπτώματα σχετιζόμενα με την έγχυση. Σε περίπτωση αντιδράσεων σοβαρής μορφής στην έγχυση, το Enherthu θα πρέπει να διακόπτεται οριστικά.

Βιβλιογραφία: 1.Enherthu Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Μάρτιος 2025 2.Bardia A et al. N Engl J Med. 2024;391(22):2110-22.

Για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Daiichi Sankyo ή στην Astra Zeneca ή σκανάρετε το QR code



https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/enherthu-epar-product-information_el.pdf



Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Daiichi Sankyo Europe GmbH
Υπεύθυνος Συν-πρώθησης: Daiichi Sankyo Greece
Daiichi Sankyo Greece, Κηφισίας 299, Κηφισιά, 14561, Αθήνα,
Τηλ: 2104448037
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 175572301000, www.daiichi-sankyo.gr



Τοπικός Αντιπρόσωπος του KAK :
AstraZeneca A.E
Αγροιλιάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ: 2106871500
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 00063891000, www.astrazeneca.gr

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
www.kitrinikarta.gr
www.kitrinikarta.gov.cy**

Επιστημονική Διημερίδα

Διεπιστημονική εκπαίδευση για
τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2025

12:00-14:00

Στρογγυλό Τραπέζι

Καρκίνος Μαστού

Προεδρείο: **E. de Bree, I. Βαρθαλίτης, Μ. Τόλια**

Αντιμετώπιση της τοπικής υποτροπής

Χ. ΑντωνίουΕντατικοποίηση της θεραπείας στον πρώιμο ER+/HER2-
καρκίνο μαστού**Σ. Μανωλάκου**Θεραπευτικές επιλογές σε HR+/HER- μεταστατικό καρκίνο
μαστού μετά από πρόοδο σε θεραπεία 1^{ης} γραμμής**Ι. Στουπής**Θεραπευτικός αλγόριθμος στον μεταστατικό HER2+
καρκίνο μαστού**Α. Μαλά**Η μοριακή ταυτότητα του όγκου βοηθά στην
εξατομίκευση της ακτινοθεραπείας;**Ε. Λυραράκη**Σχολιασμός: **Ι. Ασκοξυλάκης, Ε. Μοιρογιώργου**

14.00-16.00

Μεσημβρινή διακοπή

16:00-16:30

Διάλεξη

Προεδρείο: **Α. Κρασουδάκης, Μ.Α. Καλογερίδη**

Γλοίωμα χαμηλού βαθμού κακοήθειας

Γ. Πισσάκας

16:30-18:10

Στρογγυλό Τραπέζι

Καρκίνος Πνεύμονα

Προεδρείο: **Σ. Αγγελάκη, Ε. Σαμαντάς, Μ. Πομώνη**ΜΜΚΠ-N2 νόσος: Πότε είναι εφικτή η χειρουργική
αντιμετώπιση υπό το φως των νέων δεδομένων της
προεγχειρητικής χημειο-ανοσοθεραπείας**Γ. Κουλαξουζίδης**Θέτοντας τον πήχη της επιβίωσης στον μεταστατικό
ΜΜΚΠ**Ι. Τουρκαντώνης**Sponsored by  **MSD**Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του εκτεταμένου
σταδίου Μικροκυτταρικού Καρκίνου του Πνεύμονα:
ο ρόλος της Σερπλουλιμάμπης**Α. Μίχας**Sponsored by **WinMedica**

Προφυλακτική ακτινοθεραπεία εγκεφάλου

Σ. Κάχρης

18.10-18.30

Διάλειμμα

**ΟΤΑΝ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΡΕΧΕΙ
ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΟΣ***

**Ενισχύουμε
την Ελπίδα**

**ΤΟ VERZENIOS ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ
CDK4 & 6 ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΒC ΟΣΟ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΒC**

ΕΒC υψηλού κινδύνου: Μείωση του κινδύνου υποτροπής και απομακρυσμένων μεταστάσεων σε συνδυασμό με ΕΤ.

ΜΒC: Αύξηση της PFS σε συνδυασμό με AI ή φουλβεστράντη και βελτίωση της OS σε συνδυασμό με φουλβεστράντη, ακόμη και σε εκείνες τις ασθενείς με πτωχή πρόγνωση.

*Ο ΕΒC υψηλού κινδύνου ορίζεται με βάση την παρουσία ασθενών με ≥4 θετικών μασχαλαίους λεμφαδένες ή 1-3 θετικούς μασχαλαίους λεμφαδένες και όγκους ≥5 cm, ιστολογικού βαθμού κακοήθειας 3, ή και τα δύο. ΜΒC υψηλού κινδύνου θεωρήθηκε η παρουσία χαρακτηριστικών της νόσου που θα μπορούσαν να προσδώσουν πτωχότερη πρόγνωση, όπως ηπατικές μεταστάσεις, κατάσταση PgR- και υψηλός βαθμός κακοήθειας του πρωτοπαθούς όγκου. CDK4 & 6=κυκλino-εξαρτώμενη κινάση 4 και 6, ΕΒC=πρώιμος καρκίνος του μαστού, ΕΤ=ενδοκρινική θεραπεία, HER2=υποδοχέας 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, HR=ορμονικός υποδοχέας, ΜΒC=μεταστατικός καρκίνος του μαστού, PgR=προγεστερυνικός υποδοχέας, AI=αναστολέας αρωματάσης, PFS=επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου, OS=συνολική επιβίωση.

1. Verzenios Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 2. Sledge GW Jr et al. JAMA Oncol. 2020;6(1):116-24, 3. Rastogi P et al. J Clin Oncol. 2024. Doi: 10.1200/JCO.23.01994, 4. Johnston S et al. NPJ Breast Cancer. 2019;5(1):5, 5. Ibrance Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 6. Kisqali Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος σκανάρωντας τον κωδικό QR



Επιστημονική Διημερίδα

Διεπιστημονική εκπαίδευση για
τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2025

18:30-19:30

Δορυφορικές διαλέξειςΠροεδρείο: **Α. Κωτσάκης, Ζ. Σαριδάκη-Ζώρα, Ι. Δροσίτης**

Inavolisib: Εξατομικευμένη θεραπεία στην 1^η γραμμή
ορμονοανθεκτικού καρκίνου μαστού με PIK3CA μετάλλαξη

Ε. Λιανός
Sponsored by 

Η θέση της ανοσοθεραπείας στη διαχείριση των μη
μελανωματικών κακοηθειών του δέρματος

Ν. Αλεβιζόπουλος
Sponsored by 

19:30-20:45

Στρογγυλό Τραπέζι**Θέματα αιχμής στην Ογκολογία**Προεδρείο: **Δ. Μαυρουδής, Ι. Μπουκοβίνας, Μ. Σταθάκη**

Μικροβίωμα και καρκίνος: Νέες οπτικές στην Ογκογένεση

Μ. Γαζούλη

Χρήση του ctDNA στην Ογκολογία: Αναγκαιότητα,
εφαρμογές και προοπτικές

Γ. Νασιούλας

Απεικονιστικά διλήμματα στην ερμηνεία των
αποτελεσμάτων του PET/CT

Ο. Μπουρογιάννη

20:45-21:00

Τελετή έναρξης - ΧαιρετισμοίΠροεδρείο: **Δ. Καρδαμάκης, Η. Μπομπολάκη, Ν. Ανδρουλάκης**

21.00-21.30

Εναρκτήρια Ομιλία

Η θέση της μεταμόσχευσης ήπατος στη θεραπεία
ασθενών με συμπαγείς χόγκους

Γ. Σωτηρόπουλος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥΣ.^{2,3}

- ✓ Για πάνω από 8 χρόνια, το **IBRANCE** έχει καταφέρει να διατηρήσει στιγμές σαν αυτή²⁻⁵
- ✓ Υποστηρίζεται από ευρύ φάσμα δεδομένων, κλινικών μελετών και καθημερινής κλινικής πρακτικής^{1,2, 6-27}

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το IBRANCE, 125mg μια φορά την ημέρα από του στόματος για 21 μέρες σε κύκλο 28 ημερών (σχήμα 3/1), ενδείκνυται για τη θεραπεία του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου του μαστού ο οποίος είναι θετικός στους ορμονικούς υποδοχείς (HR) και αρνητικός στον υποδοχέα τύπου 2 του ανθρωπίνου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (HER2):

- σε συνδυασμό με αναστολέα της αρωματάσης
 - σε συνδυασμό με φουλβεστράντη σε γυναίκες που έχουν λάβει προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία
- Σε προ- ή περι-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες η ενδοκρινική θεραπεία πρέπει να συνδυάζεται με LHRH αγωνιστή.¹

Για το πλήρες κείμενο της δοσολογίας και του τρόπου χορήγησης συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το IBRANCE αντενδείκνυται σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα, καθώς και σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν σκευάσματα που περιέχουν υπερικό/βαλσαμόχορτο (St. John's Wort). Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 20%) οποιουδήποτε βαθμού που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν palbociclib σε τυχαioποιημένες κλινικές μελέτες ήταν ουδετεροπενία, λοιμώξεις, λευκοπενία, κόπωση, ναυτία, στοματίτιδα, αναμία, διάρροια, αλωπεκία και θρομβοπενία. Οι πιο συχνές (≥ 2%) ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού ≥ 3 του palbociclib ήταν ουδετεροπενία, λευκοπενία, λοιμώξεις, αναμία, αυξημένη ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST), κόπωση και αυξημένη αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT).¹

Συντομογραφίες: **AST** = aspartate transaminase, **ALT** = alanine transaminase, **HER2** = human epidermal growth factor receptor, **HR** = hormone receptor, **HR+/HER2-** = hormone receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative, **LHRH** = luteinising hormone-releasing hormone, **mBC** = metastatic breast cancer.

Παραπομπές:

1. IBRANCE, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 10/2024.
2. Rugo H, et al. Breast Cancer Res Treat. 2019;174(3):719-729.
3. Rugo HS, et al. Ann Oncol. 2018;29:888-894.
4. <https://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn/4594-deltio-timwn-newn-farmakwn-anthrwpinhs-xrhshs-13-04-2017> (Πρόσβαση Ιανουάριος 2025)
5. George MA, et al. Front Oncol. 2021;11:693104.
6. Cristofanilli M, et al. Clin Cancer Res. 2022;28(16):3433-3442.
7. Finn RS, et al. N Engl J Med. 2016;375(20):1925-1936.
8. Gelmon K, et al. Breast. 2021;59:321-326.
9. Rugo HS, et al. Eur J Cancer. 2018;101:123-133.
10. Turner NC, et al. Ann Oncol. 2018;29(3):669-680.
11. Cristofanilli F, et al. Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439.
12. Harbeck N, et al. Future Oncol. 2021;17(16):2107-2122.
13. Goyal RK et al. Cancer. 2023 Apr 1;129(7):1051-1063.
14. Richardson D, et al. Breast Cancer Res Treat. 2021;187(1):113-124.
15. De Michele A, et al. Breast Cancer Res. 2021;23:37.
16. Rugo HS, et al. NPJ Breast Cancer. 2022;8(1):114.
17. Taylor-Stokes G, et al. Breast. 2019;43:22-27.
18. Waller J, et al. J Glob Oncol. 2019;5:JGO1800239.
19. Mycock K, et al. Future Oncol. 2022;18:349-362.
20. Mycock K, et al. Curr Oncol. 2021;28:678-688.
21. Mycock K et al. Cancer Treat Res Commun. 2022;32:100573.
22. Mycock K, et al. Clin Ther. 2022;44(12):1588-1601.
23. Slamon DJ et al. J Clin Oncol. 2024 Mar 20;42(9):994-1000.
24. Finn R, et al. Oncologist. 2021;26:e749-e755.
25. Diéras V, et al. Oncologist. 2019;24(12):1514-1525.
26. Verma S, et al. Oncologist. 2016;21(10):1165-1175.
27. Harbeck N, et al. Ann Oncol. 2016;27(6):1047-1054

Η συντετμημένη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος δημοσιεύεται σε διαφορετική σελίδα του παρόντος.

Επιστημονική Διημερίδα

Διεπιστημονική εκπαίδευση για
τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΣΑΒΒΑΤΟ

11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2025

09:00-09:30 Ανασκόπηση της πρώτης ημέρας του Συνεδρίου
N. Ανδρουλάκης, Δ. Καρδαμάκης

09:30-11:30 **Στρογγυλό Τραπέζι**
Καρκίνοι Ουροποιητικού
Προεδρείο: **Π. Ανεζίνης, Β. Μποζιονέλου**

Ριζική προστατεκτομή ή ακτινοθεραπεία στον τοπικά
εκτεταμένο/ ολιγομεταστατικό καρκίνο προστάτη

Ουρολόγος: **Δ. Τζωρτζακάκης**

Ακτινοθεραπευτής: **Ε. Μπερούκας**

Η σημασία της θεραπείας πρώτης γραμμής στο
μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο προστάτη

Η. Μπομπολάκη

Sponsored by  **astellas**

Μεταστατικός Ορμονοευαίσθητος Καρκίνος του Προστάτη:
Από τις Τυχαίοποιημένες Κλινικές Μελέτες στα Δεδομένα
Καθημερινής Κλινικής Πρακτικής

Λ. Κοντοβίνης

Sponsored by **Johnson&Johnson**

Εστιάζοντας στο βέλτιστο θεραπευτικό αλγόριθμο των
συστηματικών θεραπειών προς όφελος των ασθενών

Ρ. Ζακοπούλου

Sponsored by  **IPSEN**

11.30-12.00 **Διάλειμμα**

12:00-13:30 **Στρογγυλό Τραπέζι**
Καρκίνοι ανώτερου πεπτικού
Προεδρείο: **Χ. Δερβένης, Π. Παπακώστας, Γρ. Γεωργακόπουλος**

Θεραπευτικές δυνατότητες επεμβατικής γαστρεντερολογίας
 στους ασθενείς με καρκίνο

Μ. Βελεγράκη

Θεραπευτικός αλγόριθμος σε ασθενείς με μεταστατικό
καρκίνο στομάχου-ΓΟΣ

Π. Κατσαούνης

Έχει μείνει ρόλος για την ακτινοθεραπεία στους
καρκίνους του ανώτερου πεπτικού;

Ι. Γεωργακόπουλος

Θεραπευτικές επιλογές 1^{ης} γραμμής στον ηπατοκυτταρικό
καρκίνο

Ε. Κοντοπόδης

ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ EMA: ως μονοθεραπεία για ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαθέσιμες τυπικές θεραπείες¹



Επαναπροσδιορίστε την επιβίωση

Η πρώτη στοχευμένη θεραπεία στον mCRC ανεξαρτήτως μεταλλάξεων^{1,3}

Το FRUZAQLA ενδείκνυται:

Το FRUZAQLA ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία του μεταστατικού ορθοκολικού καρκίνου (mCRC) σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαθέσιμες τυπικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της χημειοθεραπείας με βάση την φθοριοπυριμιδίνη, την οξαλιπλατίνη και την ιρινοτεκάνη, παράγοντες anti-VEGF και παράγοντες anti-EGFR, και οι οποίοι έχουν παρουσιάσει πρόοδο νόσου ή είχαν δυσανεξία σε θεραπεία είτε με τριφλουριδίνη/τιπρασσίλη είτε με ρεγοραφενίμπη.

Βιβλιογραφικές παραπομπές:

1. FRUZAQLA®. Περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος.
2. Dasari A, Lonardi S, Garcia-Carbonero R, et al: FRESCO-2 Study Investigators. Fruquintinib versus placebo in patients with refractory metastatic colorectal cancer (FRESCO-2): an international, multicentre, randomised, double-blind, phase 3 study. Lancet. 2023;402(10395):41-53.
3. Li J, Qin S, Xu R, et al. Effect of fruquintinib vs placebo on overall survival in patients with previously treated metastatic colorectal cancer: the FRESCO randomized clinical trial. JAMA. 2018;319(24):2486-2496.

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

FRUZAQLA Tabs, 5 mg/Tab, BT x 21: Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού 5.652,21€
FRUZAQLA Tabs, 1 mg/Tab, BT x 21: Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού 1.420,15€

Ενδεικτική τιμή πώλησης/συσκευασίας [με βάση την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τους κανόνες τιμολόγησης και ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους (on patent)].

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ΕΔΩ.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέπει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενο ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Κάτοχος άδειας Κυκλοφορίας
Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland
Τοπικός Αντιπρόσωπος Takeda Ελλάς Α.Ε.
Green Plaza, Κτίριο Β, Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, 151 24 Μαρούσι
Τηλ. κέντρο: 2106387800, Fax: 2106387801, www.takeda.gr

Πριν από τη συνταγογράφηση του
FRUZAQLA, συμβουλευτείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος (Π.Χ.Π.), η οποία είναι
διαθέσιμη μέσω του κώδικα QR.



EXA/GR/FRZ/0006, 01/25

Επιστημονική Διημερίδα

Διεπιστημονική εκπαίδευση για
τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΣΑΒΒΑΤΟ

11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2025

13:30-15:00

Στρογγυλό Τραπέζι

Κολοορθικός Καρκίνος

Προεδρείο: Ι. Σουγκλάκος, Ν. Κατσούγκρης, Ξ. Βακάλης

Ολική νεοεπιχειρητική θεραπεία σε καρκίνο ορθού:

Για ποιους ασθενείς και ποιο σχήμα

Ν. Βαρδάκης

Το μέλλον στη θεραπεία των ασθενών με μεταστατικό
καρκίνο παχέος εντέρου με μετάλλαξη στο γονίδιο BRAF:

Νέες προοπτικές

Λ. Βαμβακάς

Sponsored by **MERCK**Αντιμετώπιση περιτοναϊκών μεταστάσεων από καρκίνο
παχέος εντέρου

Ε. Λώλης

15.00-17.00

Μεσημβρινή διακοπή

17:00-18:30

Στρογγυλό Τραπέζι

Γυναικολογικός Καρκίνος

Προεδρείο: Ε. Γιαννικάκη, Χ. Κουρούσης, Π. Παπακοτούλας

Επαναπροσδιορίζοντας τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Ε. Χλιάρα

Εξατομίκευση της θεραπείας του καρκίνου του ενδομητρίου
στην εποχή της μοριακής ταξινόμησης

Μ. Ροβίθη

Θεραπεία ασθενών με καρκίνο ωοθηκών μετά αγωγή με
αναστολείς PARP: Νέοι στόχοι και προοπτικές

Α. Καλυκάκη

18.30-18.45

Διάλειμμα

18:45-19:15

Διάλεξη

Προεδρείο: Α. Καραμπεάξης, Κ. Δουκάκη

Ανακουφιστική φροντίδα

Κ. Μυστακίδου

Grasustek®

Pegfilgrastim

Οδηγός προστασίας

ADV / GRAS / 02 / RAF / 07.25



Υποδόρια
χορήγηση

Συσκευασία 6mg/0,6ml

1 προγεμισμένη σύριγγα (0,6ml)

Με αυτόματο κάλυκα ασφάλειας της βελόνας

GRASUSTEK INJ. SOL. 6MG/0.6ML PF.SYR. B.TXPF.SYR. Α.Τ.: 340,98€

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ή ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ QR



RAFARM Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Κορινθού 12, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 211 176 1000, e-mail: info@rafarm.gr
www.rafarm.gr



Επιστημονική Διημερίδα

Διεπιστημονική εκπαίδευση για
τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΣΑΒΒΑΤΟ

11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2025

19:15-20:00

Διαλέξεις

Προεδρείο: **Α. Αρδαβάνης, Γ. Μηλάκη, Εμ. Μιχαηλάκης**

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ: ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ-ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

«Ευ ζω με τον καρκίνο» Σύλλογος στήριξης ασθενών με
νεοπλασματική νόσο**Α. Κοντού**«Ορίζοντας» Αλληλεγγύης: Προωθώντας τον Εθελοντισμό
και στηρίζοντας τον Ογκολογικό Ασθενή**Χ. Καζάκου**

20:00-20:30

Διάλεξη

Προεδρείο: **Κ. Σπυριδάκης, Μ. Νικολάου**Ογκολογική Φαρμακευτική δαπάνη στα Νοσοκομεία της
7^{ης} ΥΠΕ**Ε. Ρηνάκη**

20:30-21:00

Διάλεξη

Προεδρείο: **Μ. Καραμούζης, Κ. Καλμπάκης, Γ. Πισσάκας**Ιατρονοσηλευτική και Γραμματειακή στελέχωση των
Ογκολογικών Κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας**Ε. Σαλούστρος**

Innovative Oncology

**BRAFTOVI**[®]
(encorafenib)

**MEKTOVI**[®]
(binimetinib)

**nerlynx**[®]
(neratinib)

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση (Braftovi): 75 mg σκληρά καψάκια. Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 75 mg encorafenib. Νοσοκομειακή τιμή (CAPS 75MG): € 936,39, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση (Mektovi): Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 15 mg binimetinib. Έκδοχο με γνωστή δράση. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 133,5 mg μονοϋδρικής λακτόζης. Νοσοκομειακή τιμή (TABS 15MG): €1.668,45, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση (Nerlynx): Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει ηλεινική νερατίνμη, ισοδύναμη με 40 mg νερατίνμης. Νοσοκομειακή τιμή: € 3.195,95, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό γιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε τις περιλήψεις χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται από τον κάτοχο αδειών κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**


Pierre Fabre
FARMAKA S.A.

Αγασίου 6-8, 15123 Μαρούσι,
Τηλ. 210-7234582

© 2024 Pierre Fabre, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Το BRAFTOVI[™] αποτελεί εμπορικό σήμα της Array Biopharma Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε διάφορες άλλες χώρες.
Το MEKTOVI[™] αποτελεί εμπορικό σήμα της Array Biopharma Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε διάφορες χώρες.
Το NERLYNX[™] αποτελεί εμπορικό σήμα της Puma Biotechnology Inc.

Επιστημονική Διημερίδα

Διεπιστημονική εκπαίδευση για
τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων



Κατάλογος Ομιλητών - Προέδρων - Σχολιαστών

de Bree Eelco	Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής – Χειρουργικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Διευθυντής Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας, Πα.Γ.Ν.Η.
Αγγελάκη Σοφία	Καθηγήτρια Παθολογικής Ογκολογίας, Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η., Εργαστήριο Μεταφραστικής Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αλεβιζόπουλος Νεκτάριος	Παθολόγος Ογκολόγος, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Ανδρουλάκης Νικόλαος	Παθολόγος Ογκολόγος, Συντονιστής Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο Πανάνειο»
Ανεζίνης Πλούταρχος	Χειρουργός - Ουρολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας, τ. Συντονιστής Διευθυντής, Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο - Πανάνειο»
Αντωνίου Χαρίκλεια	MD, PhD, Γενική Χειρουργός -Χειρουργός Μαστού, τ.Διευθύντρια, Β΄ Χειρουργική Κλινική, Υπεύθυνη Ιατρείου Μαστού, Γ.Ν. Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»
Αρδαβάνης Αλέξανδρος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Επιστημονικός Υπεύθυνος, Α΄ Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Αρτεμάκη Δόμνα	Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη Μ.Η.Ν Ογκολογικού Αιματολογικού, Γ.Ν. Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», Σύμβουλος Τ.Ν.Ο.ΕΣΝΕ.
Ασκοξυλάκης Ιωάννης	Χειρουργός Ογκολόγος - Μαστού
Βακάλης Ξενοφών	Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων - Εργαζομένων Ακτινοθεραπείας, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
Βαμβακάς Λάμπρος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η.
Βαρδάκης Νικόλαος	Παθολόγος Ογκολόγος, MD, PhD, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η.
Βαρθαλίτης Ιωάννης	Παθολόγος Ογκολόγος Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής, Α΄ Ογκολογική Κλινική, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Βελεγράκη Μαγδαληνή	Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο - Πανάνειο»
Γαβαλά Αναστασία	Νοσηλεύτρια, ΤΕ, MSc Μονάδα Ογκολογίας, ΓΝΗ «Βενιζέλειο-Πανάνειο»



SHE IS RESILIENT
SHE IS READY
SHE IS HERE

Το ELAHERE ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με θετικό στον υποδοχέα άλφα του φολικού οξέος (FRα), ανθεκτικό στην πλατίνη, υψηλής κακοήθειας, ορώδη επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών, καρκίνο των σαλπίγγων ή πρωτοπαθή καρκίνο του περιτοναίου που έχουν λάβει ένα έως τρία προηγούμενα συστηματικά θεραπευτικά σχήματα.^{1,2}

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

1. ELAHERE®. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 11/2024.
2. Moore KN, Angelergues A, Konecny GE, et al. Mirvetuximab soravtansine in FRa-positive, platinum-resistant ovarian cancer. N Engl J Med. 2023;389(23):2162-2174. doi:10.1056/NEJMoa2309169.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοσδήποτε πιθανολογούμενος ανεπιθύμητος ενέργειες. Βλέπε παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

ELAHERE C/S.SOL.IN 5MG/ML 1 VIAL (GLASS) X 20ML
Λ.Τ: 3.221,74 €



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος πατήστε εδώ, ή σκανάρετε το QR code.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:
AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Τηλ.: 214 4165555 • greekmedinfo@abbvie.com

GR-ELAH-250015, 03/25

abbvie

Επιστημονική Διημερίδα

Διεπιστημονική εκπαίδευση για
τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΩΝ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΩΝ

Γαζούλη Μαρία	Καθηγήτρια Βιολογίας, Γενετικής και Νανοϊατρικής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
Γεωργακόπουλος Γρηγόριος	Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Διευθυντής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Κ.Η.Ν. «Ν. Κούρκουλος», Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Γεωργακόπουλος Ιωάννης	Επίκουρος Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ε.Κ.Π.Α., «Αρεταίειο» Νοσοκομείο
Γιαννικάκη Ελπίδα	Παθολογοανατόμος, Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣΥ, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Γ.Ν.Ηρακλείου «Βενιζέλειο Πανάνειο»
Γκοβίνα Ουρανία	Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Δερβένης Χρήστος	Καθηγητής Χειρουργικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Διευθυντής Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας & Χειρουργικής Ήπατος - Χοληφόρων - Παγκρέατος, Νοσοκομείο «Metropolitan»
Δουκάκη Κλεάνθη	Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Διευθύντρια, Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Δροσάκη Ευαγγελία	Νοσηλεύτρια MSc Προϊσταμένη Μ.Η.Ν «Ν.Κούρκουλος» Α.Ν.Θ. Θεαγένειο
Δροσίτης Ιωάννης	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο Πανάνειο»
Ζακοπούλου Ρουμπίνη	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Θρουβάλα Ειρήνη	Νοσηλεύτρια MSc, PhD(c), Μονάδα Παθολογικής Ογκολογίας & ΧΜΘ Γυναικολογικού Καρκίνου, Γ.Ν «Ελενα Βενιζέλου», Ταμίας ΤΝΟ ΕΣΝΕ
Καζάκου Χρυσούλα	Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, Ιδρυτικό μέλος του Ορίζοντα
Καλμπάκης Κωνσταντίνος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η.
Καλογερίδη Μαρία Αγγελική	MD, MSc, PhD, Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Καλυκάκη Αντωνία	Παθολόγος Ογκολόγος, MD, PhD, Διευθύντρια ΕΣΥ, Πα.Γ.Ν.Η.
Καραμούζης Μιχαήλ	Παθολόγος-Ογκολόγος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.



ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

- Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 300 mg δαρολουταμίδης.
- Έκδοχο με γνωστή δράση: κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 186 mg μονοϋδρικής λακτόζης

Λιανική τιμή: 3031.95 €



Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας:
Bayer AG 51368, Leverkusen, Γερμανία

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας
Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αghaιλίου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα
Αρ. ΓΕΜΗ: 000299101000

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης
Τηλ: +30 210 6187742, Φαξ: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Το NUBEQA ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ανδρών με

- μη μεταστατικό, ανθεκτικό στον ευνουχισμό καρκίνο του προστάτη (nmCRPC) οι οποίοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν μεταστατική νόσο
- μεταστατικό ορμονοευσταθισμένο καρκίνο του προστάτη (mHSPC) σε συνδυασμό με δοσεταξέλ και θεραπεία στήρησης ανδρικών



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που θα βρείτε σαρώνοντας το QRC ή ακολουθώντας τον σύνδεσμο:
https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/nubeqa-epar-product-information_el.pdf,
ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 28/10/2024

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται
ιατρική συνταγή
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

PP-NUB-GR-0095-1
03.2025

Επιστημονική Διημερίδα

Διεπιστημονική εκπαίδευση για
τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΩΝ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΩΝ

Καραμπεάξης Αθανάσιος	MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής 401 ΓΣΝΑ & Εξωτ. Συνεργάτης Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center
Καρδαμάκης Δημήτριος	Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Γηριατρικής Ογκολογίας
Κατσαούνης Παναγιώτης	Παθολόγος Ογκολόγος, Α' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan»
Κατσούγκρης Νικόλαος	Γενικός χειρουργός, Διευθυντής ΕΣΥ
Κάχρης Στέφανος	MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Πα.Γ.Ν.Η.
Κοντοβίνης Λουκάς	Παθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογική Ομάδα Oncomedicare, Θεσσαλονίκη
Κοντοπόδης Εμμανουήλ	Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο - Πανάνειο»
Κοντού Αναστασία	Μέλος ΔΣ του συλλόγου «Ευ ζω με τον καρκίνο», Ηράκλειο Κρήτης
Κουλαξουζίδης Γεώργιος	Χειρουργός Θώρακος, Διευθυντής, Γ.Ν. Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»
Κουρούσης Χαράλαμπος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα, «Iasis» Γενική Κλινική Γαβριλάκη ΑΕ
Κρασουδάκης Αντώνιος	MD, PhD, Νευροχειρουργός, Διευθυντής ΕΣΥ, Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Χανίων, Αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Χανίων
Κυρίτση Ελένη	Ομότιμη Καθηγήτρια Νοσηλευτικής ΠΑΔΑ, Πρόεδρος Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Σ.Ν.Ε.)
Κωνσταντινίδης Θεοχάρης	Αναπληρωτής Καθηγητής Ογκολογικής και Ανακουφιστικής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Κωτσάκης Αθανάσιος	Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας
Κωτσιούμπα Ιωάννα	Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, MHM, Προϊστάμενη Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας, Γ.Α.Ν.Π «Μεταξά»
Λιανός Ευάγγελος	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Fentanyl/Sandoz

Fentanyl citrate



Το μέγεθος των δισκίων που απεικονίζονται δεν είναι πραγματικό.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ειδική ιατρική συνταγή του Ν 3459/06 περί ναρκωτικών (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ).
FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 100MCG/TAB ΒΤx30x1 Λ.Τ.: 88,01 €, FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 200MCG/TAB ΒΤx30x1 Λ.Τ.: 92,73 €,
FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 300MCG/TAB ΒΤx30x1 Λ.Τ.: 103,20 €, FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 400MCG/TAB ΒΤx30x1 Λ.Τ.: 103,20 €



Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

Η έντυπη μορφή της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος είναι επίσης διαθέσιμη από την εταιρεία Lavipharm Hellas A.E., τηλ.: 210 6691 000, e-mail: SafetyGreece@lavipharm.com

FENT/SAND/poster/LAV/02.2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοήστε
ΟΑΕΣ τις αναπληρωτές ενέργειες για
ΟΑΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΩΤΩΘΗΣΗΣ

Lavipharm Hellas A.E.

Οδός Αγίας Μαρίνας, 190 02 Παιανία Αττικής

Τηλ.: 210 6691 000

www.lavipharm.com

SANDOZ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Sandoz Pharmaceuticals d.d., Veronškova
ulica 57, SI-1000 Ljubljana, Σλοβενία.

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Φραγκοκκλησιάς 7B, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: +30 216 600 5000



Επιστημονική Διημερίδα

Διεπιστημονική εκπαίδευση για
τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΩΝ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΩΝ

Λυραράκη Ευφροσύνη	Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Πα.Γ.Ν.Η.
Λώλης Ευάγγελος	MD, PhD, ESPSO, FEBS, Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Χειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν.Ι.
Μακράκη Ειρήνη	Νοσηλεύτρια ΠΕ, PHN/CN, MSc, MHA, PhD©, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ. Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο - Πανάνειο»
Μαλά Αναστασία	Παθολόγος Ογκολόγος, Επικουρική Ιατρός, Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η.
Μανωλάκου Σταυρούλα	Παθολόγος Ογκολόγος, MD, MSc, PharmD, Συνεργάτης Γενικής Κλινικής Γαβριλάκη ΙΑΣΙΣ, Χανιά
Μαυρουδής Δημήτριος	Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μηλάκη Γεωργία	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ογκολογικού Τμήματος «Creta Interclinic»
Μιχαηλάκης Εμμανουήλ	Honorary PhD of Technical University of Crete, τέως Διευθυντής Ογκολογικής Μονάδας, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Μίχας Αθανάσιος	Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Θεραπευτική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Μοιρογιώργου Ευαγγελία	Παθολόγος Ογκολόγος, MD, MSc, Επιμελήτρια Β', Β' Παθολογική Ογκολογική Κλινική Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Μπερούκας Ερνέστος	M.D., PhD, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Δ/ντης IASIS Clinic, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
Μποζιονέλου Βασιλική	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η.
Μπομπολάκη Ηλιάδα	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Επιστημονικά υπεύθυνη Ογκολογικού τμήματος Γ.Ν. Χανίων
Μπουκοβίνας Ιωάννης	Παθολόγος Ογκολόγος, MD, PhD, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Ογκολογική Μονάδα, «Βιοκλινική» Θεσσαλονίκης
Μπουρογιάννη Όλγα	Επιμελήτρια Α, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, ΠΑΓΝΗ
Μυστακίδου Κυριακή	Καθηγήτρια Ανακουφιστικής Αγωγής, Ιατρική Σχολή, Υπεύθυνη Μονάδας Ανακουφιστικής Αγωγής "Τζέννη Καρέζη" (Παράρτημα Αρεταίειου Νοσοκομείου), Εθνικών και Καποδιστριακών Πανεπιστήμιο Αθηνών



Akynzeo[®]

netupitant/palonosetron

Ένα καψάκιο περιέχει 300 mg netupitant και 0,5 mg palonosetron



Αθήνα: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 14564, τηλ.: 210 5281700
Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης τηλ: 210 5281700
e-mail: pv@galenica.gr • www.galenica.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοφάρτετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Συμβουλευτείτε
την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος
Akynzeo[®] SmPC



HELSINN
Building quality cancer care together

Διανέμεται κατόπιν αδείας
της Helsinn Healthcare S.A, Ελβετία

Επιστημονική Διημερίδα

Διεπιστημονική εκπαίδευση για
τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΩΝ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΩΝ

Νασιούλας Γεώργιος	PhD, Επιστημονικός Διευθυντής GeneKor I.A.E
Νικολάου Μιχαήλ	Παθολόγος Ογκολόγος, MD, MSc, PhD, Επιμελητής Α', Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Πανάγου Ελένη	RN, MSc, PhD(c), Προισταμένη Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής, 401 Γ.Σ.Ν.Α.
Παπαγεωργίου Δημήτριος	Επικ. Καθηγητής Παθολ. Νοσηλ. Παν. Πελοποννήσου, Προϊστάμενος ODC, Ευρωκλινική Αθηνών, Πρόεδρος Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας Ε.Σ.Ν.Ε.
Παπακοτούλας Παύλος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Α' Χημειοθεραπευτικό - Ογκολογικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Παπακώστας Παύλος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Β' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan General»
Πατηράκη Ελισάβετ	Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ε.Κ.Π.Α.
Πελτέκη Ασημίνα	Νοσηλεύτρια Ογκολογίας και Κλινικών Μελετών, Πρότυπο Κέντρο Κλινικών Μελετών, Δ' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital
Πισσάκας Γεώργιος	Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Συντονιστής Διευθυντής, Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Πλούκου Στέλλα	Νοσηλεύτρια, RN, MSc, PhD, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Πολίτης Νικόλαος	Νοσηλευτής MSc, Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου
Πομώνη Μαρία	Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Μονάδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Π.Γ.Ν. Πατρών
Πράπα Παρασκευή Μαρία	Νοσηλεύτρια, MSc, PhD, Προϊσταμένη, Ογκολογική Μονάδα, Γ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
Πρινάρη Αγγελική	Νοσηλεύτρια RN, MSc, Διευθύντρια Ν.Υ., Πα.Γ.Ν.Η
Ρηνάκη Ελένη	Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος»
Ροβίθη Μαρία	Παθολόγος Ογκολόγος, Γ.Ν. Αγίου Νικολάου

Preveloda®

Capecitabine

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΣΕ **ΙΔΙΩΤΙΚΑ**
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ &
ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΤΟΥ **ΕΟΠΥΥ**



Λ.Τ.: € 17,04



Λ.Τ.: € 104,92

Δελτίο Τιμών 31/12/2024


PharmaZac

Pharmazac S.A.
pharmazac@pharmazac.com

Αναστάσιου Ζαρολιάγκη 1
& Δημήτριου Λάμπρου 6
ΒΙΟ.Π.Α. Κερατέας, 190 01 Κερατέα
Τ: 210 341 8889 – 95 & 210 866 1260 – 2

pharmazac.com |



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



PRV06/YB/02.2025/ADV

Επιστημονική Διημερίδα

Διεπιστημονική εκπαίδευση για
τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΩΝ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΩΝ

Σαλούστρος Εμμανουήλ	Αν. Καθηγητής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Ε
Σαμαντάς Επαμεινώνδας	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Β' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan»
Σαριδάκη - Ζώρα Ζένια	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια στην Α' Ογκολογική Κλινική Metropolitan Hospital, Αθήνα, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ογκολογικού Τμήματος «Ασκληπιός ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ», Ηράκλειο Κρήτης
Σουγκλάκος Ιωάννης	Παθολόγος - Ογκολόγος, Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σπινθούρη Μαρία	RN, MHM, PhD, Υποδιευκτίρια 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης
Σπυριδάκης Κωνσταντίνος	Διευθυντής, Φαρμακείο, Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο- Πανάνειο»
Σταθάκη Μαρία	MD, PhD, Πυρηνικός Ιατρός, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης
Στουπής Ιωάννης	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Γ.Ν. Ρεθύμνου
Σωτηριάδου Χρυσάνθη	Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΤΕΠ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου, Κλινικός Εκπαιδευτής, Κλινικός συνεργάτης ΙΕΚ Ευόσμου, Εργαστηριακός Συνεργάτης ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Σωτηρόπουλος Γεώργιος	MD, PhD, FACS, FEBS Καθηγητής Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων Ιατρικών Σχολών Πανεπιστημίων ΕΚΠΑ και Essen Διευθυντής Μονάδας Μεταμόσχευσης Ήπατος Γ.Ν. Αθηνών «Λαϊκό»
Τζωρτζακάκης Δημήτριος	MD, FEBU, Επιμελητής Α' Ουρολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο - Πανάνειο», Ηρακλείου Κρήτης
Τόλια Μαρία	Καθηγήτρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Α' Εργαστήριο Ακτινολογίας, Π.Γ.Ν.Α. «Αρεταίειο»
Τουρκαντώνης Ιωάννης	MD, MSc, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Β', Β' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Τυμπακιανάκη Ξανθήπη	Νοσηλεύτρια ΤΕ, Ογκολογική Κλινική, Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο»
Χλιάρα Ευδοξία	Παθολογοανατόμος, Γ.Ν.Ηρακλείου «Βενιζέλειο Πανάνειο»

innohep[®]

tinzaparin sodium



Χορηγείται με ιατρική συνταγή.
Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες επικοινωνήστε
με την LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

Για το ισχύον δελτίο τιμών
των φαρμάκων της LEO Pharma
σκανάρετε εδώ



LEO Pharmaceutical Hellas S.A.
Παπανικολή 22Α, 15232, Χαλάνδρι
Τηλ: 212 222 5000
contact@leo-pharma.com
αρ. ΓΕΜΗ 117058301000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Advancing the care of
patients with thrombosis

© LEO Pharma copyright - GR_inn_adv_Nov_2024-MAT-71106.
All LEO Pharma trademarks mentioned belong to the LEO Pharma Group.

Επιστημονική Διημερίδα

**Διεπιστημονική εκπαίδευση για
τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων**



Γενικές Πληροφορίες

Οργάνωση:

Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας

Σε συνεργασία με:

- Μονάδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Π.Ν. Πατρών «Παναγία η Βοήθεια»
- Ογκολογικό Τμήμα Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο - Πανάνειο»
- Ογκολογική Κλινική Γ.Ν. Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»
- Εταιρεία Στήριξης Αντικαρκινικής Έρευνας (Ε.Σ.Α.Ε.)

Υπό την αιγίδα:

- Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.)
- Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Α.Ο.)
- Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας (Ε.Σ.Ν.Ε.)

Ημερομηνία διεξαγωγής:

10 - 11 Οκτωβρίου 2025

Τόπος διεξαγωγής:

Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»
Παλαιό Τελωνείο, Πλατείας Κατεχάκη 8
Τ.Κ. 73132 – Χανιά
Τηλ.: +30 28213 41613

Γλώσσα:

Η επίσημη γλώσσα της Διημερίδας είναι η Ελληνική

Εγγραφές:

Η εγγραφή και η παρακολούθηση της Διημερίδας είναι δωρεάν και επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.

Οδηγίες για παρακολούθηση με φυσική συμμετοχή:

Όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία, θα πρέπει να προσέλθουν στον χώρο διεξαγωγής για την εγγραφή τους ή να πραγματοποιήσουν την προεγγραφή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.events.gr. Κατόπιν της εγγραφής, θα τους αποσταλεί ηλεκτρονικό barcode μέσω e-mail, το οποίο θα σαρώνουν κατά την είσοδο και έξοδό τους στην αίθουσα.

Επιστημονική Διημερίδα

Διεπιστημονική εκπαίδευση για
τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ

Οδηγίες Διαδικτυακής Παρακολούθησης:

Η Επιστημονική Εκδήλωση θα προβάλλεται ταυτόχρονα διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας www.livemed.gr.

- Εάν είστε νέος χρήστης παρακαλούμε πατήστε στο πεδίο Register/Εγγραφή και ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία. Η δημιουργία είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών.
- Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed, χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε από το μενού την κατηγορία Live, το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο Go Live ή Go Virtual.



Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την «Αίθουσα Συνεδριάσεων».



Εάν σας ενδιαφέρει να παραλάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την Εγγραφή σας στο συνέδριο μέσω της «Εικονικής Γραμματείας», πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο «Εγγραφή», ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος.

Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν 13,5 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits).

Παραλαβή Πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, μετά το πέρας των εργασιών της Διημερίδας, σε όσους συνέδρους παρακολούθησαν το 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος. Ο αριθμός Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD), θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης που θα καταγραφεί στο σύστημα καταμέτρησης τόσο στην είσοδο της αίθουσας για όσους έχουν φυσική παρουσία, όσο και στην πλατφόρμα Livemed για όσους παρακολουθήσουν διαδικτυακά.

Γραμματεία Διημερίδας



Events & Travel Solutions

Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη

Τηλ.: 210 98 80 032

Website: www.events.gr

E-mail: ets@events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η Ε.Τ.Σ. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr

Επιστημονική Διημερίδα

Διεπιστημονική εκπαίδευση για
τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων

Χορηγοί

abbvie

astellas

AstraZeneca

Bayer

Bristol Myers Squibb

Daiichi-Sankyo

DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ELPEN

FARAN
ONCOLOGY

Galenica

genepharma

GENESIS
pharmaGILEAD
Oncology

GSK

HEMOGLOBE
WHEN TECHNOLOGY SERVES HUMANINTEGRIS
PHARMA

IPSEN

Johnson & Johnson

Lavipharm

LEO

Lilly
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

MERCK

MSD

Pfizer
Oncology

PharmaZac

Pierre Fabre
FARMAKA S.A.

RAFARM

Roche

SANDOZ

SERVIER
moved by you

Takeda

teva

VIATRIS

WinMedica



Διεπιστημονική εκπαίδευση για τη θεραπεία των νεοπλησματικών νοσημάτων

Σημειώσεις



Επιστημονική Διμερίδα

Διεπιστημονική εκπαίδευση για τη θεραπεία των νεοπλησματικών νοσημάτων

Σημειώσεις



11^η Χρονιά

Επιστημονική Διημερίδα

Διεπιστημονική
εκπαίδευση
για τη θεραπεία των
νεοπλασματικών
νοσημάτων

10-11 Οκτωβρίου | 2025

Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

XANIA

