

13^{ος} χρόνος

Διοργάνωση

Ιατρική Εταιρεία
Έρευνας και Εκπαίδευσης

Υπό την Αιγίδα

ΕΟΠΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ
ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Σε συνεργασία

Επιστημονική Εκπαιδευτική
Ογκολογική Εταιρεία
Σκεπτόμενοι Διαφορετικά
Ενεργώντας Ογκολογικά

ΜΗΤΕΡΑ
Με ελπίδες για τη ζωή
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ HHG

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΕΛΛΟΚ



MULTIDISCIPLINARY Care Discussions in ONCOLOGY

ΑΘΗΝΑ | Ξενοδοχείο Divani Caravel | 30 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2025



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Χορηγούνται 21,5 Μόρια Συνεχιζόμενης
Ιατρικής Εκπαίδευσης
(ECMECs by the EACCME)

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΜΕ HR+/HER2- mBC¹

IBRANCE
palbociclib
Made for mBC

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥΣ.^{2,3}

- ✓ Για πάνω από 8 χρόνια, το **IBRANCE** έχει καταφέρει να διατηρήσει στιγμές σαν αυτή²⁻⁵
- ✓ Υποστηρίζεται από ευρύ φάσμα δεδομένων, κλινικών μελετών και καθημερινής κλινικής πρακτικής^{1,2, 6-27}

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το IBRANCE, 125mg μια φορά την ημέρα από του στόματος για 21 μέρες σε κύκλο 28 ημερών (σχήμα 3/1), ενδείκνυται για τη θεραπεία του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου του μαστού ο οποίος είναι θετικός στους ορμονικούς υποδοχείς (HR) και αρνητικός στον υποδοχέα τύπου 2 του ανθρωπίνου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (HER2):

- σε συνδυασμό με αναστολέα της αρωματάσης
 - σε συνδυασμό με φουλβεστράντη σε γυναίκες που έχουν λάβει προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία
- Σε προ- ή περι-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες η ενδοκρινική θεραπεία πρέπει να συνδυάζεται με LHRH αγωνιστή.¹

Για το πλήρες κείμενο της δοσολογίας και του τρόπου χορήγησης συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το IBRANCE αντενδείκνυται σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα, καθώς και σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν σκευάσματα που περιέχουν υπερικό/βαλοσαμόχορτο (St. John's Wort). Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 20%) οποιουδήποτε βαθμού που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν palbociclib σε τυχαioποιημένες κλινικές μελέτες ήταν ουδετεροπενία, λοιμώξεις, λευκοπενία, κόπωση, ναυτία, στοματίτιδα, αναμία, διάρροια, αλωπεκία και θρομβοπενία. Οι πιο συχνές (≥ 2%) ανεπιθύμητες ενέργειες Βαθμού ≥ 3 του palbociclib ήταν ουδετεροπενία, λευκοπενία, λοιμώξεις, αναμία, αυξημένη ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST), κόπωση και αυξημένη αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT).¹

Συντομογραφίες: **AST** = aspartate transaminase, **ALT** = alanine transaminase, **HER2** = human epidermal growth factor receptor, **HR** = hormone receptor, **HR+/HER2-** = hormone receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative, **LHRH** = luteinising hormone-releasing hormone, **mBC** = metastatic breast cancer.

Παραπομπές:

1. IBRANCE, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 10/2024. 2. Rugo H, et al. Breast Cancer Res Treat. 2019;174(3):719-729. 3. Rugo HS, et al. Ann Oncol. 2018;29:888-894. 4. <https://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn/4594-deltio-timwn-newn-farmakwn-anthrwpinh-s-xrhshs-13-04-2017> (Πρόσβαση Ιανουάριος 2025) 5. George MA, et al. Front Oncol. 2021;11:693104. 6. Cristofanilli M, et al. Clin Cancer Res. 2022;28(16):3433-3442. 7. Finn RS, et al. N Engl J Med. 2016;375(20):1925-1936. 8. Gelmon K, et al. Breast. 2021;59:321-326. 9. Rugo HS, et al. Eur J Cancer. 2018;101:123-133. 10. Turner NC, et al. Ann Oncol. 2018;29(3):669-680. 11. Cristofanilli F, et al. Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439. 12. Harbeck N, et al. Future Oncol. 2021;17(16):2107-2122. 13. Goyal RK et al. Cancer. 2023 Apr 1;129(7):1051-1063. 14. Richardson D, et al. Breast Cancer Res Treat. 2021;187(1):113-124. 15. De Michele A, et al. Breast Cancer Res. 2021;23:37. 16. Rugo HS, et al. NPJ Breast Cancer. 2022;8(1):114. 17. Taylor-Stokes G, et al. Breast. 2019;43:22-27. 18. Waller J, et al. J Glob Oncol. 2019;5:JGO1800239. 19. Mycock K, et al. Future Oncol. 2022;18:349-362. 20. Mycock K, et al. Curr Oncol. 2021;28:678-688. 21. Mycock K et al. Cancer Treat Res Commun. 2022;32:100573. 22. Mycock K, et al. Clin Ther. 2022;44(12):1588-1601. 23. Slamon DJ et al. J Clin Oncol. 2024 Mar 20;42(9):994-1000. 24. Finn R, et al. Oncologist. 2021;26:e749-e755. 25. Diéras V, et al. Oncologist. 2019;24(12):1514-1525. 26. Verma S, et al. Oncologist. 2016;21(10):1165-1175. 27. Harbeck N, et al. Ann Oncol. 2016;27(6):1047-1054

Η συντετμημένη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος δημοσιεύεται σε διαφορετική σελίδα του παρόντος.



PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Α. Μεσογείων 243,
Ν. Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα, Τηλ. Επικοινωνίας
210-6785800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH) Λεωφόρος
Αθαλάσσης 26, 2018 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.
Επικοινωνίας: +357 22 817690

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



13^{ος} χρόνος

MULTIDISCIPLINARY Care Discussions in ONCOLOGY

Χαιρετισμός

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,

Με μεγάλη μας χαρά σας προσκαλούμε στο 13^ο MDcON, με σκοπό να συζητήσουμε τις προόδους στην κατανόηση της βιολογίας του καρκίνου και στην ενσωμάτωση των νέων καινοτόμων θεραπειών στην καθημερινή κλινική πράξη. Η εντυπωσιακή εξέλιξη της ανοσοθεραπείας παρουσίασε θεαματικές επιτυχίες που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ. Οι στοχευμένες θεραπείες με παράλληλη ανάπτυξη βιοδεικτών, μας έμαθε να σκεπτόμαστε διαφορετικά τον τρόπο που σχεδιάζουμε τη θεραπεία του καρκίνου. Η εντυπωσιακή ανάπτυξη της τεχνολογίας μας εφοδίασε με τροποποιημένα μονοκλωνικά αντισώματα με καινοτόμο τρόπο δράσης που άνοιξαν νέους ορίζοντες τόσο στη μοριακή στόχευση, όσο και στην ανοσοθεραπεία. Η πρόοδος έρχεται με ιλιγγιώδη ρυθμό, ώστε να προκαλεί τον προβληματισμό πώς θα διερευνήσουμε όλες τις ευκαιρίες που προσφέρονται στην κλινική έρευνα.

Η δομή και η οδηγός παράσταση του συνεδρίου έθεσε εξ αρχής ως κεντρικό θέμα την ανάπτυξη της πολυπαραγοντικής συνεργασίας των ειδικοτήτων με βάση τον διάλογο και την ενσωμάτωση των νέων δεδομένων από την εξελισσόμενη κλινική έρευνα. Ο όρος MultiDisciplinary Care Discussions in Oncology (MDcON), όρισε τη δυναμική της Ογκολογίας ως δουλειά ομάδας, όπως εκφράστηκε με την ανάπτυξη των ογκολογικών συμβουλίων. Διατηρώντας την ίδια δομή, το 13^ο συνέδριο αναδεικνύει ως κεντρικό θέμα την αναζήτηση της ελπίδας στη μάχη κατά του καρκίνου. Σε κάθε επιστημονικό τραπέζι η κύρια ερώτηση θα είναι σχετική με την ελπίδα. Ποια ελπίδα προσφέρει η επιταχυνόμενη επιστημονική πρόοδος; Τι αλλάζει στις προοπτικές ζωής που δίνουμε στους ασθενείς μας; Πόσο σκεπτόμαστε διαφορετικά με τις καινοτόμες θεραπείες; Πόσο αποτελεσματικά εξατομικεύουμε τις αποφάσεις μας με τους βιοδείκτες; Υπάρχουν εξελίξεις που δημιουργούν προοπτικές που δεν φανταζόμαστε για τους ασθενείς μας;

Η αναζήτηση της ελπίδας στις ημέρες που ζούμε είναι μια πάλη με τον παραλογισμό που δυναστεύει τον κόσμο. Ο καρκίνος, παρόλο που κατανοούμε την βιολογία του, με τον τρόπο που διαταράσσει την ομοιοστασία του οργανισμού, είναι ένας ακόμη παραλογισμός. Σε όλα αυτά αντιπαραθέτουμε την ανάγκη για την ένωση των ανθρώπων. Κάνουμε αγώνα απέναντι στην απώλεια των ευκαιριών, στις ανισότητες στην πρόσβαση στην φροντίδα και στο δικαίωμα στην ελπίδα. Η Ογκολογία εμφανίζεται ως η Αναρχική Θεολογία της Αγάπης. Αναζητεί την ελπίδα ακόμη κι όταν χάνεται η προοπτική. Διεκδικεί το δικαίωμα στο αδύνατο, αφού οι άνθρωποι διεκδικούν την πρόοδο που θα φανεί στην επόμενη στροφή του δρόμου. Ενώνει τους ανθρώπους με την ανατρεπτική δύναμη της εξέλιξης της επιστήμης.

Ο ρόλος του ιατρού είναι θεμελιακά συνδεδεμένος με τη δημιουργία πίστης και ελπίδας. Η εγγενής αγάπη για τον άνθρωπο και η ιερατική αφοσίωση στην Ιατρική Επιστήμη είναι τα όπλα του ογκολόγου απέναντι στη φθορά, τη ματαίωση και την επαγγελματική εξουθένωση.

Με αυτές τις σκέψεις και τις προσδοκίες που δημιουργούν τα 13 χρόνια αναζήτησης της επιστημονικής αλήθειας και της ελπίδας, σας προσκαλώ σε ένα δημιουργικό και διαδραστικό συνέδριο. Πιστεύω ότι το υψηλό επίπεδο της Ελληνικής και της Διεθνούς συμμετοχής εγγυώνται μια καταπληκτική επιστημονική εμπειρία!

Με εκτίμηση,

Ηλίας Αθανασιάδης

Παθολόγος Ογκολόγος, Πρόεδρος του MDcON

DON'T MAKE THEM WAIT.

Start strong with CABOMETYX® + Nivolumab.



60% of aRCC patients don't reach 2L*2-4



67,6m FU results continue to support Cabometyx® - Nivolumab as a Standard of Care for previously untreated aRCC patients¹

Keep time on their side⁵

*Across three real-world studies, only 35-45% of patients received 2L²⁻⁴

References: 1. Motzer R, et al. Abstract 439. Presented at ASCO GU 2025. 2. Shah N, et al. Eur Urol. 2023;49:110-118. 3. Malik A, et al. Poster 19. Presented at IKCS 2023. 4. Lai G-S, et al. PLoS One. 2023;18(11):e0294039. 5. Bourlon MT, et al. Abstract 362, Presented at ASCO GU 2024.

IPSEN MON. ΕΠΕ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 9843324

E-mail: ipsenepe@ipsen.com

www.ipsen.com/greece

Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930

ΔΤΦ: 04/01/2025

CABOMETYX F.C.TAB 20MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€

CABOMETYX F.C.TAB 40MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€

CABOMETYX F.C.TAB 60MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και

Ανοφέρατε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για

ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Περίληψη Χαρακτηριστικών
Προϊόντος CABOMETYX®
Ημ. αναθεώρησης κειμένου,
20 Αυγούστου 2025

 **CABOMETYX®**
(cabozantinib) tablets

10 CABO-A/MAR 2025

 **IPSEN**



13^{ος} χρόνος

MULTIDISCIPLINARY Care Discussions in ONCOLOGY

Επιτροπές

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Αθανασιάδης Ηλίας

Αντιπρόεδροι: Νικολαΐδη Αδαμαντία
Τέγος Θεόδωρος

Μέλη: Ηλιάδης Κοσμάς
Μπουκοβίνας Ιωάννης
Παπαϊωάννου Δημήτριος
Σιούλας Βασίλειος
Στάμου Κωνσταντίνος
Τζίμας Γεώργιος
Τσιώτος Γρηγόριος

Επιστημονική Επιτροπή

Αναγνωστόπουλος Γεώργιος
Γκάγκα Μίνα
Ηλιάδης Κοσμάς
Κοντοβουνήσιος Χρήστος
Μαυραντώνης Κωνσταντίνος
Μπουκοβίνας Ιωάννης
Παπαϊωάννου Δημήτριος
Παπαλόης Απόστολος
Πευκιανάκη Μαρία
Πυτικός Θεόδωρος
Πισταμαλτζιάν Νικόλαος
Σιούλας Βασίλειος
Σουγκλάκος Ιωάννης
Στάμου Κωνσταντίνος
Τζανής Δημήτριος
Τζίμας Γεώργιος
Τσιώτος Γρηγόριος

ΤΟ LUMYKRAS ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΕ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 240 mg ΑΝΑ ΔΙΣΚΙΟ



ΝΕΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΣΚΙΩΝ

4 x **240 mg**

Αντιστοιχεί στη
συνιστώμενη δοσολογία
των 960 mg 1 φορά
την ημέρα¹

με 4 δισκία των 240 mg που οδηγεί σε καλύτερη συμμόρφωση²

Το LUMYKRAS® παραμένει διαλυτό για ασθενείς με δυσκολία στην κατάποση¹.

1. LUMYKRAS Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 2. Richter A et al. Clinical Therapy. 2003;25:2307-2335.

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Το προϊόν δεν είναι τιμολογημένο στην Ελλάδα, αναφέρεται προτεινόμενη τιμή 5.828 €.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

LUMYKRAS ΠΧΠ

Βεβαιώστε να γίνει το φάρμακο στο πακέτο και αναφέρετε
ΟΑΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΑΑ το φάρμακο
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα
αποστολής στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενέργειων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
(ΕΟΦ) Τηλ. +30 210340337, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας. Βεβαιώστε και στην
επιστολή του ΕΟΦ, www.ema.europa.eu, www.kiti.kardes.gr, yes.kiti@efpi.gr ή εναλλακτικά
την εναλλακτική στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ. +30 2103447000

ONCE-DAILY ORAL

LUMYKRAS®
(sotorasib)

AMGEN

Επισκεφθείτε
τη σελίδα μας
στο Facebook εδώ





13^{ος} χρόνος

MULTIDISCIPLINARY Care Discussions in ONCOLOGY

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

13:00-13:30	Προσέλευση - Εγγραφές	
13:30-15:25	Καρκίνοι του ουρογεννητικού συστήματος. Τι είναι πραγματικά νεότερο: νέα γνώση και αλλαγές στην καθημερινή κλινική πράξη Προεδρείο: Δ. Πεκτασίδης, Α. Μπάμιας, Σ. Τυριτζής	
13:30-13:45	Εξελίζεις στον καρκίνο του νεφρού	Α. Δημητριάδου
13:45-14:00	Εξελίζεις στον καρκίνο του ουροθηλίου	Ρ. Ζακοπούλου
14:00-14:15	Η θέση της εξατομικευμένης κατευθυνόμενης πυρηνικής θεραπείας (ligand-directed therapy) στον καρκίνο του προστάτη	Θ. Πιπίκος
14:15-14:35	Εξελίζεις στον καρκίνο του προστάτη: βέλτιστη διαχείριση της κατάστασης Homologous Repair Deficiency (HRD) και οι τρέχουσες ενδείξεις για τη χρήση των PARP inhibitors με έμφαση στην κλινική πρακτική	Χ. Πανόπουλος
14:35-14:50	Τι αλλάζει με τα νεότερα δεδομένα του ESMO στην καθημερινή κλινική πρακτική	Μ. Τσιατάς
14:50-15:00	Σχολιασμός: Δ. Ζύλης	
15:00-15:25	Συζήτηση	
15:25-15:45	Δορυφορική Διάλεξη Προεδρείο: Η. Αθανασιάδης Η θέση της ενζαλουταμίδης στον μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη	sponsored by  astellas Ν. Πισταμαλτζιάν
15:45-16:00	Διάλειμμα καφέ	
16:00-16:20	Δορυφορική Διάλεξη Προεδρείο: Η. Αθανασιάδης Βέλτιστος θεραπευτικός αλγόριθμος στους νευροενδοκρινείς όγκους	sponsored by  IPSEN Α. Νικολαΐδη
16:20-16:40	Δορυφορική Διάλεξη Προεδρείο: Ε. Σαμαντάς Μακροχρόνια χορήγηση ανοσοθεραπείας και νεότερα δεδομένα συνολικής επιβίωσης στον μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα εκτεταμένου σταδίου	sponsored by  Roche Ν. Πισταμαλτζιάν

NOW APPROVED

BRAFTOVI® (encorafenib) in combination with MEKTOVI® (binimetinib)
is indicated for the treatment of adult patients with
advanced non-small cell lung cancer with a *BRAF*^{V600E} mutation^{1,2}

TARGETING LASTING OUTCOMES FROM FIRST-LINE¹⁻³

Precise combination with meaningful benefits³



BRAFTOVI® + MEKTOVI®
(encorafenib) (binimetinib)



BRAFTOVI®
Περιλήψη
Χαρακτηριστικών Προϊόντος



MEKTOVI®
Περιλήψη
Χαρακτηριστικών Προϊόντος

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε τις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

Βιβλιογραφία

1. BRAFTOVI® Summary of Product Characteristics. Pierre Fabre Médicament, 2024. 2. MEKTOVI® Summary of Product Characteristics. Pierre Fabre Médicament, 2024. 3. Riely GJ, et al. *J Clin Oncol* 2023;41(21):3700–3711.

Σύνοψη προφίλ ασφαλείας: Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες (>25%) που εμφανίστηκαν σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με BRAFTOVI χορηγούμενο με MEKTOVI ήταν κόπωση, ναυτία, διάρροια, έμετος, κοιλιακό άλγος, μυοπάθεια/μυϊκές διαταραχές και αρθραλγία.

Για το BRAFTOVI:

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση: 75 mg σκληρά καψάκια. Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 75 mg encorafenib.
Νοσοκομειακή τιμή (CAPS 75MG): € 936,39, % επικορήνησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Για το MEKTOVI:

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 15 mg binimetinib.
Νοσοκομειακή τιμή (TABS 15MG): €1.668,45, % επικορήνησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοίξτε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Pierre Fabre

© 2024 Pierre Fabre, με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος Το BRAFTOVI είναι εμπορικό σήμα της Array Biopharma Inc., θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Pfizer Inc. Το MEKTOVI είναι εμπορικό σήμα της Array Biopharma Inc., θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Pfizer Inc.

Διεύθυνση: Αγιοσταύρου 6-8, 151 23 Μαρούσι
Τηλ.: 210 7234582



13^{ος} χρόνος

MULTIDISCIPLINARY Care Discussions in ONCOLOGY

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου

16:40-18:30

Multidisciplinary tumor boards

Προεδρείο: Π. Κοσμίδης, Μ. Γκάγκα, Κ. Ηλιάδης

- Περιστατικό 1: Χειρουργήσιμο μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονος σταδίου II Ε. Γκότσης
- Περιστατικό 2: Τοπικοπεριοχική νόσος σταδίου III μη μικροκυτταρικού καρκίνου πνεύμονος - ανεγχείρητο λόγω εκτεταμένης λεμφαδενικής νόσου στο μεσοθωράκιο Ω. Φιστέ
- Περιστατικό 3: ALK-θετικό αδενοκαρκίνωμα πνεύμονος - δυνατότητα για εξατομικευμένες επιλογές Σ. Τσαγκούλη

Σχολιαστές: Ι. Γεωργακόπουλος, Ι. Μούντζιος, Ε. Σεψάς, Θ. Τέγος

18:30-20:00

Καρκίνος πνεύμονα - Επαναπροσδιορίζοντας τις θεραπευτικές στρατηγικές και διεκδικώντας νέες ευκαιρίες

Προεδρείο: Β. Μπαρμπούνης, Ε. Σαμαντάς

18:30-18:50

Πέρα από την πλατίνη στον μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα. Πώς επαναπροσδιορίζονται οι θεραπευτικές επιλογές και τι προσδοκούμε από τις τρέχουσες κλινικές μελέτες Ω. Φιστέ

18:50-19:10

Ο μεταστατικός ΜΜΚΠ στην εποχή των σύγχρονων στοχευμένων θεραπειών. Από τις κλασσικές στοχευμένες θεραπείες στους συνδυασμούς με ADCs. Κριτική ανάλυση σε εποχή ραγδαίων αλλαγών Θ. Φλώρος

19:10-19:30

Αναζήτηση νέων στόχων και καινοτόμων μηχανισμών σε ανθεκτικό μεταστατικό ΜΜΚΠ. Τι προσδοκίες έχουμε από τις εξατομικευμένες προσεγγίσεις και την τρέχουσα κλινική έρευνα Ι. Μπουκοβίνας

19:30-20:00

Συζήτηση

20:00-21:00

Εξαίρεσιμος ΜΜΚΠ: η διεπιστημονική προσέγγιση στο επίκεντρο με στόχο την επιβίωση

sponsored by  MSD

Προεδρείο: Η. Αθανασιάδης, Μ. Γκάγκα, Κ. Ηλιάδης

20:00-20:30

Κλινικά δεδομένα Ε. Ζέρβας

20:30-21:00

Χειρουργικά δεδομένα Ε. Κεφαλογιάννης



OPDIVO[®] + **YERVOY[®]** *(nivolumab)* *(ipilimumab)*

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που διατίθεται από τον ΚΑΤΟΧΟ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ κατόπιν αιτήσεως


Bristol Myers Squibb[®]

Bristol-Myers Squibb A.E.
 Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική
 ΤΘ 63883 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική
 Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400, Φαξ 210 6074333
 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
 Αναφέρετε **ΟΛΑ** τα φάρμακα
 Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"
 Ελλάδα: <https://www.kitrinakarta.gr>
 Κύπρος: <https://www.kitrinakarta.gov.cy>



13^{ος} χρόνος

MULTIDISCIPLINARY Care Discussions in ONCOLOGY

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

10:30-11:45	Η νέα επιστήμη της Αιματολογίας - Ογκολογίας Προεδρείο: Γ. Καριανάκης, Θ. Τέγος	
10:30-10:45	Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση της θρομβοεμβολικής νόσου σε ασθενείς με καρκίνο	Δ. Βασιλάτου
10:45-11:00	Οι δυνατότητες και οι προοπτικές που διαμορφώνονται για την υγρή βιοψία προς εφαρμογή εξατομικευμένης θεραπείας στην ογκολογία	Α. Κυριαζόγλου
11:00-11:15	Από τον ιστό στην υγρή βιοψία και τη μοριακή ανάλυση. Ποιο είναι το νέο πρόσωπο της παθολογικής ανατομικής στη σύγχρονη εποχή;	Δ. Παπαϊωάννου
11:15-11:45	Συζήτηση	
11:45-13:15	Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα - παθογένεση και θεραπεία Προεδρείο: Ι. Σουγκλάκος, Γ. Τζίμας	
11:45-12:00	Η εισαγωγή της ογκολογίας στη Μεταβολική Δυσλειτουργία - Σχετιζόμενη Στεατοηπατική Νόσο (MASLD): μία από τις κύριες αιτίες του ΗΚΚ	Ι. Κοσκίνας
12:00-12:15	Η ετερογένεια του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος: εξατομικευμένη προσέγγιση για κάθε ασθενή	Γ. Ρηγάκος
12:15-12:30	Επανεκτίμηση του ρόλου της επεμβατικής ακτινολογίας στις ηπατικές κακοήθειες	Λ. Ρέππας
12:30-12:45	Επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής για κάθε ασθενή με ΗΚΚ	Ι. Ελευσινιώτης
12:45-13:15	Συζήτηση - Σχολιασμός: Ι. Μπουκοβίνας	
13:15-14:00	Μεσημβρινή Διακοπή	

06.2024/AKYNZE0/adv 01



 **Akynzeo[®]**

netupitant/palonosetron

Ένα καψάκιο περιέχει 300 mg netupitant και 0,5 mg palonosetron

 **Galenica a.e.**

ΑΘΗΝΑ: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 145 64, τηλ.: 210 5281700
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Χάλκης 8, Πυλαία 555 35, τηλ.: 2310 540478
Επιστημονικό Τμήμα τηλ.: 210 5281731
Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης τηλ.: 210 5281805
www.galenica.gr

 **HELSINN**
Building quality cancer care together

Διανέμεται κατόπιν αδείας της Helsinn Healthcare S.A, Ελβετία

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Περαιτέρω πληροφορίες περιλαμβάνονται στη
συνοπτική Περιγραφή Χαρακτηριστικών Προϊόντος



13^{ος} χρόνος

MULTIDISCIPLINARY Care Discussions in ONCOLOGY

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

14:00-16:00	Γυναικολογικός Καρκίνος Προεδρείο: Γ. Βλάχος, Χ. Παπαδημητρίου, Α. Ροδολάκης	
14:00-14:20	Νεο-επικουρική θεραπεία έναντι πρωτογενούς κυτταρομείωσης στον προχωρημένο καρκίνο: τα αποτελέσματα των μελετών είναι οδηγός αλλαγής στρατηγικής;	Α. Χριστοπούλου
14:20-14:40	Θεραπεία συντήρησης στον καρκίνο ωοθηκών	Α. Βερνάδου
14:40-15:00	Sentinel lymph node biopsy versus pelvic lymphadenectomy in cervical cancer: the PHENIX/SENTIX trial	Β. Σιούλας
15:00-15:20	Αναδυόμενοι βιοδείκτες και θεραπείες στον καρκίνο του ενδομητρίου	Μ. Λιόντος
15:20-15:40	Τοπικά προχωρημένος καρκίνος τραχήλου μήτρας: αλλαγή θεραπευτικού αλγορίθμου	Ε. Λιανός
15:40-16:00	Συζήτηση - Σχολιασμός: Ν. Ακρίβος, Α. Δημόπουλος, Α. Μαργαρίτη, Μ. Σωτηροπούλου, Δ. Χαϊδόπουλος	
16:00-16:30	Καρκίνος Μαστού I Προεδρείο: Φ. Ζαγουρή, Δ. Γροσσομανίδης	
16:00-16:15	Επικουρική ενδοκρινική ορμονοθεραπεία στον πρώιμο καρκίνο μαστού το 2025	Χ. Βέρος
16:15-16:30	Νέες θεραπευτικές δυνατότητες και προβληματισμοί στη θεραπεία του μεταστατικού HER2 positive καρκίνου μαστού	Σ. Λαμπρόπουλος
16:30-17:15	Καρκίνος Μαστού II Προεδρείο: Β. Βενιζέλος, Μ. Τόλια, Χ. Χριστοδούλου Προσαρμογές της μετεγχειρητικής θεραπείας μετά από εισαγωγική θεραπεία:	
16:30-16:45	στον τριπλά αρνητικό • Η θέση του Χειρουργού Μαστού • Η θέση του Παθολόγου Ογκολόγου • Η θέση του Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου	Ι. Γαλανού Κ. Θωμοπούλου Μ. Τριχάς
16:45-17:00	στον HER 2 θετικό • Η θέση του Χειρουργού Μαστού • Η θέση του Παθολόγου Ογκολόγου • Η θέση του Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου	Κ. Χατζόπουλος Μ. Μητσογιάννη Δ. Κατσώχη
17:00-17:15	Συζήτηση - Σχολιασμός: Δ. Γροσσομανίδης, Π. Σκάρλος, Δ. Τρυφωνόπουλος	

**ΟΤΑΝ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΡΕΧΕΙ
ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΟΣ***

**Ενισχύουμε
την Ελπίδα**

**ΤΟ VERZENIOS ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ
CDK4 & 6 ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ EBC ΟΣΟ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ MBC**

EBC υψηλού κινδύνου: Μείωση του κινδύνου υποτροπής και απομακρυσμένων μεταστάσεων σε συνδυασμό με ΕΤ.

MBC: Αύξηση της PFS σε συνδυασμό με AI ή φουλβεστράντη και βελτίωση της OS σε συνδυασμό με φουλβεστράντη, ακόμη και σε εκείνες τις ασθενείς με πτωχή πρόγνωση.

*Ο EBC υψηλού κινδύνου ορίζεται με βάση την παρουσία ασθενών με ≥4 θετικών μασχαλαίους λεμφαδένες ή 1-3 θετικούς μασχαλαίους λεμφαδένες και όγκους ≥5 cm, ιστολογικού βαθμού κακοήθειας 3, ή και τα δύο. MBC υψηλού κινδύνου θεωρήθηκε η παρουσία χαρακτηριστικών της νόσου που θα μπορούσαν να προσδώσουν πτωχότερη πρόγνωση, όπως ηπατικές μεταστάσεις, κατάσταση PgR- και υψηλός βαθμός κακοήθειας του πρωτοπαθούς όγκου, CDK4 & 6=κυκλιν-εξαρτώμενη κινάση 4 και 6, EBC=πρώιμος καρκίνος του μαστού, ΕΤ=ενδοκρινική θεραπεία, HER2=υποδοχέας 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, HR=ορμονικός υποδοχέας, MBC=μεταστατικός καρκίνος του μαστού, PgR=προγεστερινικός υποδοχέας, AI=αναστολέας αρωματάσης, PFS=επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου, OS=συνολική επιβίωση.

1. Verzenios Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 2. Sledge GW Jr et al. JAMA Oncol. 2020;6(1):116-24, 3. Rastogi P et al. J Clin Oncol. 2024. Doi: 10.1200/JCO.23.01994, 4. Johnston S et al. NPJ Breast Cancer. 2019;5(1):5, 5. Ibrance Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 6. Kisqali Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος σκανδρώντας τον κωδικό QR





13^{ος} χρόνος

MULTIDISCIPLINARY Care Discussions in ONCOLOGY

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

17:15-18:20	Καρκίνος Μαστού III Προεδρείο: Ε. Φαλιάκου, Α. Χριστοπούλου, Κ. Τσαμασιώτη	
17:15-17:30	Περιστατικό 1: Χ. Κωνσταντίνου Συζήτηση: Α. Αθανασίου, Α. Βερνάδου, Γ. Παπίας, Κ. Τσαμασιώτη	
17:30-17:45	Περιστατικό 2: Χ. Κωνσταντίνου Συζήτηση: Α. Αθανασίου, Κ. Θωμοπούλου, Εμ. Μαραγκουδάκης, Γ. Παπίας, Χ. Τσιώνου	
17:45-18:00	Περιστατικό 3: Χ. Κωνσταντίνου Συζήτηση: Α. Αθανασίου, Α. Αρδαβάνης, Ι. Γαλανού, Γ. Γαρεφαλάκης, Σ. Δουβετζέμης, Σ. Κοσμίδη, Γ. Παπίας	
18:00-18:10	Εξατομικευμένο screening για καρκίνο του μαστού σε υγιείς γυναίκες	Α. Βούρτση
18:10-18:20	Σχολιασμός: Μ. Αγγελόπουλος, Α. Αθανασίου	
18:20-18:50	Διάλειμμα καφέ	
18:50-19:10	Δορυφορική Διάλεξη Προεδρείο: Η. Αθανασιάδης Επαναπροσδιορίζοντας τη θεραπευτική προσέγγιση στον καρκίνο του μαστού με χαμηλή έκφραση του HER2	<i>sponsored by</i>   Φ. Σταυρίδη
19:10-20:00	Νεότερες εξελίξεις στον ορμονικό χειρισμό του HR+/HER2- μεταστατικού καρκίνου του μαστού Προεδρείο: Ε. Σαλούστρος, Ε. Γαλάνη	<i>sponsored by</i> 
19:10-19:35	Ανασκόπηση των κλινικών δεδομένων	Α. Νικολαΐδη
19:35-20:00	Συζήτηση - Σχολιασμός: Ε. Φούντζηλα	
20:00-21:00	Τελετή Έναρξης Η Ογκολογία είναι μία αναρχική θεολογία της αγάπης Προεδρείο: Η. Αθανασιάδης, Α. Νικολαΐδη	
20:00-20:15	Χαιρετισμοί Ν. Αρκαδόπουλος, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Ε. Σαλούστρος, Πρόεδρος Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας	
20:15-20:30	Εισηγήσεις Ι. Μπουκοβίνας, Γ. Ξηροπαΐδης	
20:30-21:00	Εναρκτήρια Διάλεξη Η ανάγκη για την ένωση των ανθρώπων. Η αναρχική θεολογία της αγάπης του Χρυσόστομου Σταμούλη	Α. Τριαρίδης

ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΑ: ως μονοθεραπεία για ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαθέσιμες τυπικές θεραπείες¹



Επαναπροσδιορίστε την επιβίωση

Η πρώτη στοχευμένη θεραπεία στον mCRC ανεξαρτήτως μεταλλάξεων^{1,3}

Το FRUZAQLA ενδείκνυται:

Το FRUZAQLA ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία του μεταστατικού ορθοκολικού καρκίνου (mCRC) σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαθέσιμες τυπικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της χημειοθεραπείας με βάση την φθοριοπυριμιδίνη, την οξαλιπλατίνη και την ιρινοτεκάνη, παράγοντες anti-VEGF και παράγοντες anti-EGFR, και οι οποίοι έχουν παρουσιάσει πρόοδο νόσου ή είχαν δυσανεξία σε θεραπεία είτε με τριφλουριδίνη/τιπιρασίλη είτε με ρεγοραφενίμη.

Βιβλιογραφικές παραπομπές:

1. FRUZAQLA®. Περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος.
2. Dasari A, Lonardi S, Garcia-Carbonero R, et al; FRESCO-2 Study Investigators. Fruquintinib versus placebo in patients with refractory metastatic colorectal cancer (FRESCO-2): an international, multicentre, randomised, double-blind, phase 3 study. *Lancet*. 2023;402(10395):41-53.
3. Li J, Qin S, Xu R, et al. Effect of fruquintinib vs placebo on overall survival in patients with previously treated metastatic colorectal cancer: the FRESCO randomized clinical trial. *JAMA*. 2018;319(24):2486-2496.

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

FRUZAQLA Tabs, 5 mg/Tab, BT x 21: Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού 5.652,21€
FRUZAQLA Tabs, 1 mg/Tab, BT x 21: Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού 1.420,15€

Ενδεικτική τιμή πώλησης/ασκευασία [με βάση την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τους κανόνες τιμολόγησης και ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους (on patent)].

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ΕΔΩ.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενο ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Κάτοχος άδειας Κυκλοφορίας
Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland
Τοπικός Αντιπρόσωπος Takeda Ελλάς Α.Ε.
Green Plaza, Kifiso B, Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, 151 24 Μαρούσι
Τηλ. κέντρο: 2106387800, Fax: 2106387801, www.takeda.gr

Πριν από τη συνταγογράφηση του
FRUZAQLA, συμβουλευθείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος (Π.Χ.Π.), η οποία είναι
διαθέσιμη μέσω του κώδικα QR.



EXA/GR/FRZ/0006, 01/25



13^{ος} χρόνος

MULTIDISCIPLINARY Care Discussions in ONCOLOGY

Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025

08:30-10:00

Καρκίνος Ορθού - Διεπιστημονικό Ογκολογικό Συμβούλιο

Προεδρείο: Ι. Σουγκλάκος, Κ. Στάμου, Χ. Κοντοβουνήσιος

- Περιστατικό 1: Πρώιμος καρκίνος ορθού, pT1 –
κατευθυντήριες οδηγίες ESD Z. Τσιαμούλος
- Περιστατικό 2: Πρώιμος καρκίνος ορθού –
χαμηλή εντόπιση, διατήρηση σφιγκτήρα Κ. Στάμου
- Περιστατικό 3: Πρώιμος καρκίνος ορθού – MSI high B. Ωραιόπουλος
- Περιστατικό 4: Προχωρημένος καρκίνος ορθού
με ολιγομεταστατική νόσο ήπατος Γ. Λύπας

Συζήτηση - Σχολιασμός: Γ. Αναγνωστόπουλος, Β. Κουλουλίας,
Ι. Μπουκοβίνας, Α. Νταϊλιάνας,
Γ. Πισσάκας, Α. Σιούλας

**Υπεύθυνος Ποιότητας Περιστατικών: Θ. Τέγος*

10:00-10:30

The art and science of colon cancer

Chairs: Z. Saridaki, C. Kontovounisios

From molecular foundations to immunotherapy
in MSI/MSS and next-generation target discovery

D. Papamichail

10:30-11:45

**Gastroesophageal cancer in transition - personalizing therapy
across the treatment spectrum**

Chairs: I. Sougklakos, I. Boukovinas

10:30-10:55

The emerging landscape of perioperative therapies in gastric
and gastroesophageal cancer: opportunities for personalized
approaches and open questions in clinical research

F. Lordick

10:55-11:20

From HER2 to claudin and beyond: translating biomarkers
into precision treatment for gastroesophageal
adenocarcinoma

R. Obermannová

11:20-11:45

Discussion

11:45-12:00

Διάλειμμα καφέ



Ogivri[®]

(trastuzumab)

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

Λ.Τ. σύμφωνα με το Δ.Τ. 12/2023*

OGIVRI 150MG BTx1VIAL: 322,59 €

OGIVRI 420MG BTx1VIAL: 995,36 €

*Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου δελτίου τιμών, θα ισχύουν οι νεότερες τιμές.



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σαρώνοντας τον QR κωδικό.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:
BIOSIMILAR COLLABORATIONS
IRELAND LIMITED, IRELAND
Unit 35/36, Grange Parade, Baldoyle
Industrial Estate, Dublin 13, Ireland D13
R20R

Τοπ. Αντιπρ. Ελλάδας:
BIOCON BIOLOGICS GREECE
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., ΕΛΛΑΔΑ
Λεωφόρος Κηφισίας 280, 15232 Χαλάνδρι,
Αθήνα, Ελλάδα.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Προωθείται από την εταιρεία:

DEMO ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21^ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας, Κρυονέρι 145 68, Αττική
t +30 210 81 61 802, f +30 210 81 61 587, info@demo.gr
www.demo.gr



13^{ος} χρόνος

MULTIDISCIPLINARY Care Discussions in ONCOLOGY

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

12:00-13:15	Surgical advances and non-operative management in gastrointestinal and related malignancies - Part I Chairs: G. Sotiropoulos, V. Kontogeorgakos, D. Papamichail	
12:00-12:15	Non-operative management of MMR-D gastrointestinal cancers	S. Yalcin
12:15-12:30	Surgical frontiers in advanced rectal cancer: from precision resection to pelvic exenteration	C. Kontovounisios
12:30-12:45	Chasing hope in oligometastatic pancreatic adenocarcinoma: utilizing surgical resection	G. Tsiotos
12:45-13:00	Emerging hope from comprehensive molecular analysis in pancreatic cancer	A. Digklia
13:00-13:15	Discussion	
13:15-14:30	Surgical advances and non-operative management in gastrointestinal and related malignancies - Part II Chairs: D. Linos, P. Papagelopoulos, Ch. Christodoulou	
13:15-13:30	Soft tissue sarcomas of the retroperitoneum: redefining surgical standards and multidisciplinary care	D. Tzanis
13:30-13:45	From cytoreduction to comprehensive care: evolving multimodality therapy in peritoneal tumors	K. Stamou
13:45-14:00	New standards in the comprehensive management of NETs - a surgical initiative	G. Tzimas
14:00-14:15	The evolution of surgery in gynecologic malignancies: from radicality to precision and innovation	V. Sioulas
14:15-14:30	Discussion	
14:30-15:30	Μεσημβρινή Διακοπή - Ελαφρύ Γεύμα	
15:30-16:30	Harnessing immunotherapy in curative-intent treatment of head and neck cancer Chairs: A. Psyrri, M. Tolia	
15:30-15:50	Immunotherapy in the management of locoregional head and neck cancer with curative intent	P. Oikonomopoulou
15:50-16:10	Surgical management of HPV (+) oropharyngeal carcinoma: the rise of minimally invasive and robotic surgical approaches	E. Kyrodimos
16:10-16:30	Discussion	

Fentanyl/Sandoz

Fentanyl citrate



Το μέγεθος των δισκίων που απεικονίζονται δεν είναι πραγματικό.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ειδική ιατρική συνταγή του Ν 3459/06 περί ναρκωτικών (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ).
FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 100MCG/TAB BTx30x1 Λ.Τ.: 88,01 €, FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 200MCG/TAB BTx30x1 Λ.Τ.: 92,73 €,
FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 300MCG/TAB BTx30x1 Λ.Τ.: 103,20 €, FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 400MCG/TAB BTx30x1 Λ.Τ.: 103,20 €



Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας τον παρακάτω σύνδεσμο.
Η έντυπη μορφή της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος είναι επίσης διαθέσιμη από την εταιρεία Lavipharm Hellas A.E., τηλ.: 210 6691 000, e-mail: SafetyGreece@lavipharm.com

FENT/SAND/poster/LAV/02.2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΩΤΩΗΣΗΣ

Lavipharm Hellas A.E.
Οδός Αγίας Μαρίας, 190 02 Παιανία Αττικής
Τηλ.: 210 6691 000
www.lavipharm.com

SANDOZ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Sandoz Pharmaceuticals d.d., Veronškova
ulica 57, SI-1000 Ljubljana, Σλοβενία.

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Φραγκοκκλησιάς 7B, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: +30 216 600 5000





13^{ος} χρόνος

MULTIDISCIPLINARY Care Discussions in ONCOLOGY

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

16:30-17:30	Neuroendocrine tumors Chairs: C. Kalofonos, G. Samonis	
16:30-16:50	Neuroendocrine tumors in 2025: new data, emerging science and future directions	C. Toumpanakis
16:50-17:10	The transformative power of nuclear medicine in the oncologic landscape: challenges and opportunities	T. Pipikos
17:10-17:30	Discussion	
17:30-17:45	Διάλειμμα καφέ	
17:45-18:45	What is new and exciting in the world of oncology, in 2025? Chairs: V. Georgoulis, C. Kalofonos, A. Kontogiannis	
17:45-18:00	Unraveling the biology of cancer: seeking opportunities for novel therapies	I. Sougklakos
18:00-18:15	Germline testing and implications in gastrointestinal malignancies	F. Fostira
18:15-18:30	From a disease called X to tumor-agnostic therapies	I. Boukovinas
18:30-18:45	Discussion	
18:45-19:45	Από την IL-2 στο νέο κεφάλαιο της ανοσοθεραπείας Προεδρείο: Ε. Γκόγκα, Δ. Μπαφαλούκος, Μ. Νικολάου	
18:45-19:00	Εξατομικευμένα εμβόλια ανοσοθεραπείας και θεραπείες με κατευθυνόμενα T-λεμφοκύτταρα	Α. Δίγκλια
19:00-19:15	Στόχευση του μικροπεριβάλλοντος του όγκου: το μοντέλο της ανοσορρύθμισης στα σαρκώματα	Α. Κυριαζόγλου
19:15-19:30	Αντιμετώπιση προχωρημένου μελανώματος με εξατομικευμένες εφαρμογές ανοσοθεραπείας	Δ. Ζιώγας
19:30-19:45	Συζήτηση	
19:45-20:15	Ανοιχτή Συζήτηση Προεδρείο: Ο.Ι. Ζώρας, Α. Παπαλόης, Η. Αθανασιάδης Θέματα: • Η είσοδος των ανταγωνιστών GLP-1 στην Ογκολογία • Η ιατρική εκπαίδευση στην Ελλάδα του 2025 Εισηγητής: Γ. Χρούσος Συζήτηση: Α. Δίγκλια, Ι. Μπουκοβίνας, Ι. Σουγκλάκος, Δ. Τζανής, Χ. Τουμπανάκης	
20:15-20:30	Συμπεράσματα - Λήξη Εργασιών Συνεδρίου Προεδρείο: Η. Αθανασιάδης, Α. Νικολαΐδη	

innohep®

tinzaparin sodium



Χορηγείται με ιατρική συνταγή.
Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες επικοινωνήστε
με την LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

Για το ισχύον δελτίο τιμών
των φαρμάκων της LEO Pharma
σκανάρετε εδώ



LEO Pharmaceutical Hellas S.A.
Παπανικολή 22Α, 15232, Χαλάνδρι
Τηλ: 212 222 5000
contact@leo-pharma.com
ap.FEMH 117058301000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Advancing the care of
patients with thrombosis

© LEO Pharma copyright - GR_inn_adv_Nov_2024- MAT-71106.
All LEO Pharma trademarks mentioned belong to the LEO Pharma Group.



13^{OS} χρόνος

MULTIDISCIPLINARY Care Discussions in ONCOLOGY

Ομιλητές - Πρόεδροι - Σχολιαστές

D

Digklia Antonia

MD, MSc, Medical Oncologist, Department of Medical Oncology, Lausanne University Hospital, Switzerland

L

Lordick Florian

Professor of Oncology, Director of the University Cancer Center Leipzig, Germany

O

Obermannová Radka

Associate Professor, Head of Clinical Trials Unit and Early Phase Clinical Trials Unit, Senior Consultant, Head of Oesophagogastric Tract Tumours Program, Department of Comprehensive Cancer Care and Faculty of Medicine, Masaryk University, Masaryk Memorial Cancer Institute

P

Papamichael Demetris

MB, BS, MD, FRCP, Consultant Medical Oncologist, Bank of Cyprus Oncology Centre

T

Toumpanakis Christos

MD, PhD, FRCP, AGAF, FEBGH, Professor of Gastroenterology & Neuroendocrine Tumours, Division of Medicine, Institute of Liver & Digestive Health, University College of London (UCL), Centre for Gastroenterology, Neuroendocrine Tumour Unit, ENETS Centre of Excellence, Royal Free Hospital, London

Tzanis Dimitrios

MD, PhD, Surgical Oncologist, Institut Curie, Paris University, Paris, France

Y

Yalcin Suayib

Professor, Department of Medical Oncology, Hacettepe University, Ankara, Turkey

A

Αγγελόπουλος Μιχαήλ

MD, PhD, Ακτινοδιαγνώστης, Ειδικός Ιατρός Μαστού, Κέντρο Απεικόνισης Μαστού-Γυναικάς, Αθήνα

Αθανασιάδης Ηλίας

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Μητέρα», Επίκουρος Καθηγητής Ογκολογίας, Northwestern University, Η.Π.Α.

Αθανασίου Αλεξάνδρα

MD, MSc, Διευθύντρια Τμήματος Απεικόνισης Μαστού, Νοσοκομείο «Μητέρα», EUSOBI Executive Board

Ακρίβος Νικόλαος

RCOG/ESGO, Γυναικολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Γ' Κλινικής Γυναικολογικής Ογκολογίας, Νοσοκομείο «Υγεία», Διδάκτωρ Γυναικολογικής Ογκολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Αναγνωστόπουλος Γεώργιος

Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Μητέρα»

Αρδαβάνης Αλέξανδρος

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής-Επιστημονικός Υπεύθυνος, Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

B

Βασιλάτου Διαμαντίνα

Αιματολόγος, Δ' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Υγεία»

Βενιζέλος Βασίλειος

Χειρουργός Μαστού MD, MPhil (UK), FACS, Av. Καθηγητής, University of Nicosia, Διευθυντής Πιστοποιημένης Μονάδας Μαστού (EUSOMA), Metropolitan Hospital, Πρόεδρος Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού (EXEM)



SHE IS RESILIENT
SHE IS READY
SHE IS HERE

Το ELAHERE ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με θετικό στον υποδοχέα άλφα του φολικού οξέος (FRα), ανθεκτικό στην πλατίνη, υψηλής κακοήθειας, ορώδη επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών, καρκίνο των σαλπίγγων ή πρωτοπαθή καρκίνο του περιτοναίου που έχουν λάβει ένα έως τρία προηγούμενα συστηματικά θεραπευτικά σχήματα.^{1,2}

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

1. ELAHERE®. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 11/2024.
2. Moore KN, Angelergues A, Konecny GE, et al. Mirvetuximab soravtansine in FRa-positive, platinum-resistant ovarian cancer. N Engl J Med. 2023;389(23):2162-2174. doi:10.1056/NEJMoa2309169.

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιασδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλέπε παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

ELAHERE C/S.SOL.IN 5MG/ML 1 VIAL (GLASS) X 20ML
Π.Λ.Τ: 3.221,74 €



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος [πατήστε εδώ](#), ή σκανάρετε το QR code.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Τηλ.: 214 4165555 • greekmedinfo@abbvie.com

abbvie



13^{ος} χρόνος

MULTIDISCIPLINARY Care Discussions in ONCOLOGY

Ομιλήτες – Πρόεδροι
Σχολιαστές

Βερνάδου Αναστασία

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Γ' Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Υγεία»

Βέρος Χρήστος

MD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Τμήμα Γενετικής Ογκολογίας, Νοσοκομείο «Υγεία»

Βλάχος Γεώργιος

Ομότιμος Καθηγητής Γυναικολογικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Βούρτση Αθηνά

Ειδική Ακτινοδιαγνώστρια Μαστού, MD, PhD, Διαγνωστική Μαστογραφία, Αθήνα, Ιδρυτική Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Απεικόνισης Μαστού, Ευρωπαϊκή Σύνοδος και Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του DenseBreast

Γαλάνη Ελένη

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια στη Β' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital

Γ

Γαλανού Ιωάννα

Χειρουργός Μαστού, Διευθύντρια ΣΤ' Κλινικής Μαστού, Νοσοκομείο «Μητέρα», Κέντρο Επανορθωτικής, Ενδοσκοπικής & Ρομποτικής Χειρουργικής Μαστού

Γαρεφαλάκης Γεώργιος

MD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτης Β' Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Μητέρα»

Γεωργακόπουλος Ιωάννης

Επ. Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, «Αρεταίειο» Νοσοκομείο

Γεωργούλιας Βασίλειος

Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

Γκάγκα Μίνα

Πνευμονολόγος, Διευθύντρια Α' Πνευμονολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Υγεία»

Γκόγκα Έλενα

Παθολόγος Ογκολόγος, Καθηγήτρια Παθολογίας Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Α' Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Λαϊκό»

Γκότσης Ευθύμιος

MD, MSc, PhDc, Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Ογκολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Ταγματάρχης (ΥΚ) ε.α, Κλινικός Διαιτολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος PhoenixCancerCare

Γροσσομανίδης Δημήτριος

MD, Χειρουργός Μαστού, Διευθυντής Δ' Κλινικής Μαστού, Νοσοκομείο «Μητέρα»

Δ

Δημητριάδου Αρετή

Ειδικός Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Δημόπουλος Αθανάσιος

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος Διευθυντής-Συντονιστής Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Metropolitan Hospital, Venia Docendi Πανεπιστημίου Βιέννης, FMR ESTRO Faculty Member

Δουβετζέμης Στέργιος

MD, PhD, FRCS, FEBS, CEBS, Χειρουργός Μαστού, Διευθυντής Δ' Κλινικής Μαστού, Metropolitan General, Senior Lecturer, School of Medicine, King's College London, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής, UNIC Athens

Ε

Ελευσινιώτης Ιωάννης

Καθηγητής Παθολογίας & Ηπατολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Ζ

Ζαγουρή Φλώρα

Παθολόγος Ογκολόγος, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, «Αρεταίειο» Νοσοκομείο

Ζακοπούλου Ρουμπίνη

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

From transformative medicines that take on the toughest challenges,
to biosimilar and supportive care outcome-enabling solutions we' re

ADVANCING ALL ANGLES OF CARE

AMGEN

Oncology

ONCE-DAILY ORAL

LUMYKRAS[®]
(sotorasib) 240 mg tablets



Τρόπος διάθεσης:
Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής. Το προϊόν δεν είναι τιμολογημένο στην Ελλάδα, αναφέρεται προτεινόμενη τιμή 5.828 €

XGEVA[®]
(denosumab) injection
120 mg/1.7 mL vial



Τρόπος διάθεσης:
Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και / ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση
Λ.Τ.: XGEVA INJ.SOL
120MG/1,7ML (70MG/ML)
BTx1VIAL: 277,08 €

Vectibix[®]
(panitumumab)
100mg/5ml | 20mg/ml for injection



Τρόπος διάθεσης:
Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία
Λ.Τ.: VECTIBIX C/S.SOL.IN
100MG/5ML VIAL BT x 1 VIAL x 5 ML: 344,47 €
VECTIBIX C/S.SOL.IN
400MG/20ML VIAL BT x 1 VIAL x 20 ML: 1.307,65 €

MVASI[®]
(bevacizumab)
Injection 100mg/vial & 400mg/vial



Τρόπος διάθεσης:
Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία
Λ.Τ.: MVASI C/S.SOL.IN 25MG/ML
1 VIAL x 16ML: 714,67 €
MVASI C/S.SOL.IN 25MG/ML
1 VIAL x 4ML: 215,07 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα
αναφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
(ΕΟΦ) Τηλ: +30 2132040337, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας διαδραστική και στην
ιστοσελίδα του ΕΟΦ: www.eof.gr, www.kitrikarta.gr να είναι στη ηλεκτρονική υποβολή
ή εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ: +30 2103447000

GRC-511-0225-80001

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε
τις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των
Προϊόντων, σκανάροντας τα QR codes.

AMGEN HELLAS ΕΠΕ

Αγ. Κωνσταντίνου 59-61

Green Plaza, κτίριο Γ, 15 124 Μαρούσι

Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050

Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr



13^{ος} χρόνος

MULTIDISCIPLINARY Care Discussions in ONCOLOGY

Ομιλήτες – Πρόεδροι
Σχολιαστές

Ζέρβας Ελευθέριος

Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος,
Συντονιστής Διευθυντής 7^{ης}
Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Ν.Θ.Α.
«Η Σωτηρία», Ταμίας Ε.Π.Ε.

Ζιώγας Δημήτριος

Παθολόγος Ογκολόγος, Πανεπιστημιακός
Υπότροφος, Επιστημονικός Συνεργάτης Α'
Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Λαϊκό»

Ζύλης Δημοσθένης

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος,
Β' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο
«Μητέρα»

Ζώρας Οδυσσέας-Ιωάννης

Ομ. Καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας
(PhD hons), Αντεπιστέλλον Μέλος
της Ακαδημίας Αθηνών, Πρύτανης
Πανεπιστημίου Keele Greece

Η

Ηλιάδης Κοσμάς

Χειρουργός Θώρακος, Διευθυντής
Θωρακοχειρουργικής Κλινικής,
Νοσοκομείο «Υγεία»

Θ

Θωμοπούλου Κωνσταντίνα

Παθολόγος-Ογκολόγος, Συνεργάτης Ε'
Παθολογικής-Ογκολογικής Κλινικής,
Νοσοκομείο «Υγεία»

Κ

Καλόφωνος Χαράλαμπος

Παθολόγος Ογκολόγος, Ομότιμος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών,
Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος,
Ολύμπιο Θεραπευτήριο, Πάτρα

Καριανάκης Γεώργιος

Αιματολόγος, Διευθυντής Αιματολογικής
Κλινικής, Νοσοκομείο «Υγεία»

Κατσώχη Δέσποινα

MD, PhD, Ογκολόγος Ακτινοθεραπευτής,
Νοσοκομείο «Υγεία», Διδάκτωρ
Πανεπιστημίου RWTH Aachen Γερμανίας,
Πρόεδρος ΑΚΟΣ

Κεφαλογιάννης Εμμανουήλ

Αναπληρωτής Καθηγητής
Θωρακοχειρουργικής, Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής
Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.
Ηρακλείου

Κοντοβουνήσιος Χρήστος

Γενικός Χειρουργός, Νοσοκομείο «Υγεία»

Κοντογεωργάκος Βασίλειος

Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Καθηγητής
Ορθοπαιδικής, Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Αθηνών

Κοντογιάννης Απόστολος

Πρόεδρος Histiocytosis Hellas & Histio U.K.

Κοσκίνας Ιωάννης

Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας-
Ηπατολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Κοσμίδη Σοφία

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος,
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Κέντρου
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας,
Νοσοκομείο «Υγεία»

Κοσμίδης Πάρις

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Β'
Παθολογικής-Ογκολογικής Κλινικής,
Νοσοκομείου «Υγεία»

Κουλουλίας Βασίλειος

Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ,
Διευθυντής Εργαστηρίου Κλινικής
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Κυριαζόγλου Αναστάσιος

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογικής
Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Β'
Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

IBRANCE (palbociclib)
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΙΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ 75 mg, 100 mg και 125 mg

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Υπερευαίσθηση στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Χρήση σκευασμάτων που περιέχουν υπερικό/βαλσαμόχορτο (St. John's Wort).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Προ/περιεμμηνοπαυσιακές γυναίκες: Όταν το IBRANCE χορηγείται σε προ/περιεμμηνοπαυσιακές γυναίκες σε συνδυασμό με αναστολέα αρωματάσης, είναι υποχρεωτική η ωοθηκτομή ή η καταστολή της λειτουργίας των ωοθίων με χορήγηση αγωνιστή LH/HR, λόγω του μηχανισμού δράσης των αναστολέων της αρωματάσης. Ο συνδυασμός του palbociclib με τη φουλβεστράντη σε προ/περιεμμηνοπαυσιακές γυναίκες έχει μελετηθεί μόνο σε συνδυασμό με ένα αγωνιστή LH/HR. Κρίσιμη απλάγχχνική νόσος: Η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του palbociclib δεν έχουν μελετηθεί σε ασθενείς με κρίσιμη απλάγχχνική νόσο. Αιματολογικές διαταραχές: Για ασθενείς που εμφανίζουν ουδετεροπενία Βαθμού 3 ή 4 συνιστάται διακοπή της δόσης, μείωση της δόσης ή καθυστέρηση στην έναρξη των κύκλων της θεραπείας. Θα πρέπει να διεξάγεται κατάλληλη παρακολούθηση (βλ. παράγραφο «ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ»). Διάμεση πνευμονοπάθεια/πνευμονιτίδα: Μπορεί να παρουσιαστεί βαριά μορφή, απειλητική για τη ζωή ή θανατηφόρα ILD ή/και πνευμονιτίδα σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με IBRANCE, όταν λαμβάνεται σε συνδυασμό με ενδοκρινική θεραπεία. Σε κλινικές μελέτες (PALOMA-1, PALOMA-2, PALOMA-3), το 1,4% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με το IBRANCE παρουσίασε ILD/πνευμονιτίδα οποιουδήποτε βαθμού, 0,1% παρουσίασε βαθμού 3, ενώ δεν αναφέρθηκαν περιπτώσεις βαθμού 4 ή θανατηφόρες περιπτώσεις. Επιπλέον περιπτώσεις ILD/πνευμονιτίδας έχουν παρατηρηθεί μετά την κυκλοφορία στην αγορά, με την αναφορά θανατηφόρων περιστατικών (βλ. παράγραφο «ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ»). Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για πνευμονικά συμπτώματα ενδεικτικά ILD/πνευμονιτίδας (π.χ. υποξία, βήχας, δύσπνοια). Σε ασθενείς που παρουσιάζουν νέα ή επιδεινούμενα αναπνευστικά συμπτώματα και υπάρχει η υποψία ανάπτυξης ILD/πνευμονιτίδας, το IBRANCE θα πρέπει να διακοπεί αμέσως και ο ασθενής θα πρέπει να αξιολογείται. Το IBRANCE θα πρέπει να διακόπτεται οριστικά σε ασθενείς με βαριά μορφή ILD ή πνευμονιτίδα. Λοιμώξεις: Καθώς το IBRANCE έχει μυελοκατασταλτικές ιδιότητες, μπορεί να προδιαθέσει τους ασθενείς για λοιμώξεις. Λοιμώξεις έχουν αναφερθεί σε υψηλότερο ποσοστό σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με το IBRANCE σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες σε σύγκριση με ασθενείς που έλαβαν θεραπεία στο αντίστοιχο σκέλος σύγκρισης. Λοιμώξεις Βαθμού 3 και Βαθμού 4 εμφανίστηκαν αντίστοιχα στο 5,6% και το 0,9% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με το IBRANCE σε οποιονδήποτε συνδυασμό (βλ. παράγραφο «ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ»). Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για σημεία και συμπτώματα λοίμωξης και τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις ιατρικές ενδείξεις. Οι γιατροί θα πρέπει να ενημερώνουν τους ασθενείς ώστε να αναφέρουν αμέσως οποιαδήποτε επεισόδια πυρετού. Φλεβική θρομβοεμβολή: Συμβαίνει φλεβική θρομβοεμβολή αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με το IBRANCE (βλ. παράγραφο «ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ»). Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για σημεία και συμπτώματα εν των βάθι φλεβικής θρόμβωσης και πνευμονικής εμβολής και να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις ιατρικές ενδείξεις. Ηπατική δυσλειτουργία: Το IBRANCE θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, υπό στενή παρακολούθηση για σημεία τοξικότητας. Νεφρική δυσλειτουργία: Το IBRANCE θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία, υπό στενή παρακολούθηση για σημεία τοξικότητας. Ταυτόχρονη θεραπεία με αναστολείς ή επαγωγείς του CYP3A4: Οι ισχυροί αναστολείς του CYP3A4 μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένη τοξικότητα. Θα πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χρήση ισχυρών αναστολέων του CYP3A κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το palbociclib. Το ενδεχόμενο συγχρόνησης θα πρέπει να εξετάζεται μόνο μετά από προσεκτική αξιολόγηση των δυνητικών οφελών και κινδύνων. Εάν η συγχρόνηση με ισχυρό αναστολέα του CYP3A δεν μπορεί να αποφευχθεί, μειώστε τη δόση του IBRANCE στα 75 mg μία φορά την ημέρα. Όταν διακοπεί ο ισχυρός αναστολέας, η δόση του IBRANCE θα πρέπει να αυξάνεται (μετά από 3 – 5 ημεριόδοτες ζωής του αναστολέα) έως τη δόση που χρησιμοποιείτο πριν την έναρξη του ισχυρού αναστολέα του CYP3A. Η συγχρόνηση επαγωγών του CYP3A μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη έκθεση στο palbociclib και κατά συνέπεια σε κίνδυνο έλλειψης αποτελεσματικότητας. Συνεπώς, η ταυτόχρονη χρήση του palbociclib με ισχυρού επαγωγείς του CYP3A4 θα πρέπει να αποφεύγεται. Δεν απαιτείται καμία προσαρμογή της δόσης για τη συγχρόνηση του palbociclib με μέτριους επαγωγείς του CYP3A. Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία ή οι σύντροφοί τους: Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία ή οι άνδρες σύντροφοί τους πρέπει να χρησιμοποιούν μία μέθοδο αντισύλληψης υψηλής αποτελεσματικότητας ενώ παίρνουν το IBRANCE. **ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Περίληψη του προφίλ ασφάλειας:** Το συνολικό προφίλ ασφάλειας του IBRANCE βασίζεται σε συγκεντρωτικά δεδομένα από 872 ασθενείς που έλαβαν palbociclib σε συνδυασμό με ενδοκρινική θεραπεία (N = 527 σε συνδυασμό με λετροζόλη και N = 345 σε συνδυασμό με φουβεστράντη) σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες σε HR-θετικό, HER2-αρνητικό προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνιο του μαστού. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 20%) οποιουδήποτε Βαθμού που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν palbociclib σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ήταν ουδετεροπενία, λοιμώξεις, λευκοπενία, κόπωση, ναυτία, στοματίτιδα, αναιμία, διάρροια, άλγος και θρομβοπενία. Οι πιο συχνές (≥ 20%) ανεπιθύμητες ενέργειες Βαθμού ≥ 3 του palbociclib ήταν ουδετεροπενία, λευκοπενία, λοιμώξεις, αναιμία, αυξημένη ασπартική αμινοτρανσφεράση (AST), κόπωση και αυξημένη αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT). Μειώσεις της δόσης ή τροποποιήσεις της δόσης λόγω οποιασδήποτε ανεπιθύμητης ενέργειας αναφέρθηκαν στο 38,4% των ασθενών που έλαβαν το IBRANCE σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ανεξαρτήτως συνδυασμού. Οριστική διακοπή λόγω ανεπιθύμητης ενέργειας αναφέρθηκε στο 5,2% των ασθενών που έλαβαν το IBRANCE σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ανεξαρτήτως συνδυασμού. Παρακάτω αναφέρονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες από το συγκεντρωτικό σύνολο δεδομένων 3 τυχαιοποιημένων μελετών. Η διάμεση διάρκεια της θεραπείας με palbociclib στο συγκεντρωτικό σύνολο δεδομένων κατά την τελική ανάλυση της συνολικής επιβίωσης (OS) ήταν 14,8 μήνες. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται ανά κατηγορία συχνότητας. Οι κατηγορίες συχνότητας ορίζονται ως ακολούθως: πολύ συχνές: ≥ 1/10, συχνές: ≥ 1/100 έως < 1/10, και όχι συχνές: < 1/1000 έως < 1/100). **Προτιμώμενος όρος* (PT)** Πολύ συχνές: Λοιμώξεις[§], ουδετεροπενία[§], λευκοπενία[§], αναιμία[§], θρομβοπενία[§], μειωμένη όρεξη, στοματίτιδα[§], ναυτία, διάρροια, έμετος, εξάνθημα[§], άλγος, ηροδερμία, κόπωση, εξασθένιση, πυρετός, ALT αυξημένη, Συχνές: Εμπύρετη ουδετεροπενία, δυσανεμία, όραση θαμπή, δακρύρροια αυξημένη, Ερροφθαλμία, φλεβική θρομβοεμβολή, επιτίσση, ILD/πνευμονιτίδα[§], σύνδρομο παλαμο-πτεματίας ερροδερμοαυαίσθησης, κρεατινίνη αίματος αυξημένη, Όχι συχνές: Δερματικός ερροθηματώδης λύκος, πολύμορφο ερροθήμα. ALT= αμινοτρανσφεράση της αλανίνης, AST= ασπартική αμινοτρανσφεράση, ILD=διάμεση πνευμονοπάθεια, N/n = αριθμός ασθενών. N/A=δεν εφαρροζεται. [§] Οι PT αναρροφούνται σύμφωνα με το MedDRA 17.1. [¶] Οι λοιμώξεις περιλαμβάνουν όλους τους PT που αποτελούν μέρος της Κατηγορίας Οργανισμού Συστήματος «Λοιμώξεις και παρασυστίσεις». [†] Η ουδετεροπενία περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Ουδετεροπενία, Αριθμός ουδετεροφίλων μειωμένος. [‡] Η λευκοπενία περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Λευκοπενία, Αριθμός λευκοκυττάρων μειωμένος. [§] Η αναιμία περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Αναιμία, Αιμοσφαιρίνη μειωμένη, Αιματοκρίτης μειωμένος. ^{||} Η θρομβοπενία περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Θρομβοπενία, Αριθμός αιμοπεταλίων μειωμένος. [¶] Η στοματίτιδα περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Αφώδης στοματίτιδα, Χειλίτιδα, Γλωσσίτιδα, Γλωσσόδυνα, Εξέλιξη του στόματος, Φλεγμονή βλεννογόνου, Άλγος του στόματος, Στοματοφαρυγγική δυσφορία, Στοματοφαρυγγικό άλγος, Στοματίτιδα. ^{††} Το εξάνθημα περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Εξάνθημα, Κηλιδωοπατώδης εξάνθημα, Κνησμοώδης εξάνθημα, Ερροθηματώδης εξάνθημα, Βλατιδώδης εξάνθημα, Δερματίτιδα, Δερματίτιδα ομοιόζουσα με ακμή, Τοξικό εξάνθημα δερματος. ^{‡‡} Η ILD/πνευμονιτίδα περιλαμβάνει κάθε αναφερόμενο PT που αποτελεί μέρος του Τυποποιημένου Ερωτήματος MedDRA για τη διάμεση πνευμονοπάθεια (με τη στενή έννοια). ^{§§} Η φλεβική θρομβοεμβολή περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: πνευμονική εμβολή, εμβολή, εν των βάθι φλεβική θρόμβωση, περιφερικός εμβολισμός, θρόμβωση.

Στον παρακάτω Πίνακα αναφέρονται οι εργαστηριακές παθολογικές τιμές που παρατηρήθηκαν σε συγκεντρωτικό σύνολο δεδομένων 3 τυχαιοποιημένων μελετών (N = 872).

Εργαστηριακές παθολογικές τιμές	IBRANCE συν Λετροζόλη ή φουβεστράντη			Σκέλη συγκριτικού παράγοντα*		
	Κάθε Βαθμού 3	Βαθμού 3 %	Βαθμού 4 %	Κάθε Βαθμού 3	Βαθμού 3 %	Βαθμού 4 %
WBC μειωμένα	97,4	41,8	1,0	26,2	0,2	0,2
Ουδετερόφιλα μειωμένα	95,6	57,5	1,7	17,0	0,9	0,6
Κρεατινίνη αίματος αυξημένη	95,5	1,6	0,3	86,8	0,0	0,0
Αναιμία	80,1	5,6	Δ/1	42,1	2,3	Δ/1
Αιμοπεταλία μειωμένα	65,2	1,8	0,5	13,2	0,2	0,0
AST αυξημένη	55,5	3,9	0,0	43,3	2,1	0,0
ALT αυξημένη	46,1	2,5	0,1	33,2	0,4	0,0

WBC=λευκά αιμοσφαίρια, AST=ασπартική αμινοτρανσφεράση, ALT=αμινοτρανσφεράση της αλανίνης, N=αριθμός ασθενών, Δ/1=δεν ισχύει. Σημείωση: Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων Βαθμολογούνται ανάλογα με τον Βαθμό βαρύτητας της έκδοσης 4.0 των NCI CTCAE. * Λετροζόλη ή φουβεστράντη. **Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών.** Συνολικά, ουδετεροπενία οποιουδήποτε Βαθμού αναφέρθηκε σε 716 (82,1%) ασθενείς που έλαβαν IBRANCE ανεξαρτήτως συνδυασμού, με ουδετεροπενία Βαθμού 3 να έχει αναφερθεί σε 500 (57,3%) ασθενείς και ουδετεροπενία Βαθμού 4 να έχει αναφερθεί σε 97 (11,1%) ασθενείς. Ο διάμεσος χρόνος μέχρι το πρώτο επεισόδιο ουδετεροπενίας οποιουδήποτε Βαθμού ήταν 15 ημέρες (12-700 ημέρες) και η διάμεση διάρκεια της ουδετεροπενίας Βαθμού ≥ 3 στις 3 τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ήταν 7 ημέρες. Εμπύρετη ουδετεροπενία αναφέρθηκε στο 0,9% των ασθενών που έλαβαν IBRANCE σε συνδυασμό με φουβεστράντη και στο 1,7% των ασθενών που έλαβαν palbociclib σε συνδυασμό με λετροζόλη. Εμπύρετη ουδετεροπενία αναφέρθηκε σε περίπου 2% των ασθενών που εκτέθηκαν στο IBRANCE κατά τη διάρκεια του συνολικού κλινικού προγράμματος. **Παθολογικές πτηνίσεις:** Το palbociclib, σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, έχει αξιολογηθεί σε 79 παιδιατρικούς ασθενείς με συμπτωτικές όγκους, συμπεριλαμβανομένου του υποτροπιάζοντος ή ανθεκτικού σαρκώματος του Ewing (EWS) στη μελέτη A5481092. Το προφίλ ασφάλειας του palbociclib σε αυτόν τον παιδιατρικό πληθυσμό ήταν συνεπές με το γνωστό προφίλ ασφάλειας στον πληθυσμό ενηλίκων. **Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών.** Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενο ανεπιθύμητο ενεργείες μέσω: **Ελλάδα:** Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 3204037, Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitirinkarta.gr>. **Κύπρος:** Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Τηλ: +357 22608607, Φαξ: + 357 22608669, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Βέλγιο. **ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:** Pfizer Ελλάς Α.Ε., Α. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα, Τηλ.: +30 210 6785800. **ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:** Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch), Λεωφόρος Αθαλάσσης 26, Κτήριο Στεφανή, 2^{ος} Ορόφος, 2018 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22 817690. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** EU/1/16/1147/010, 012, 014. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 10/2024. **75 MG BT Χ 21 TABS, 100 MG BT Χ 21 TABS, 125 MG BT Χ 21 TABS: ΑΙΛΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ - ΕΛΛΑΔΑ:** Α.Τ.: 2.278,31 €, Ν.Τ.: 1.876,22 €. **ΑΙΛΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ - ΚΥΠΡΟΣ:** Α.Τ.: 2.501,69 €, Ν.Τ.: 2.021,69 €. **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής. **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:** Με ιατρική συνταγή. **ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΙΤΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ.**



13^{ος} χρόνος

MULTIDISCIPLINARY Care Discussions in ONCOLOGY

Ομιλήτες – Πρόεδροι
Σχολιαστές

Κυροδήμος Ευθύμιος

Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου, Αναπληρωτής Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Κωνσταντίνου Χλόη

MD, PhD, Ογκοπλαστικός Χειρουργός Μαστού, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Κέντρου Μαστού, Νοσοκομείο «Υγεία», Consultant Oncoplastic Breast Surgeon, Kingston NHS Foundation Trust, Honorary Consultant Breast Surgeon, Royal Marsden Hospital Foundation Trust, London

Λ

Λαμπρόπουλος Στέφανος

Παθολόγος Ογκολόγος, Αν. Διευθυντής Γ' Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Υγεία»

Λιανός Ευάγγελος

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Παθολογικό-Ογκολογικό Τμήμα, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Λινός Δημήτριος

Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Lecturer in Surgery, Harvard Medical School, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Όμιλος «Υγεία»

Λιόντος Μιχαήλ

Παθολόγος Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Θεραπευτικής Ογκολογίας ΕΚΠΑ, Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

Λύπας Γεώργιος

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Τμήματος Γενετικής Ογκολογίας, Νοσοκομείο «Υγεία»

Μ

Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ

MD, MSc, MRCP(UK), Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Νοσοκομείο «Υγεία»

Μαργαρίτη Αναστασία

Παθολογοανατόμος, Επιμελήτρια Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου, Νοσοκομείο «Υγεία»

Μητσογιάννη Μαρία

MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Συνεργάτης Δ' Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Υγεία»

Μούντζιος Ιωάννης

MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Δ' Ογκολογικής Κλινικής και Μονάδας Κλινικών Μελετών, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

Μπάμιας Αριστοτέλης

Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική (τ. Δ/ντής), Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Επιστ. Συνεργάτης Νοσοκομείου «Υγεία», Αντιπρόεδρος Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ)

Μπαρμπούνης Βασίλειος

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε' Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Ιασώ»

Μπαφαλούκος Δημήτριος

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δ. Αττικής, Διευθυντής Α' Ογκολογικής Κλινικής, Metropolitan Hospital

Μπουκοβίνας Ιωάννης

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Ογκολογική Μονάδα, «Βιοκλινική» Θεσσαλονίκης

Ν

Νικολαΐδη Αδαμαντία

Παθολόγος Ογκολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Μητέρα»

Νικολάου Μιχαήλ

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»



13^{ος} χρόνος

MULTIDISCIPLINARY Care Discussions in ONCOLOGY

Νταϊλιάνας Απόστολος

Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Α΄
Γαστρεντερολογικής Κλινικής,
Νοσοκομείο «Υγεία»

≡

Ξηροπαΐδης Γεώργιος

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Ο

Οικονομοπούλου Παναγιώτα

Παθολόγος Ογκολόγος, Επίκουρη
Καθηγήτρια Παθολογικής Ογκολογίας
ΕΚΠΑ, Β΄ ΠΠΚ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Π

Πανόπουλος Χρήστος

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής
Ογκολογικού Τμήματος, «Ευρωκλινική»
Αθηνών

Παπαγγελόπουλος Παναγιώτης

Καθηγητής και Διευθυντής, Α΄
Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Χειρουργική
Κλινική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Παπαδημητρίου Χρίστος

Παθολόγος Ογκολόγος, Καθηγητής Ιατρικής
Σχολής ΕΚΠΑ, Διευθυντής Α΄ Ογκολογικής
Κλινικής, Νοσοκομείο «Ιασώ»

Παπαϊωάννου Δημήτριος

Παθολογοανατόμος-Κυτταρολόγος,
Αναπληρωτής Διευθυντής
Παθολογοανατομικού Τμήματος,
Νοσοκομείο «Υγεία»

Παπαλός Απόστολος

Επισκέπτης Καθηγητής Ιατρικής Σχολής
ΕΚΠΑ, Secretary General NASCE / UEMS
Executive Board, Πρόεδρος Επιστημονικής
Επιτροπής ΕΜΒΙΕΕ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Παπίας Γεώργιος

MSc, Επιμελητής Παθολογοανατομικού
Εργαστηρίου, Νοσοκομείο «Υγεία»

Πεκτασίδης Δημήτριος

Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ,
Διευθυντής Γ΄ Ογκολογικού Τμήματος,
«Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

Πυτικός Θεόδωρος

Πυρηνικός Ιατρός, Διευθυντής Τμήματος
Πυρηνικής Ιατρικής και PET/CT,
Νοσοκομείο «Υγεία»

Πισσάκας Γεώργιος

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Συντονιστής
Διευθυντής Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

Πισταμαλτζιάν Νικόλαος

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος,
Επιμελητής Ογκολογικής Κλινικής,
Νοσοκομείο «Μητέρα»

Ρ

Ρέππας Λάζαρος

Επεμβατικός Ακτινολόγος, Διευθυντής
Τμήματος Επεμβατικής Ακτινολογίας,
Νοσοκομεία «Υγεία» & «Μητέρα»

Ρηγάκος Γεώργιος

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής,
Γ΄ Παθολογική Ογκολογική Κλινική,
Νοσοκομείο «Υγεία»

Ροδολάκης Αλέξανδρος

Καθηγητής Γυναικολογικής Ογκολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών, Α΄ Μαιευτική
Γυναικολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

Σ

Σαλούστρος Εμμανουήλ

Αν. Καθηγητής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας

Σαμαντάς Επαμεινώνδας

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Β΄
Ογκολογικής Κλινικής, Metropolitan
Hospital

Σαμώνης Γεώργιος

Ογκολόγος-Λοιμωξιολόγος, Ομότιμος
Καθηγητής Παθολογίας



13^{ος} χρόνος

MULTIDISCIPLINARY Care Discussions in ONCOLOGY

Ομιλητές – Πρόεδροι
Σχολιαστές

Σαριδάκη Ζένια

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος,
Διευθύντρια στην Α' Ογκολογική
Κλινική, Metropolitan Hospital Αθήνα,
Επιστημονικός Υπεύθυνος Ογκολογικού
Τμήματος, «Ασκληπιός ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ»,
Ηράκλειο Κρήτης

Σεψάς Ευάγγελος

Θωρακοχειρουργός, MD, PhD, FEBTCS,
FESTS, FEAacts, FCCP, Διευθυντής
Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, Νοσοκομείο
«Μητέρα»

Σιούλας Αθανάσιος

MD, PhD, FEBGH, Γαστρεντερολόγος,
Γ' Γαστρεντερολογική Κλινική,
Νοσοκομείο «Υγεία»

Σιούλας Βασίλειος

Γυναικολόγος Ογκολόγος (MSKCC/ESGO),
Διευθυντής Α' Κλινικής Γυναικολογικής
Ογκολογίας & Πρόεδρος Επιστημονικού
Συμβουλίου Νοσοκομείου «Μητέρα»

Σκάρλος Παντελής

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Επίκουρος
Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Επιστημονικός
Συνεργάτης Β' Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογικής Κλινικής, Metropolitan
Hospital

Σουγκλάκος Ιωάννης

Παθολόγος Ογκολόγος, Καθηγητής
Παθολογικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Κρήτης

Στάμου Κωνσταντίνος

Γενικός Χειρουργός - Χειρουργός Παχέος
Εντέρου, Διευθυντής Β' Χειρουργικής
Κλινικής, Νοσοκομείο «Μητέρα»

Σταυρίδη Φλώρα

MD, MSc, MRCP, Παθολόγος Ογκολόγος,
Διευθύντρια Δ' Ογκολογικής Κλινικής,
Νοσοκομείο «Υγεία»

Σωτηρόπουλος Γεώργιος

MD, PhD, FACS, FEBS, Καθηγητής
Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων
Ιατρικών Σχολών Πανεπιστημίων
ΕΚΠΑ και Essen, Διευθυντής Μονάδας
Μεταμόσχευσης Ήπατος, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Σωτηροπούλου Μαρία

MD, PhD, Παθολογοανατόμος,
τ. Διευθύντρια Παθολογοανατομικού
Εργαστηρίου, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»,
Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου
«Υγεία»

Τ

Τέγος Θεόδωρος

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος,
Επιμελητής Α', Ογκολογικό Τμήμα,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Ογκολογική
Κλινική «Μητέρα»

Τζίμας Γεώργιος

MD, PhD, MSc, FACS, FRCSC, Χειρουργός,
Διευθυντής Τμήματος Χειρουργικής Ήπατος
& Χοληφόρων, Νοσοκομείο «Υγεία»,
Assistant Professor of Surgery, University
of Vermont, USA

Τόλια Μαρία

Αν. Καθηγήτρια Ακτινοθεραπείας Ιατρική
Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθύντρια
Εργαστηρίου Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου

Τριαρίδης Αθανάσιος

Συγγραφέας

Τριχάς Μιλτιάδης

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος,
Επιστημονικός Συνεργάτης, Νοσοκομείο
«Ιαώ»

Τρυφωνόπουλος Δημήτριος

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Β'
Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής,
Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»



13^{ος} χρόνος

MULTIDISCIPLINARY Care Discussions in ONCOLOGY

Ομιλητές - Πρόεδροι
Σχολιαστές

Τσαγκούλη Σοφία

MD, PhD, Πνευμονολόγος,
Α' Πνευμονολογική Κλινική,
Νοσοκομείο «Υγεία»

Τσαμασιώτη Κωνσταντία

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Κέντρο
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας,
Νοσοκομείο «Υγεία»

Τσιαμούλος Ζαχαρίας

Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Τμήματος
Ενδοσκοπικής Μικροχειρουργικής
(IN CREM), Νοσοκομείο «Υγεία»

Τσιατάς Μαρίνος

MD, PhD, BSc, Παθολόγος Ογκολόγος,
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Τσιώνου Χριστίνα

Γυναικολόγος και Χειρουργός Μαστού,
Διευθύντρια Α' Κλινικής Μαστού,
Νοσοκομείο «Μητέρα»

Τσιώτος Γρηγόριος

Χειρουργός, Διευθυντής Α' Χειρουργικής
Κλινικής, Νοσοκομείο «Μητέρα» &
«Υγεία», Instructor of Surgery Mayo Clinic,
Assistant Professor of Surgery University of
Missouri, Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου
Παγκρέατος

Τυριτζής Σταύρος

MD, PhD, FEBU, FACS Χειρουργός-
Ουρολόγος-Ανδrolόγος, Διευθυντής
Δ' Ουρολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο
«Υγεία», Επικ. Καθηγητής Ουρογεννητικής
Ογκολογίας και Ρομποτικής Πανεπιστημίου
Karolinska Στοκχόλμης

Φ

Φαλιάκου Ελένη

MD, Χειρουργός Μαστού, Διευθύντρια Β'
Κλινικής Μαστού, Νοσοκομείο «Μητέρα»

Φιστέ Ωραιάνθη

MD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος,
Γ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Φλώρος Θεοφάνης

MD, Παθολόγος Ογκολόγος, Στρατιωτικός
Ιατρός, Διευθυντής Ε' Ογκολογικής
Κλινικής, Νοσοκομείο «Metropolitan
General», Αν. Διευθυντής Ογκολογικής
Κλινικής, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών,
τ. ResFac, University of Pittsburgh Cancer
Institute (UPCI), University of Pittsburgh
School of Medicine (UPSOM)

Φούντζηλα Έλενα

Παθολόγος Ογκολόγος, Κλινική
Παθολογικής Ογκολογίας «Άγιος Λουκάς»,
Clinical Associate Professor, European
University Cyprus

Φωστήρα Φλωρεντία

PhD, Κλινική Εργαστηριακή Γενετίστρια,
ErCLG-Γενετική Σύμβουλος, Msc,
Ερευνήτρια Γ', Εργαστήριο Μοριακής
Γενετικής του Ανθρώπου, «ΕΚΕΦΕ
Δημόκριτος»

Χ

Χαϊδόπουλος Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής Γυναικολογικής
Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Χατζόπουλος Κωνσταντίνος

Χειρουργός Μαστού, Αναπληρωτής
Διευθυντής Δ' Κλινικής Μαστού,
Νοσοκομείο «Μητέρα»

Χριστοδούλου Χρήστος

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Β'
Ογκολογικής Κλινικής, Metropolitan
Hospital

Χριστοπούλου Αθηνά

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος,
Διευθύντρια και Υπεύθυνη Ογκολογικής
Μονάδας, Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»



13^{ος} χρόνος

MULTIDISCIPLINARY Care Discussions in ONCOLOGY

Χρούσος Γεώργιος

MD, MACP, MACE, FRCP, Ομότιμος
Καθηγητής Παιδιατρικής και
Ενδοκρινολογίας, Διευθυντής Ερευνητικού
Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Υγείας
Μητέρας, Παιδιού και Ιατρικής Ακριβείας,
Επικεφαλής, Έδρα UNESCO Εφηβικής
Υγείας και Ιατρικής, ΕΚΠΑ

Ψ

Ψυρρή Αμάντα

Καθηγήτρια Παθολογίας Ογκολογίας,
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Διευθύντρια Β'
Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Ω

Ωραιόπουλος Βάιος

Παθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογικό Τμήμα,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Ομιλητές – Πρόεδροι
Σχολιαστές





13^{ος} χρόνος

MULTIDISCIPLINARY Care Discussions in ONCOLOGY

Γενικές Πληροφορίες

Οργάνωση

Ιατρική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης

Σε συνεργασία

- Επιστημονική Εκπαιδευτική Ογκολογική Εταιρεία
«Σκεπτόμενοι Διαφορετικά Ενεργώντας Ογκολογικά»
- Ογκολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ

Υπό την Αιγίδα

- Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ)
- Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ)

Ημερομηνία

30 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2025

Τόπος διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Divani Caravel
Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2
Τ.Κ. 161 21, Αθήνα
Τηλ.: 210 7207 000

Εγγραφές

Η εγγραφή και η παρακολούθηση επιτρέπεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να πιστοποιήσουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα (όπως η ταυτότητα ιατρικού ή φαρμακευτικού συλλόγου, νοσηλευτική ή φοιτητική ταυτότητα).

Οδηγίες παρακολούθησης με φυσική παρουσία

Όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία θα πρέπει να προσέλθουν στο χώρο διεξαγωγής για την εγγραφή τους ή να πραγματοποιήσουν την προεγγραφή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.events.gr. Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό barcode που θα πρέπει να σαρώνουν κατά την είσοδο και έξοδο τους, στην αίθουσα.

Οδηγίες διαδικτυακής παρακολούθησης

Εάν είστε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο www.livemed.gr (πατήστε στο πεδίο **Register/Εγγραφή**). Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε την κατηγορία Live και το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο **Go Live ή Go Virtual**.



13^{ος} χρόνος

MULTIDISCIPLINARY Care Discussions in ONCOLOGY



Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την «Αίθουσα Συνεδριάσεων».



Σημείωση: Εάν σας ενδιαφέρει να παραλάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης, είναι απαραίτητο μετά τη σύνδεσή σας στο Livemed να μεταβείτε στην εικονική «Γραμματεία Συνεδρίου» και να ολοκληρώσετε την «Εγγραφή» σας στην επιστημονική εκδήλωση πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο, ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος παρακολούθησης.



Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν 21,5 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ECMECs by the EACCME).

Παραλαβή πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου, σε όσους συμμετέχοντες έχουν εγγραφεί και παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης. Ο αριθμός των Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ECMECs by the EACCME), θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης που θα καταγραφεί στο σύστημα καταμέτρησης (στην είσοδο της αίθουσας, για τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία και στην πλατφόρμα Livemed, για τους διαδικτυακούς συμμετέχοντες).

Σημείωση: Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα για λήψη έως 12 μήνες από τη λήξη της εκδήλωσης.

Η εκδήλωση καλύπτεται φωτογραφικά, βιντεοσκοπείται και προβάλλεται σε ζωντανή μετάδοση.

Γραμματεία Συνεδρίου



Events & Travel Solutions

Ελ. Βενιζέλου 154, 17 122, Ν. Σμύρνη

Τηλ.: 210 9880 032 • Website: www.events.gr • E-mail: ets@events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η Ε.Τ.Σ. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr.



13^{ος} χρόνος

MULTIDISCIPLINARY Care Discussions in ONCOLOGY

Χορηγοί

abbvie

AMGEN

astellas

AstraZeneca

BIANEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Α.Ε.
ΣΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIOKOSMOS
RADIOPHARMACEUTICALS

Bristol Myers Squibb®

Daiichi-Sankyo

DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

FARAN
ONCOLOGY

Galenica
For People. For Science. For Life.

Genekor
Committed to Biotechnological Innovation

GENESIS
pharma

GSK

HEMOGLOBE
WHEN TECHNOLOGY SERVES HUMAN

INTEGRIS
PHARMA

IPSEN

Johnson & Johnson

Lavipharm

LEO

LIFECODE
genetics beyond

Lilly
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

MERCK

MHTEPA
Με ελπίδες για τη ζωή
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ HHG

MSD

NUTRICIA
LIFE-TRANSFORMING NUTRITION

Pfizer
Oncology

Pierre Fabre
FARMAKA S.A.

Roche

SANDOZ

SERVIER
moved by you

Takeda

WinMedica



13^{ος} χρόνος

MULTIDISCIPLINARY Care Discussions in ONCOLOGY

Σημειώσεις



13^{ος} χρόνος

MULTIDISCIPLINARY Care Discussions in ONCOLOGY

Blank lined area for notes, framed by a thin orange border. A large, faint watermark of the MDcON 2025 logo is visible on the left side.



13^{ος} χρόνος

MULTIDISCIPLINARY Care Discussions in ONCOLOGY





13^{ος} χρόνος

MULTIDISCIPLINARY Care
Discussions in **ONCOLOGY**



Γραμματεία:  Events & Travel Solutions

Ελ. Βενιζέλου 154 • 171 22 Ν. Σμύρνη • Τηλ.: 210 98 80 032

Website: www.events.gr • E-mail: ets@events.gr