



UP TO DATE

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - η Σύγχρονη Αντιμετώπιση των Ογκολογικών Ασθενών στην Αιτωλοακαρνανία

23 & 24

Ιανουαρίου
2026



Ξενοδοχείο Corali
ΑΓΡΙΝΙΟ

Επιστημονικό Πρόγραμμα

DON'T MAKE THEM WAIT.

Start strong with CABOMETYX® + Nivolumab.



60% of aRCC patients don't reach 2L*2-4



67,6m FU results continue to support Cabometyx® - Nivolumab as a Standard of Care for previously untreated aRCC patients¹

Keep time on their side⁵

*Across three real-world studies, only 35-45% of patients received 2L²⁻⁴

References: 1. Motzer R, et al. Abstract 439. Presented at ASCO GU 2025. 2. Shah N, et al. Eur Urol. 2023;49:110-118. 3. Malik A, et al. Poster 19. Presented at IKCS 2023. 4. Lai G-S, et al. PLoS One. 2023;18(11):e0294039. 5. Bourlon MT, et al. Abstract 362, Presented at ASCO GU 2024.

IPSEN MON. ΕΠΕ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΘΛΑ.: 210 9843324

E-mail: ipsenepe@ipsen.com

www.ipsen.com/greece

Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930

ΔΤΦ: 02/01/2026

CABOMETYX F.C.TAB 20MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€

CABOMETYX F.C.TAB 40MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€

CABOMETYX F.C.TAB 60MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€



Περίληψη Χαρακτηριστικών
Προϊόντος CABOMETYX®
Ημ. αναθεώρησης κειμένου,
24 Οκτωβρίου 2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

 **CABOMETYX®**
(cabozantinib) tablets

10 CABO-A/MAR 2025

 **IPSEN**



// Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σας προσκαλώ για τρίτη διαδοχική χρονιά στο Περιφερειακό Ογκολογικό Συνέδριο «Up To Date - Ογκολογία στην Περιφέρεια, η Σύγχρονη Αντιμετώπιση των Ογκολογικών Ασθενών στην Αιτωλοακαρνανία», το οποίο θα λάβει χώρα στο Ξενοδοχείο Corali στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2026.

Όπως στις δύο προηγούμενες συνεδριακές συναντήσεις έτσι και η φετινή εστιάζει στην ενημέρωση των Ιατρών της περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας για τις δυνατότητες βέλτιστης αντιμετώπισης των Ογκολογικών ασθενών σε τοπικό επίπεδο. Να υποχωρήσει περαιτέρω η προκατάληψη της «καταδίκης» ενός καρκινοπαθή ως ενός ανθρώπου χωρίς μέλλον. Ο στόχος της λήψης των πλέον εξατομικευμένων και σύγχρονων ογκολογικών θεραπειών, η εντοπιότητα συνυφασμένη με την απουσία της ταλαιπωρίας μετακίνησής τους καθώς και η τμηματική αποσυμφόρηση των τριτοβάθμιων νοσοκομείων της Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει να επιτυγχάνεται με σταθερό ρυθμό.

Η σύγχρονη Ογκολογία προσπαθεί να ανακαλύπτει διαρκώς τόσο τη διαδικασία καρκινογένεσης όσο και την τροποποίηση των φυσιολογικών αποτρεπτικών μηχανισμών του σώματός μας. Η ανάπτυξη γονιδιακών θεραπειών, ανοσοθεραπειών καθώς και η βελτιστοποίηση του τρόπου στοχευμένης χορήγησης κλασσικών χημειοθεραπευτικών παραγόντων μέσω των συζευγμένων αντισωμάτων έχει εκτοξεύσει το όφελος στην επιβίωση των ασθενών σε πλείστες κακοήθειες. Η φύση των θεραπειών αυτών, επιτρέπει τη χορήγηση σε τοπικό επίπεδο, αρκετοί δε ασθενείς του Νομού μας αλλά και όμορων Νομών έχουν ήδη επωφεληθεί αυτών στην πόλη του Αγρινίου. Έχει ανοίξει πλέον και ο δρόμος συμμετοχής των συμπολιτών μας στη διεξαγωγή τέτοιων κλινικών μελετών. Η εύκολη και ανέξοδη μετακίνησή τους στα κατάλληλα κέντρα διεξαγωγής τους ήδη δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σήμερα στις αποτελεσματικές θεραπείες του αύριο.

Στο επίκεντρο όμως της επιστήμης είναι ο ασθενής, ο άνθρωπος. Η αντιμετώπιση σειράς κακοηθειών έχει, δυστυχώς, ως συνέπεια να καταλείπονται σημαντικές αναπηρίες όπως κολοστομίες σε νεοπλασίες του ορθού, ουρητηροστομίες ή ανάγκη συνεχών καθετηριασμών σε κακοήθειες της ουροδόχου κύστεως κ.α. Οι σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες στην Ογκολογία, μπορούν να επιτύχουν «διατήρηση του οργάνου» (organ preservation) σε διαρκώς αυξανόμενα ποσοστά ασθενών με την σωστή θεραπευτική επιλογή.

Η τοξικότητα των θεραπειών μας, επίσης, παραμένει παρούσα και είναι πολλές φορές διαφορετική από αυτή της κλασσικής χημειοθεραπείας. Το βάρος αντιμετώπισής της «πέφτει» σε σημαντικό βαθμό στο συνάδερφο της κοινότητας ο οποίος πρέπει να την αναγνωρίζει και να την αντιμετωπίζει ανάλογα. Η ανακουφιστική αντιμετώπιση σειράς συμπτωμάτων (χρόνιος πόνος, περιφερική νευροπάθεια κ.α.), η σωστή διαδοχική χρήση αντιμικροβιακών παραγόντων σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς και η σωστή εφαρμογή του προληπτικού - προσυμπτωματικού ελέγχου θα συζητηθούν εκ νέου διεξοδικά.

Διακεκριμένοι επιστήμονες από όλους τους κλάδους σχετιζόμενους με την Ογκολογία δέχτηκαν να συνδράμουν την προσπάθεια αυτή. Θα προσπαθήσουν να αναπτύξουν την εξιδεικευμένη γνώση με κατανοητό τρόπο. Τους ευχαριστώ και είμαι ευγνώμων.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, με ιδιαίτερη χαρά θα σας καλωσορίσουμε ξανά στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου μας στο Αγρίνιο προσβλέποντας στην παρουσία σας η οποία θα συνδράμει στην επιτυχή διεξαγωγή του συνεδρίου και τη σταδιακή καθιέρωσή του ως επιστημονικό φάρο της περιοχής μας.

Με θερμούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου
Θεοφάνης Φλώρος

Παθολόγος Ογκολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός,
Διευθυντής 5ης Ογκολογικής Κλινικής, Metropolitan General Hospital,
Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

1ης γραμμής θεραπεία για ασθενείς
με μεταστατικό ΜΜΚΠ¹⁻²

6 ΕΤΗ³
CM 9LA

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ NSQ & PD-L1<1%³



ΜΕ 2 ΚΥΚΛΟΥΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ[†]

Ένδειξη: Το OPDIVO σε συνδυασμό με ipilimumab και 2 κύκλους πλατινούχου χημειοθεραπείας ενδείκνυται για την πρώτη γραμμή θεραπεία του μεταστατικού μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα σε ενήλικες των οποίων οι όγκοι δεν φέρουν μετάλλαξη εναισθητοποίησης του EGFR ή μετάθεση ALK.¹

Προφίλ ασφάλειας: Στη συγκεντρωτική ομάδα δεδομένων από τη χορήγηση του nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab (με ή χωρίς χημειοθεραπεία) σε όλους τους τύπους όγκων (n = 2.626), με ελάχιστη παρακολούθηση που κυμαίνονται από 6 έως 47 μήνες, οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 10%) ήταν κόπωση (47%), διάρροια (35%), εξάνθημα (37%), ναυτία (27%), κνησμός (29%), μυοσκελετικός πόνος (26%), πυρεξία (23%), μειωμένη όρεξη (22%), βήχας (21%), κοιλιακό άλγος (18%), έμετος (18%), δυσκοιλιότητα (18%), αρθραλγία (18%), δύσπνοια (17%), υποθυρεοειδισμός (16%), κεφαλαλγία (15%), λοιμώξη του ανώτερου αναπνευστικού (13%), οίδημα (13%) και ζάλη (10%).^{1,2}

Δοσολογία: Οι ασθενείς στο σκέλος του nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab και πλατινούχο χημειοθεραπεία έλαβαν nivolumab 360 mg χορηγούμενο ενδοφλεβίως σε διάστημα 30 λεπτών κάθε 3 εβδομάδες σε συνδυασμό με ipilimumab 1 mg/kg χορηγούμενο ενδοφλεβίως σε διάστημα 30 λεπτών κάθε 6 εβδομάδες και πλατινούχο χημειοθεραπεία χορηγούμενη κάθε 3 εβδομάδες για 2 κύκλους. Οι ασθενείς στο σκέλος της χημειοθεραπείας έλαβαν πλατινούχο χημειοθεραπεία κάθε 3 εβδομάδες για 4 κύκλους. Οι ασθενείς με ιστολογικό τύπο εκ μη πλακώδων κυττάρων μπορούσαν να λάβουν προαιρετικά θεραπεία συντήρησης με πεμετρεξίδη.^{1,2}

Τρόπος διάθεσης ("BLUE BOX") των φαρμακευτικών προϊόντων OPDIVO® και YERVOY®:
Ελλάδα: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.
Αρ. Α.Κ. OPDIVO: 43128/02-10-2015, Αρ. Α.Κ. YERVOY: 26219/11-04-2012.
Κύπρος: Με ιατρική συνταγή.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών

Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα,
Τηλ: +302132040337/Ιστότοπος: <http://www.eof.gr> ή <http://www.kitirnikarta.gr>
Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας CY-1475 Λευκωσία,
Τηλ: +357 22608607, Φαξ: +357 22608669, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs

Βιβλιογραφία: 1. OPDIVO®, Περilψηφ Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 05/2025. 2. YERVOY®, Περilψηφ Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 02/2025. 3. Carbone DP et al, Nivolumab plus ipilimumab with chemotherapy as first-line treatment for patients with metastatic non-small-cell lung cancer: final, 6-year outcomes from CheckMate 9LA, ESMO Open, 2025. doi:10.1016/j.esmoop.2025.105123

Συνοπτογραφίες: **ΧΜΘ:** Χημειοθεραπεία, **NSQ:** Μη πλακώδης ιστολογία, **SQ:** Πλακώδης ιστολογία, **ΜΜΚΠ:** Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα

Λιστική Τιμή

ΕΛΛΑΔΑ

OPDIVO® (nivolumab) OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BtX1 VIAL x 4ML 462,27 €,
OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BtX1 VIAL x 10ML 1.120,50 €,
OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BtX1 VIAL x 12ML 1.372,68 €,
OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BtX1 VIAL x 24ML 2.642,75 €
YERVOY® (ipilimumab) YERVOY C/S.SOL.IN 5MG/ML BtX1VIALx50MGx10ML 3.039,22 €,
YERVOY C/S.SOL.IN 5MG/ML BtX1VIALx200MGx40ML 11.968,95 €
Σύμφωνα με το Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης της 4ης Ιανουαρίου 2025

ΚΥΠΡΟΣ

OPDIVO® (nivolumab) OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BtX1 VIAL x 4ML 601,56 €,
OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BtX1 VIAL x 10ML 1.369,95 €,
OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BtX1 VIAL x 24ML 3268,70 €
YERVOY® (ipilimumab) YERVOY C/S.SOL.IN 5MG/ML BtX1VIALx50MGx10ML 3.880,76 €,
YERVOY C/S.SOL.IN 5MG/ML BtX1VIALx200MGx40ML 15.115,68 €
Σύμφωνα με τον Ενιαίο Τιμοκατάλογο με ισχύ από 1ης Φεβρουαρίου 2025

Πριν τη συνταγογράφηση και για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες, συμβουλευτείτε τις ισχύουσες Περilψηφεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων, σαρώνοντας τα παρακάτω QR code:



Ημερομηνία αναθεώρησης κειμένου:
05/2025



Ημερομηνία αναθεώρησης κειμένου:
02/2025

Bristol Myers Squibb®

Bristol-Myers Squibb A.E.

Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική, ΤΘ 63883 - Βριλήσσια,

Τ.Κ. 152 03, Αττική, Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400, Φαξ 210 6074333, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
www.kitirnikarta.gr
www.kitirnikarta.gov.cy

O-ONCO 7356-GR-2500020/July 2025



// Επιτροπές

Οργανωτική Επιτροπή

Φλώρος Θεοφάνης
Γιαννοπούλου Μαρία

Επιστημονική Επιτροπή

Αγραφιώτης Γεώργιος
Βερίγος Κοσμάς
Γώγος Χαράλαμπος
Ζώτος Παναγιώτης
Θεοδωράκη Κασσιανή
Κατσαούνη Παρασκευή
Κουκοπούλου Ειρήνη
Κούτρας Άγγελος
Λύρος Ορέστης
Μαυραγάνης Χρήστος
Μούντζιος Ιωάννης
Νικολακόπουλος Αθανάσιος
Παπαγεωργίου Δημήτριος
Παπαθανασίου Νικόλαος
Πιστιόλας Δημήτριος
Σακκάς Μάριος
Σπυροπούλου Δέσποινα
Χριστοδούλου Χρίστος



ALYMSYS[®]

Bevacizumab



W WinMedica
Serving Health for Life

Για περισσότερες πληροφορίες:
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής
Οδού 33-35, 15238 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827
info@winmedica.gr
www.winmedica.gr

Για ενδοφλέβια χρήση μετά από αραίωση

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενος ανεπιθύμητος ενέργειας.

Νοσοκομειακές Τιμές:

ALYMSYS C/S SOLIN 25MG/ML VIAL X 16 ML 728,89 €
ALYMSYS C/S SOLIN 25MG/ML VIAL X 4 ML 186,89 €

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Κάτοχος Άδειας
Κυκλοφορίας

mAbxience
From lab to life

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



// Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

13:00-13:30 Προσέλευση - Εγγραφές

13:30-14:30 Η Νοσηλευτική στη Φροντίδα του Ογκολογικού Ασθενή

Προεδρείο: **Ε. Μπαρέ, Γ. Παναγιωτόπουλος**

13:30-13:50 Η παροχή ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας -
Πρακτική και εφαρμογή στην ογκολογική νοσηλευτική **Π. Πουλή**

13:50-14:10 Η σημαντικότητα της επικοινωνίας κατά τη διάγνωση στον
ογκολογικό ασθενή **Μ. Γκιργκένη**

14:10-14:30 Η εκπαίδευση του Νοσηλευτή στη διαχείριση των Ογκολογικών
Ασθενών: σημαντικότητα και δυνατότητες στην Περιφέρεια -
ο ρόλος του ΕΣΝΕ **Δ. Παπαγεωργίου**

14:30-15:50 Οι Ογκολογικές Θεραπείες και ανεπιθύμητες ενέργειες:
Έμφαση στον Ιατρό της Κοινότητας

Προεδρείο: **Ε. Κουκοπούλου, Μ. Μαρζιγιέ, Θ. Φλώρος**

14:30-14:50 Ουδετεροπενία και πυρετός **Π. Χαλμούκη**

14:50-15:10 Φλεβική Θρόμβωση - προφύλαξη στο νεοπλασματικό ασθενή **Ν. Τσουκαλάς**

15:10-15:30 Αναιμία - ορθή χρήση ερυθροποιητίνης **Π. Κατσαούνη**

15:30-15:50 Ανεπιθύμητες ενέργειες από τον πεπτικό σωλήνα **Θ. Εμμανουήλ**

15:50-17:10 Προσυμπτωματικός έλεγχος και πρόληψη του καρκίνου

Προεδρείο: **Π. Ζώτος, Ε. Πλιάκου**

15:50-16:10 Καρκίνος παχέος εντέρου **Δ. Πισιόλας**

16:10-16:30 Καρκίνος πνεύμονα **Γ. Κατσουράκης**

16:30-16:50 Καρκίνος προστάτη **Μ. Σακκάς**

16:50-17:10 Καρκίνος τραχήλου μήτρας **Χ. Μαυραγάνης**

ENHERTU ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 Ή 2 ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ^{1,2}

IN HR+/HER2-LOW AND
HER2-ULTRALOW mBC¹



▼ Το φάρμακο τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +302132040337, Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitirnikarta.gr>

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ¹

Καρκίνος του μαστού

• HER2-Θετικός καρκίνος του μαστού

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό HER2-θετικό καρκίνου του μαστού που έχουν λάβει ένα ή περισσότερα προηγούμενα σχήματα βασισμένα σε αγωγή έναντι του HER2

• Χαμηλής έκφρασης HER2 και εξαιρετικά χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνος του μαστού

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό:

- Θετικό στον ορμονικό υποδοχέα (HR), χαμηλής έκφρασης HER2 ή εξαιρετικά χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνου του μαστού που έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία σε μεταστατική κατάσταση και δεν θεωρούνται κατάλληλες για ενδοκρινική θεραπεία ως επόμενη γραμμή θεραπείας
- χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνου του μαστού που έχουν λάβει προηγούμενη χημειοθεραπεία σε μεταστατική κατάσταση ή έχουν παρουσιάσει υποτροπή της νόσου κατά τη διάρκεια ή εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση της επικουρικής χημειοθεραπείας

Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (MMKP)

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με προχωρημένο MMKP των οποίων ο καρκίνος έχει μια ενεργοποιητική μετάλλαξη του HER2 (ERBB2) και οι οποίοι χρήζουν συστηματικής θεραπείας μετά από χημειοθεραπεία με βάση την πλατινία, με ή χωρίς ανοσοθεραπεία.

Καρκίνος του στομάχου.

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με προχωρημένο HER2-θετικό αδενοκαρκίνωμα του στομάχου ή της γαστροοισοφαγικής συμβολής (ΓΟΣ) που έχουν λάβει ένα προηγούμενο σχήμα βασισμένο στην τραστοζουμάμπη

Σύνοψη του προφίλ ασφαλείας Enherthu 5,4 mg/kg (κλινικές μελέτες σε πολλαπλούς τύπους όγκων)¹.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ναυτία (71,1%), κόπωση (55,3%), έμετος (37,3%), αλωπεκία (36,1%), αναμία (35,9%), ουδετεροπενία (35,1%), δυσκολιότητα (31,7%), μειωμένη όρεξη (30,6%), διάρροια (30,1%), αυξημένες τρανσαμινάσες (26,6%), μυοσκελετικό άλγος (23,6%), θρομβοπενία (23,1%) και λευκοπενία (21,5%).

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 3 ή 4 σύμφωνα με τα Κοινά Κριτήρια Ορολογίας για Ανεπιθύμητες Ενέργειες του Εθνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ (NCI-CTCAE v5.0) ήταν ουδετεροπενία (18,0%), αναμία (10,5%), κόπωση (7,8%), λευκοπενία (6,0%), θρομβοπενία (5,4%), ναυτία (4,9%), λεμφοπενία (3,9%), υποκαλιαιμία (3,8%), αυξημένες τρανσαμινάσες (3,5%), διάρροια (2,5%), έμετος (2,4%), πνευμονία (1,3%) και μειωμένο κλάσμα εξώθησης (1,0%). Ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 5 παρουσιάστηκαν στο 1,4% των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της ΔΠΠ/πνευμονοπάθειας (1,1%).

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις¹

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Enherthu σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχουν τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Το Enherthu δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι γυναίκες δεν πρέπει να θηλάζουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Enherthu ή για 7 μήνες μετά την τελευταία δόση. Επίσης οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία θα πρέπει να προτρέπονται να χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντισύλληψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για τουλάχιστον 7 μήνες μετά την τελευταία δόση του Enherthu.

Προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή¹

- Το Enherthu είναι εμετογόνο, πράγμα που περιλαμβάνει όψιμη ναυτία ή/και έμετο. Πριν από κάθε δόση του Enherthu, οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή με ένα συνδυαστικό σχήμα δύο ή τριών φαρμακευτικών προϊόντων (π.χ. δεξαμεθαζόνη με ανταγωνιστή των υποδοχέων 5-HT₃ ή/και με ανταγωνιστή των υποδοχέων NK1, καθώς και με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα, όπως ενδείκνυται) για την πρόληψη της ναυτίας και του εμέτου που προκαλούνται από τη χημειοθεραπεία

Χονδρική Τιμή: 1596,15€, Νοσοκομειακή Τιμή: 1435,13€, Λιανική Τιμή: 1755,37€.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΔΕΣΗΣ¹

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία. **Δοσολογία Καρκίνος του μαστού** Η συνιστώμενη δόση του Enherthu είναι 5,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενα με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. **MMKP** Η συνιστώμενη δόση του Enherthu είναι 5,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενα με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. **Καρκίνος του στομάχου** Η συνιστώμενη δόση του Enherthu είναι 6,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενα με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. Η αρχική δόση θα πρέπει να χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση διάρκειας 90 λεπτών. Εάν η προηγούμενη έγχυση ήταν καλά ανεκτή, οι επόμενες δόσεις του Enherthu μπορούν να χορηγηθούν με ενδοφλέβια έγχυση διάρκειας 30 λεπτών. Ο ρυθμός έγχυσης του Enherthu θα πρέπει να επιβραδύνεται ή να διακόπτεται προσωρινά εάν ο ασθενής εμφανίσει συμπτώματα σχετιζόμενα με την έγχυση. Σε περίπτωση αντιδράσεων σοβαρής μορφής στην έγχυση, το Enherthu θα πρέπει να διακόπτεται οριστικά.

Βιβλιογραφία: 1.Enherthu Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Μάρτιος 2025 2.Bardia A et al. N Engl J Med. 2024;391(22):2110-22.

Για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Daiichi Sankyo ή στην Astra Zeneca ή σκανάρετε το QR code



https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/enherthu-epar-product-information_el.pdf



Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Daiichi Sankyo Europe GmbH
Υπεύθυνος Συν-πρόσθηξης: Daiichi Sankyo Greece
Daiichi Sankyo Greece, Κηφισίας 299, Κηφισιά, 14561, Αθήνα,
Τηλ: 2104448037
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 175572301000, www.daiichi-sankyo.gr



Τοπικός Αντιπρόσωπος του ΚΑΚ :
AstraZeneca A.E
Αγριλάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ: 2106871500
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 00063891000, www.astrazeneca.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
www.kitirnikarta.gr
www.kitirnikarta.gov.cy



Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

17:10-17:30

Διάλεξη

Προεδρείο: **Χ. Γώγος, Α. Μητρομάρας**

Τι νεότερο στα εμβόλια: με έμφαση στον εμβολιασμό
έναντι του RSV, ιού της γρίπης και του πνευμονιόκοκκου

Κ. Ακινόσογλου

17:30-17:40

Διάλειμμα καφέ

17:40-19:30

Στρογγυλό τραπέζι: **Καρκίνος Πνεύμονα: έμφαση στην Πρώιμη Νόσο**

Προεδρείο: **Θ. Φλώρος, Γ. Παπαβασιλείου, Χ. Μπαζάκα**

17:40-18:00

Καθορισμός εξαιρεσιμότητας στον καρκίνο του πνεύμονα:
Ο ρόλος του Πνευμονολόγου

Φ. Σαμψώνας

18:00-18:20

Καθορισμός εξαιρεσιμότητας του καρκίνου του πνεύμονα:
Ο ρόλος του Πυρηνικού Ιατρού

Ν. Παπαθανασίου

18:20-18:40

Περιεγχειρητική ανοσοθεραπεία στον καρκίνο του πνεύμονα:
υποχρέωση ή προαίρεση

Α. Γρίβας

18:40-19:00

Νεοεπικουρική θεραπεία με στοχευτικούς παράγοντες

Ε. Φεργάδης

19:00-19:20

Οι προκλήσεις του χειρουργού στην εποχή της νεοεπικουρικής
ανοσοχημειοθεραπείας: μύθοι και πραγματικότητα

Κ. Κωνσταντινίδης

19:20-19:30

Σχολιασμός: **Θ. Φλώρος**

19:30-20:00

Διάλεξη

Προεδρείο: **Φ.Ι. Δημητρακόπουλος, Γ. Καπέτσης**

Targeting RAS beyond G12C in gastrointestinal cancers

Ch. Fountzilas





NUBEQA[®]

(darolutamide) 300 mg tablets

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

- Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 300 mg δαρολουταμίδης.
- Έκδοχο με γνωστή δράση: κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 186 mg μονοϋδρικής λακτόζης

Λιανική τιμή: 3031.95 €



Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας:
Bayer AG 51368, Leverkusen, Γερμανία

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αghισιλάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα
Τηλ: 210 6187500, Αρ. ΓΕΜΗ: 000299101000

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης
Τηλ: +30 210 6187742, Φαξ: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που θα βρείτε σαρώνοντας το QRC ή ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/nubeqa-epar-product-information_el.pdf, Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: Ιούλιος 2025

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

PP-NUB-GR-0117-1
09.2025



Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

20:00-20:30

Τιμητική Διάλεξη

Προεδρείο: **Ε. Σαλούστρος, Γ. Αγραφιώτης**

Ανισότητες στον καρκίνο του πνεύμονα

Κ.Ν. Συρίγος

20:30-21:00

Τελετή έναρξης

20:30-20:40

Χαιρετισμοί

20:40-21:00

Εναρκτήρια Ομιλία

Θ. Φλώρος

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

09:00-10:30

Στρογγυλό τραπέζι: **Καρκίνος Προστάτη**

Προεδρείο: **Κ. Στραβοδήμος, Σ. Δεμίρη, Κ. Παπαδημητρόπουλος**

09:00-09:20

PET/PSMA vs FDG/PET: «αντίπαλοι ή συνεργάτες» στην αρχική διάγνωση - παρακολούθηση του καρκίνου του προστάτη;

Ε. Σκούρα

09:20-09:40

Ορμονοευαίσθητος καρκίνος προστάτη: η μη χορήγηση των νέων ορμονικών παραγόντων στην αρχική αντιμετώπιση αποτελεί mal-practice;

Ε. Μαραγκούλη

09:40-10:00

State of the Art: εξατομικεύοντας τη θεραπεία στους ασθενείς με ευνοχοχάντοχο καρκίνο προστάτη

Δ. Νάση

10:00-10:20

Lutetium-177 (177Lu)-PSMA-617 στον καρκίνο του προστάτη: real world data και η ελληνική εμπειρία

Σ. Τσιούρης

10:20-10:30

Σχολιασμός: **Κ. Κουτσούκος, Ν. Παπαθανασίου**

Fulvestrant / Innovis

Fulvestrant

Abinone®

Abiraterone Acetate

Inepitant®

Aprepitant

Dexacort®

Dexamethasone


innovis
Future health today

INNOVIS PHARMA A.E.B.E.

Λεωφ. Κηφισίας 44

Μαρούσι, 15125

T:+30 2162005600

F:+30 2106664804

www.innovispharma.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «Κίτρινη Κάρτα»

ADP-Ado04-0625

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την
ΠΧΠ του προϊόντος η οποία είναι διαθέσιμη από
την εταιρεία εφόσον ζητηθεί

DEXACORT® SOLU.TAB 8MG/TAB X 30 tabs σε Alu-Alu blister
Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή
Λιανική Τιμή: 111,04€ Δ.Τ.5/2025

DEXACORT® SOLU.TAB 40MG/TAB BT X 10 tabs σε Alu-Alu blister
Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περικοσμένη
ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό & παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής
Λιανική τιμή: 249,08€ Δ.Τ.5/2025

FULVESTRANT/INNOVIS INJ.SO.PFS 250MG/5ML BT X 2 PFSYR (GLASS-TYPE 1) X 5 ML
+ 2 BEΛΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (BD Safety Glide)

Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή
Λιανική Τιμή: 264,51 € Δ.Τ. 5/2025
ABINONE® F.C.TAB 500MG/TAB BT X (60 X 1) TAB ΣΕ BLISTER (PVC/PVDC/AL) - UNIT DOSE

Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή
Λιανική Τιμή: 1554,33 € Δ.Τ. 5/2025
INEPITANT® CAPS 125MG/CAP BTx1 cap x 125 + 2 cap x 80MG σε blisters
(OPA/ALU/PVC/αλουμινίου)

Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή
Λιανική Τιμή: 26,81 € Δ.Τ. 5/2025



Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

10:30-12:00

Στρογγυλό τραπέζι: Ουρολογικός Καρκίνος (non-Prostate)

Προεδρείο: **Β. Πρωτογέρου, Δ. Ματθαίος, Μ. Σακκάς**

10:30-10:50

Ανοσοθεραπεία στο μη - και μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης: Τα νεότερα δεδομένα οδηγούν στην αύξηση της επιβίωσης; **Κ. Κουτσούκος**

10:50-11:10

Μεταστατικό ουροθηλιακό καρκίνωμα: Υπάρχει δυνατότητα «αμφισβήτησης» της EV-302/KEYNOTE A-39 στην 1^η γραμμή και σε ποιους ασθενείς; **Α. Καραδήμου**

11:10-11:30

Καρκίνωμα νεφρού - ουροδόχου κύστεως: τμηματική εκτομή, ενδείξεις, οφέλη και κίνδυνοι **Δ. Δεληγιάννης**

11:30-11:50

Μεταστατικό καρκίνωμα νεφρού: πώς επιλέγω την 1^η γραμμή θεραπείας στην αυγή του 2026; **Α. Τζοβάρας**

11:50-12:00

Σχολιασμός: **Β. Πρωτογέρου, Δ. Ματθαίος, Μ. Σακκάς**

12:00-12:10

Διάλειμμα καφέ

12:10-12:30

Διάλεξη

Προεδρείο: **Γ. Αγραφιώτης, Δ. Μαραγιάννη-Ντόβα**

Πόνος, ο μεγάλος εχθρός και φόβος του καρκινοπαθούς: πρακτικές συμβουλές για τον ιατρό της κοινότητας και αλγόριθμος στην αναλγητική αγωγή **Κ. Θεοδωράκη**

12:30-12:50

Διάλεξη

Προεδρείο: **Α. Γραφανάκη, Θ. Φλώρος**

Μεταστατικό μελάνωμα: έχει επιτευχθεί το μέγιστο στην επιβίωση των ασθενών ή το μέλλον επιφυλάσσει θετικές εξελίξεις; **Α. Λασκαράκης**



ΤΟ LUMYKRAS ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΕ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 240 mg ΑΝΑ ΔΙΣΚΙΟ



ΝΕΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΣΚΙΩΝ

4 x **240 mg**

Αντιστοιχεί στη συνιστώμενη δοσολογία των 960 mg 1 φορά την ημέρα¹

με 4 δισκία των 240 mg που οδηγεί σε καλύτερη συμμόρφωση²

Το LUMYKRAS® παραμένει διαλυτό για ασθενείς με δυσκολία στην κατάποση¹.

1. LUMYKRAS Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 2. Richter A et al. Clinical Therapy. 2003;25:2307–2335.

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Το προϊόν δεν είναι τιμολογημένο στην Ελλάδα, αναφέρεται προτεινόμενη τιμή 5.828 €.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

LUMYKRAS ΠΧΠ

ONCE-DAILY ORAL

LUMYKRAS®
(sotorasib)

AMGEN

Επισκεφθείτε
τη σελίδα μας
στο Facebook εδώ



Βεβαιωθείτε να είναι το φάρμακο στο οποίο έχετε αναφερθεί
ΣΑΕΣ τις αναπαραστάσεις εντύπων για ΣΑΕΣ το φάρμακο
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε φορά που λαμβάνετε ενέχυρο φάρμακο, με το όνομα φάρμακο
αναφέρετε στο Τμήμα Διασφάλισης Ενέργειας του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
(ΕΟΦ) Τμήμα, +30 2103440337, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας Διασφάλισης και στην
σελίδα του ΕΟΦ, www.efpi.gr ή στην ιστοσελίδα www.efpi.gr με τη χρήση του αριθμού
τηλεφώνου στην AMGEN Ελλάς Φαρμακοποιία Ε.Π.Ε. Τμήμα, +30 2103444700



Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

12:50-13:10

Διάλεξη

Προεδρείο: **Ι. Κυριαζάνος, Π. Παπακώστας**

Καρκίνωμα ορθού: ποιος ο ρόλος του χειρουργού στην εποχή του
Total Neoadjuvant Treatment;

Ο. Λύρος

13:10-13:30

Δορυφορική Διάλεξη

sponsored by **MERCK**

Προεδρείο: **Γ. Σκρουμπής, Ν. Αλεβιζόπουλος**

Τα νέα δεδομένα και πώς αλλάζουν το θεραπευτικό τοπίο στους
ασθενείς με mCRC και μετάλλαξη BRAF

Μ. Παυλάκης

13:30-13:50

Διάλεξη

Προεδρείο: **Δ. Μπούρος, Ι. Μούντζιος**

EGFR Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα - ποιο το
πιθανό ταξίδι του ασθενούς; Κλινικά παραδείγματα

Θ. Φλώρος

13:50-14:10

Διάλεξη

Προεδρείο: **Σ. Λουκίδης, Ε. Σαμαντάς**

Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα - είναι πιθανή η αύξηση
της επιβίωσης στα επίτεδα μη-Μικροκυτταρικού;

Ι. Μούντζιος

14:10-14:30

Διάλεξη

Προεδρείο: **Μ. Τόλια, Δ. Σπυροπούλου**

Η Ακτινοθεραπεία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης:
εφαρμογές και μελλοντικές προκλήσεις

Κ. Βερίγος

14:30-15:30

Μεσημβρινή Διακοπή - Ελαφρύ Γεύμα



Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΟΝ EGFR+ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΜΜΚΠ¹

Η ΠΡΩΤΗ ΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗ

ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

RYBREVENT[®] + LAZCLUZE[™]: cEGFR σε 1L^{1,2}



Το RYBREVENT[®] ενδείκνυται σε συνδυασμό με το LAZCLUZE[™] για τη θεραπεία πρώτης γραμμής ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) με διαγραφές στο Εξώνιο 19 του EGFR ή μεταλλάξεις υποκατάστασης L858R στο εξώνιο 21.^{1,2}

EGFR+: θετική μετάλλαξη EGFR, **ΜΜΚΠ:** μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα, **cEGFR:** κοινή μετάλλαξη EGFR, **1L:** πρώτης γραμμής. **ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ:** 1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος RYBREVENT[®] 2025. 2. LAZCLUZE[™] Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 2025.

Στο σύνολο δεδομένων του RYBREVENT[®] σε συνδυασμό με lazertinib, οι πιο συχνές ΑΕ οποιοδήποτε βαθμού ήταν εξάνθημα, τοξικότητα σπύλων και υποαλβουμιναιμία.¹ Για τον πλήρη κατάλογο των ΑΕ, βλέπε παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ.

Περιεκτικότητα	Μέγεθος συσκευασίας	Ενδεικτική Νοσοκομειακή τιμή
RYBREVENT INJ.SOL 1600MG/10ML (160MG/ML)	BT X 1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ X 10ML (160 MG/ML)	3.674,28 €
RYBREVENT INJ.SOL 2240MG/14ML (160MG/ML)	BT X 1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ X 14ML (160 MG/ML)	5.143,99 €

Περιεκτικότητα	Μέγεθος συσκευασίας	Ενδεικτική Νοσοκομειακή τιμή
LAZCLUZE F.C.TAB 80MG/TAB	BT X 56 TABS ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ PVC/PCTFE/ALU	6.073,30 €
LAZCLUZE F.C.TAB 240MG/TAB	BT X 28 TABS ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ PVC/PCTFE/ALU	6.073,30 €



Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος RYBREVENT[®] σκανάρετε εδώ



Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος LAZCLUZE[™] σκανάρετε εδώ

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέπει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.^{1,2}

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Janssen-Cilag Φαρμακευτική
Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ,
εταιρεία της Johnson & Johnson
Λεωφ. Ειρήνης 56
15121 Πεύκη, Αθήνα, Ελλάδα

Johnson&Johnson



Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

15:30-17:20

Στρογγυλό τραπέζι: **Καρκίνος Μαστού**

Προεδρείο: **Χ. Χριστοδούλου, Χ. Χαρίσης**

15:30-15:50

Χειρουργική μαστού και Αιτωλοακαρνανία - είναι δυνατή η εφαρμογή αποτελεσματικής, σύγχρονη χειρουργικής στο Νομό;

Δ. Κορωνάρχης

15:50-16:10

Ορμονικά θετικός/HER2 αρνητικός καρκίνος μαστού - επικουρική θεραπεία, νεότερα δεδομένα;

Ε. Ρεσ

16:10-16:30

HR+HER2- καρκίνωμα μαστού: Ποιος ο απαιτούμενος γονιδιακός έλεγχος και ποια η σημασία του στην επιλογή της θεραπείας μας;

Μ. Πρεβεζάνου

16:30-16:50

HR-HER2 low μεταστατικό καρκίνωμα μαστού στην υποτροπή: η μάχη των ADCs; Sacituzumab Govitecan vs Trastuzumab Deruxtecan

Π. Μπαξεβάνος

16:50-17:10

Τριπλά αρνητικό καρκίνωμα του μαστού με υπολειπόμενη νόσο μετά την προεγχειρητική θεραπεία: Ποια η βέλτιστη επικουρική επιλογή;

Σ. Καραγεωργοπούλου

17:10-17:20

Σχολιασμός: **Χ. Χριστοδούλου, Χ. Χαρίσης**

17:20-18:30

Στρογγυλό τραπέζι: **Γυναικολογικός Καρκίνος**

Προεδρείο: **Α. Κούτρας, Α. Νικολακόπουλος**

17:20-17:40

Καρκίνος ενδομητρίου: ανοσοχημειοθεραπεία για όλες τις ασθενείς ή επιλογή με βάση το μοριακό υπότυπο;

Ε. Σκαφίδα

17:40-18:00

Τοπικά προχωρημένος καρκίνος τραχήλου μήτρας: υπάρχει ουσιαστική βελτίωση στην επιβίωση; Ποιος ο νέος θεραπευτικός αλγόριθμος;

Ε. Λιανός

18:00-18:20

Καρκίνος ωοθηκών: πώς διαμορφώνεται ο θεραπευτικός αλγόριθμος στην πλατινοανθεκτική νόσο;

Μ. Λιόντος

18:20-18:30

Συζήτηση - προβληματισμοί

18:30-18:40

Διάλειμμα καφέ

Letrafem®

Δισκία λετροζόλης

2.5 mg

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα
πιο ασφαλή και αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ARITI A.E. ΑΘΗΝΑ: Λεωφ. Τατοΐου 52,
13677 Αχαρνές
Τηλ.: 210 8002650 - Fax: 210 6207503
www.ariti.gr - info@ariti.gr

ariti®

στη
στον άνθρωπο



Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

18:40-20:30

Στρογγυλό τραπέζι: Γαστρεντερολογικός Καρκίνος

Προεδρείο: **Χ. Καλόφωνος, Σ. Κόκκαλη, Χ. Τσολιάς**

18:40-19:00

Μη-μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα οισοφάγου-στομάχου:
KEYNOTE-585 - MATERRHORN: αντίθετα αποτελέσματα
στην ίδια νόσο - τι μας διδάσκει αυτό;

Μ. Καραμούζης

19:00-19:20

Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα - ποια η συμβολή
των χαρακτηριστικών του ασθενούς στην επιλογή
της θεραπείας;

Ν. Καποδίστριας

19:20-19:40

Χολαγγειοκαρκίνωμα - εξελίξεις στην αντιμετώπιση της
προχωρημένης - ανεγχείρητης νόσου

Ν. Χαραλαμπίκης

19:40-20:00

Αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου με μικροδορυφορική
αστάθεια/POLE (POLD1) μεταλλαγή: ποιος ο ρόλος της
ανοσοθεραπείας, μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως την
επικουρική χημειοθεραπεία;

Γ. Γομάτου

20:00-20:10

Σχολιασμός: **Σ. Κόκκαλη**

20:10-20:30

Λήξη - Συμπεράσματα



Fentanyl/Sandoz

Fentanyl citrate



100 µg



200 µg



300 µg



400 µg

Το μέγεθος των δισκίων που απεικονίζονται δεν είναι πραγματικό.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ειδική ιατρική συνταγή του Ν 3459/06 περί ναρκωτικών (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ').

FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 100MCG/TAB BTx30x1 Λ.Τ.: 88,01 €, FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 200MCG/TAB BTx30x1 Λ.Τ.: 92,73 €, FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 300MCG/TAB BTx30x1 Λ.Τ.: 103,20 €, FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 400MCG/TAB BTx30x1 Λ.Τ.: 103,20 €



Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

Η έντυπη μορφή της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του

Προϊόντος είναι επίσης διαθέσιμη από την εταιρεία Lavipharm Hellas A.E.,

τηλ.: 210 6691 000, e-mail: SafetyGreece@lavipharm.com

FENT/SAND/poster/LAV/02.2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Lavipharm Hellas A.E.

Οδός Αγίας Μαρίας, 190 02 Παιανία Αττικής

Τηλ.: 210 6691 000

www.lavipharm.com

SANDOZ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Sandoz Pharmaceuticals d.d., Veronškova
ulica 57, SI-1000 Ljubljana, Σλοβενία.

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Φραγκοκκλησιάς 7B, 151 25 Μαρούσι
Τηλ.: +30 216 600 5000





// Πρόεδροι - Ομιλητές - Σχολιαστές

Αγραφιώτης Γεώργιος	MD, MSc, Γενικός Οικογενειακός Ιατρός, Επιμελητής Α', Π.Ι. Παναιτωλίου, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου
Ακινόσογλου Καρολίνα	Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Αναπλήρωτρια Καθηγήτρια Ιατρικού Τμήματος, Πανεπιστήμιο Πατρών, Παθολογική Κλινική και Τμήμα Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. Πατρών
Αλεβιζόπουλος Νεκτάριος	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Βερίγος Κοσμάς	MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Διευθυντής Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής, 401 Γ.Σ.Ν.Α., Επιστημονικός Συνεργάτης, Ακτινοθεραπευτικό-Ογκολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο «Ιαώ»
Γκιργκίνη Μαρία	Αξιωματικός Νοσηλεύτρια, MSc, Υπεύθυνη Βραχείας Νοσηλείας, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Γομάτου Γεωργία	Παθολόγος Ογκολόγος, Εντεταλμένη Διδάσκουσα, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικών»
Γραφανάκη Αικατερίνη	Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Μέλος ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Πατρών
Γρίβας Αναστάσιος	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Β' Παθολογική-Ογκολογική Κλινική - Μονάδα Μεταμόσχευσης, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Γώγος Χαράλαμπος	Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής, Παθολογική-Λοιμωξιολογική Κλινική, «Metropolitan General», Συντονιστής Ελληνικής Ομάδος Μελέτης της Σήψης, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS
Δεληγιάννης Δημήτριος	MD, MSc, PhD, FEBU, FRCS, Επικ. Καθηγητής Ουρολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Γ' Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικών»
Δεμίρη Σταματίνα	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια, Γ' Ογκολογική Κλινική, «Metropolitan General», π. Διευθύντρια Β' Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Πρόεδρος Ε.Ε.Ν.Ο.
Δημητρακόπουλος Φωτεινός-Ιωάννης	MD, BTh, MSc, PhD Παθολόγος Ογκολόγος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας & Πειραματικής Ογκολογίας, Ογκολογικό Τμήμα & Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εμμανουήλ Θεόδωρος	MD, PhD, FEBGH, Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Ηπατολογικής Κλινικής, «Metropolitan General»
Ζώτος Παναγιώτης	Παθολόγος-Εντατικολόγος, Αγρίνιο
Θεοδωράκη Κασσιανή	Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας Ε.Κ.Π.Α., Διευθύντρια, Α' Αναισθησιολογική Κλινική, Κέντρο Πόνου & Παρηγορικής Αγωγής, Νοσοκομείο «Αρεταίειο»
Καλόφωνος Χαράλαμπος	Παθολόγος Ογκολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, Ολύμπιο Θεραπευτήριο, Πάτρα
Καπέτσης Γεώργιος	Μοριακός Βιολόγος, Medical Manager, Genekor I.A.E.

Preveloda®

Capecitabine

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΣΕ **ΙΔΙΩΤΙΚΑ**
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ &
ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΤΟΥ **ΕΟΠΥΥ**



Λ.Τ.: € 104,92

Δελτίο Τιμών 31/12/2024



Pharmazac S.A.
pharmazac@pharmazac.com

Αναστάσιου Ζαρολιάγκη 1
& Δημήτριου Λάμπρου 6
ΒΙΟ.Π.Α. Κερατέας, 190 01 Κερατέα
Τ: 210 341 8889 – 95 & 210 866 1260 – 2

pharmazac.com | 

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



PRV06/YB/02.2025/ADV



Καποδίστριας Νικόλαος	PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Κέρκυρας «Αγία Ειρήνη»
Καραγεωργοπούλου Σοφία	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια, Γ' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Ιασώ»
Καραδήμου Αλεξάνδρα	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια, ΣΤ' Ογκολογική Κλινική, «Metropolitan General»
Καραμούζης Μιχαήλ	Παθολόγος Ογκολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
Κατσαούνη Παρασκευή	Αιματολόγος, Αγρίνιο
Κατσουράκης Γεώργιος	Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Αγρίνιο
Κόκκαλη Στεφάνια	MD, MSc, Επιμελήτρια Α' Παθολογικής Ογκολογίας, Β' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Κορωνάρχης Δημήτριος	MD FEBS, Χειρουργός Ειδικός Μαστολόγος, Διευθυντής Γ' Κλινικής Μαστού, «Metropolitan General», Υπεύθυνος Μαστολογικού Ιατρείου, Γενική Κλινική «Ιπποκράτειο Ίδρυμα Αγρινίου»
Κουκοπούλου Ειρήνη	Διευθύντρια Παθολογικής Κλινικής, Γενική Κλινική «Ιπποκράτειο Ίδρυμα Αγρινίου»
Κούτρας Άγγελος	Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. Πατρών
Κουτσούκος Κωνσταντίνος	Παθολόγος Ογκολόγος, Β' Ογκολογική Κλινική, «Metropolitan Hospital»
Κυριαζάνος Ιωάννης	MD, MSc, PhD, FESPSO, Διευθυντής, Τμήμα Χειρουργικής Ογκολογίας, Mediterraneo Hospital, Διευθυντής, Α' Χειρουργική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος	MD, MSc, FEBTS, Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής, Α' Θωρακοχειρουργική Κλινική - Κλινική Ρομποτικής και Θωρακοσκοπικής Χειρουργικής, «Metropolitan General»
Λασκαράκης Απόστολος	MD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος και Κέντρου Κλινικών Μελετών, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Λιανός Ευάγγελος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Παθολογικό-Ογκολογικό Τμήμα, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Λιόντος Μιχαήλ	Παθολόγος Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Θεραπευτικής Ογκολογίας ΕΚΠΑ, Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Λουκίδης Στυλιανός	Πνευμονολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Πρόεδρος ΔΣ Ε.Π.Ε.
Λύρος Ορέστης	MD, PhD, FACS, FEBS/MIS, Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Μαραγιάννη-Ντόβα Δήμητρα	Ιατρός Αναισθησιολόγος, Αλγολόγος, Αγρίνιο

LONQUEX[®]

lipegfilgrastim



teva

Τιμές πώλησης:

LONQUEX INJ.SOL 6MG/0,6ML PF.SYR BTx1 PF.SYRx0,6ML

N.T.

404,08€

LONQUEX INJ.SOL 6MG/0,6ML VIAL BT X 6 VIALS X 0,6 ML

2.150,51€

Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές.

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της Θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Τοπικός Αντιπρόσωπος : TEVA HELLAS A.E.

Έδρα: Λεωφ. Κηφισίας 44, 151 25, Μαρούσι. Τ: 210 8805000, F: 210 8805120,
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000228201000. www.teva.gr

Κ.Α.Κ.: Teva B.V., Swensweg 5, 2031,GA Haarlem, Ολλανδία

Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρετε το QR code ή απευθυνθείτε στην εταιρεία στο τηλέφωνο 21 18805000



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Μαραγκούλη Ελένη	Παθολόγος Ογκολόγος, Α΄ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Τρικάλων
Μαρζινιέ Μισιέλ	Γαστρεντερολόγος, Αγρίνιο
Ματθαίος Δημήτριος	Αναπληρωτής Καθηγητής Ογκολογίας, Διευθυντής, Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Μαυραγάνης Χρήστος	Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, τ. Αναπληρωτής Διευθυντής Πανεπιστημιακής Γυναικολογικής Κλινικής Witten-Herdecke
Μητρομάρας Αθανάσιος	Παθολόγος, Αγρίνιο
Μούντζιος Ιωάννης	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Δ΄ Ογκολογική Κλινική και Μονάδα Κλινικών Μελετών, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Μπαζάκα Χρύσα	Ιδιώτης Πνευμονολόγος, Αγρίνιο
Μπαξεβάνος Παναγιώτης	Παθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Ε΄ Ογκολογική Κλινική, «Metropolitan General»
Μπαρέ Ελπίδα	Νοσηλεύτρια, MSc, BSc, Αναπληρώτρια Διευθυντήρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Ο.Μ. «Αγρίνιο»
Μπούρος Δημοσθένης	MD, PhD, FERS, FAPSR, FCCP, MAE, Ομότιμος Καθηγητής Πνευμονολογίας Ε.Κ.Π.Α., Τακτικό Μέλος Academy of Europe, Επίτιμος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Νάση Δέσποινα	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Νικολακόπουλος Αθανάσιος	Χειρουργός Μαιευτήρας-Γυναικολόγος
Παναγιωτόπουλος Γεώργιος	Νοσηλευτής, Προϊστάμενος ΜΕΘ, Γενική Κλινική «Ιπποκράτειο Ίδρυμα Αγρινίου»
Παπαβασιλείου Γεράσιμος	Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Θωρακοχειρουργική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Παπαγεωργίου Δημήτριος	Αναπληρωτής Καθηγητής Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Προϊστάμενος Τμήματος Ειδικών Θεραπειών και Εκπαίδευσης, «Ευρωκλινική Αθηνών», Β΄ Αντιπρόεδρος Ε.Σ.Ν.Ε., Πρόεδρος Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας Ε.Σ.Ν.Ε.
Παπαδημητρόπουλος Κωνσταντίνος	Πυρηνικός Ιατρός, Μονάδα PET/CT Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής, Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»
Παπαθανασίου Νικόλαος	Επίκουρος Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής & PET/CT, Π.Γ.Ν. Πατρών
Παπακώστας Παύλος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Β΄ Ογκολογική Κλινική, «Metropolitan General»



Lonsurf®
τριφλουριδίνη/τιπιρακίλη



**Στον ορίζοντα
η 3^η γραμμή
mCRC**



Lonsurf® + bevacizumab¹⁻²

1. LONSURF® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος. 2. Prager GW et al. N Engl J Med.2023;388(18):1657-1667.

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ιατρού.



Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάρετε τον κωδικό QR.

Για την έντυπη μορφή της ΠΧΠ, παρακαλείσθε να απευθύνεστε στον τοπικό Αντιπρόσωπο του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας

Η άδεια κυκλοφορίας για το LONSURF® έχει χορηγηθεί στη Servier από την Taiho, αναπτύσσεται και από τις δύο εταιρείες παγκοσμίως και διατίθεται στα αντίστοιχα εδάφη δικαιοδοσίας της καθεμιάς.

SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ.
Φραγκοκκλησιός 7, 15125 Μαρούσι.
Τηλ 210 9391000, www.servier.gr

SERVIER 
moved by you

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα Φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Lonsurf (15+6,14) mg/tab BTx20: ΛΤ: € 552,62 NT: € 430,04
Lonsurf (15+6,14) mg/tab BTx60: ΛΤ: € 1.653,03 NT: € 1.351,45
Lonsurf (20+8,19) mg/tab BTx20: ΛΤ: € 723,24 NT: € 573,33
Lonsurf (20+8,19) mg/tab BTx60: ΛΤ: € 2.184,63 NT: € 1.799,07
(Σε περίπτωση τροποποίησης του Δ.Τ. ισχύουν οι νεότερες τιμές)



Παυλάκης Μιχαήλ	MD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, «Metropolitan General»
Πιστιόλας Δημήτριος	Γαστρεντερολόγος, Μεσολόγγι, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
Πλιάκου Ευαγγελία	Παθολόγος Ογκολόγος, MSc, MPH, PhDc, Ογκολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Ε' Ογκολογική Κλινική, «Metropolitan General»
Πουλή Πηνελόπη	Πλοίαρχος ΥΝ, MSc, Προϊσταμένη Τμήματος Βραχείας Νοσηλείας, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Πρεβεζάνου Μαρία	Παθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. Πατρών
Πρωτογέρου Βασίλειος	Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδrolόγος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Επισκέπτης Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, European University of Cyprus (EUC), Διευθυντής, Ε' Ουρολογική Κλινική, «Metropolitan General», Επιστημονικός Διευθυντής Androclinic
Ρεζ Ελένη	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Σακκάς Μάριος	MD, Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδrolόγος, Αγρίνιο
Σαλούστρος Εμμανουήλ	Αν. Καθηγητής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΟΠΕ
Σαμαντάς Επαμεινώνδας	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Β' Ογκολογική Κλινική, «Metropolitan Hospital»
Σαμψώνας Φώτιος	Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Επεμβατικής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Σκαφίδα Ευθυμία	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Νοσοκομείο «Αρεταίειο», Νοσοκομείο «Ιασώ»
Σκούρα Ευαγγελία	MSc, PhD, Πυρηνικός Ιατρός, Υπεύθυνη PET/CT, Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Σκρουμπής Γεώργιος	Καθηγητής Χειρουργικής, Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών
Σπυροπούλου Δέσποινα	Επίκουρη Καθηγήτρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών
Στραβοδής Κωνσταντίνος	Χειρουργός Ουρολόγος, Καθηγητής Ουρολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
Συρίγος Κωνσταντίνος	Καθηγητής Παθολογίας & Ογκολογίας, Διευθυντής, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
Τζοβάρας Αλέξανδρος	PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Α' Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Τόλια Μαρία	Αν. Καθηγήτρια Ακτινοθεραπείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθύντρια, Εργαστήριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου

TOGETHER AGAINST CANCER

40
YEARS

of oncology
experience...



...delivering clinically
meaningful treatments
to patients in need^{1,9}

NAVELBINE®
vinorelbine



Javlor®
vinflunine

EBVALLO®
tabelecleucel

BRAFTOVI®
(encorafenib)

MEKTOVI®
(binimetinib)

nerlynx®
(Neratinib)

Βιβλιογραφία: 1. Dummer R, et al. COLUMBUS 5-Year Update: A Randomized, Open-Label, Phase III Trial of Encorafenib Plus Binimetinib Versus Vemurafenib or Encorafenib in Patients With BRAF V600-Mutant Melanoma. *J Clin Oncol.* 2022 Dec 20;40(36):4178-4188; JCO.21.02659. 2. Tabernero J, Grothey A, Van Cutsem E et al. Encorafenib plus cetuximab as a new standard of care for previously treated BRAF V600E-mutant metastatic colorectal cancer: updated survival results and subgroup analyses from the BEACON study. *J Clin Oncol* 2021;39:273-284. 3. Chan A, et al. Neratinib after trastuzumab-based adjuvant therapy in patients with HER2-positive breast cancer (ExteNET): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. *Lancet Oncol.* 2016;17(3):367-377. 4. Mahadeo, K.M. et al. [2024]. Tabelecleucel for allogeneic haematopoietic stem-cell or solid organ transplant recipients with Epstein-Barr virus-positive post-transplant lymphoproliferative disease after failure of Rituximab or rituximab and chemotherapy (allele): A phase 3, Multicentre, open-label trial. *The Lancet Oncology, January 2024.* 5. Marty M, Fumoleau P, Adenis A, et al. "Oral vinorelbine pharmacokinetics and absolute bioavailability study in patients with solid tumors: results from two phase I studies." *Ann Oncol.* 1994. 6. Weber BL, Vogel C, Jones SE, et al. "Phase II trial of vinorelbine as first-line chemotherapy in women with advanced breast cancer." *J Clin Oncol.* 1995. 7. Le Chevalier T, Brisgand D, Douillard JY, et al. "Randomized study of vinorelbine and cisplatin versus vindesine and cisplatin versus vinorelbine alone in advanced non-small-cell lung cancer: results of a European multicenter trial including 612 patients." *J Clin Oncol.* 1994. 8. Bellmunt J, Théodore C, Demkov T, et al. "Phase III trial of vinflunine plus best supportive care compared with best supportive care alone after a platinum-containing regimen in patients with advanced transitional cell carcinoma of the urothelial tract." *J Clin Oncol.* 2009. 9. Riely GJ, et al. *J Clin Oncol* 2023;41(21):3700-3711.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε τις περιλήψεις χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση (Braftovi): 75 mg σκληρά καψάκια. Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 75 mg encorafenib.

Νοσοκομειακή τιμή (CAPS 15MG): € 927,57, % επικορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση (Mektovi): Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 15 mg binimetinib. Έκδοχο με γνωστή δράση. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 133,5 mg μονοϋδρικής Λακτόζης.

Νοσοκομειακή τιμή (TABS 15MG): €1.551,66, % επικορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση (Nerlynx): Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει μηλαινική νερατίνινη, ισοδύναμη με 40 mg νερατίνινης.

Νοσοκομειακή τιμή: € 3.147,62, % επικορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό γιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση (Navelbine): Κάθε μαλακό καψάκιο περιέχει 20 mg βινορελβίνης ως διπρυγική. Κάθε μαλακό καψάκιο περιέχει 30 mg βινορελβίνης ως διπρυγική. Έκδοχο με γνωστή δράση. Κάθε δόση των 20 mg και 30 mg μαλακό καψάκιο περιέχει αιθανόλη, σορβιτόλη (E420).

Νοσοκομειακή τιμή (CAPS 20MG): €25,52 | **(CAPS 30MG):** €38,18, % επικορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Με περιορισμένη ιατρική συνταγή, μόνο για νοσοκομειακή χρήση.

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση (Javlor): Ένα ml πυκνού διαλύματος περιέχει 25 mg vinflunine (ως dihydrate). Ένα φιαλίδιο των 2 mL περιέχει 50 mg vinflunine (ως dihydrate). Ένα φιαλίδιο των 4 mL περιέχει 100 mg vinflunine (ως dihydrate). Ένα φιαλίδιο των 10 mL περιέχει 250 mg vinflunine (ως dihydrate).

Νοσοκομειακή τιμή (25MG/ML - 2MLX 1FL): €157,49 | **(25MG/ML - 10MLX 1FL):** €787,49, % επικορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Με περιορισμένη ιατρική συνταγή, μόνο για νοσοκομειακή χρήση.

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση (Ebvallo): Κάθε φιαλίδιο περιέχει 1 mL παραδοτέου όγκου Ebvallo σε συγκέντρωση 2,8x10⁷ - 7,3x10⁷ βιάσμα T κύτταρα/mL ενέσιμη διασπορά. Οι ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με την πραγματική συγκέντρωση, το προφίλ HLA και τον υπολογισμό της δόσης του ασθενούς παρέχονται στο φύλλο πληροφοριών παρτίδας (LIS) που περιλαμβάνεται στον δοχείο μεταφοράς του φαρμακευτικού προϊόντος.

Νοσοκομειακή τιμή: € 68.445,00, % επικορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Φαρμακευτικό προϊόν σωματοκυτταρικής θεραπείας. Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εκπαίδευση σύμφωνα με τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που περιγράφονται στο Παρ. II της Α.Κ.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενο ανεπιθύμητο ενέργειας.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.

©2025 Pierre Fabre, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.

Το BRAFTOVI® αποτελεί εμπορικό σήμα της Array BioPharma Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε διάφορες άλλες χώρες.

Το MEKTOVI® αποτελεί εμπορικό σήμα της Array BioPharma Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε διάφορες άλλες χώρες.

Το NERLYNX® αποτελεί εμπορικό σήμα της Puma Biotechnology Inc.

Το JAVLOR® αποτελεί εμπορικό σήμα της PIERRE FABRE MEDICAMENT.

Το NAVELBINE® αποτελεί εμπορικό σήμα της PIERRE FABRE MEDICAMENT.

Το EBVALLO® αποτελεί εμπορικό σήμα της PIERRE FABRE MEDICAMENT.



LABORATOIRES

Pierre Fabre

New ways to care

Διεύθυνση: Αγησιόλου 6-8, 15123 Μαρούσι, Τηλ. επικοινωνίας: 210-7234582

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΤΙΡΗΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Τσιούρης Σπυρίδων

Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Πυρηνικής Ιατρικής, Κλινικό Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής,
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Τσολιάς Χρυσόστομος

Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Β', Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

Τσουκαλάς Νικόλαος

MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, MSc Βιοπληροφορική, Διευθυντής,
Ογκολογικό Τμήμα, 417 Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., Επιστημονικός Συνεργάτης, «Ερρίκος
Ντυνάν» Hospital Center

Φεργάδης Ευάγγελος

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Β' Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής,
Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Φλώρος Θεοφάνης

Παθολόγος Ογκολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός, Διευθυντής, Ε' Ογκολογική
Κλινική, «Metropolitan General», Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική, Ναυτικό
Νοσοκομείο Αθηνών

Φούντζηλας Χρήστος

MD, FACP, Medical Oncologist, Co-Leader, Gastrointestinal Clinical Disease
Team, Associate Director for Solid Tumors, Early Phase Clinical Trials Program,
Department of Medicine, Roswell Park Comprehensive Cancer Center

Χαλμούκη Παναγιώτα

MSc, Ειδικός Παθολόγος, Επιμελήτρια Β' Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν.
Αιτωλοακαρνανίας, Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου

Χαραλαμπάκης Νικόλαος

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α' Παθολογικού-Ογκολογικού
Τμήματος, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Χαρίσης Χαράλαμπος

Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής - Μεταμοσχεύσεων, Μονάδα Παθήσεων
Μαστού, Χειρουργικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Χριστοδούλου Χρήστος

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Β' Ογκολογική Κλινική, «Metropolitan
Hospital»



vegzelma™ ▼

bevacizumab

Το ταξίδι της ζωής συνεχίζεται

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περιήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από τον Κ.Α.Κ.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ : Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από ιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία

Ενδείκνυται για τη θεραπεία σε ενήλικες ασθενείς

▼ Αυτό το φάρμακο τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών

Λιανική τιμή : VEGZELMA C/S.SOL.IN 25MG/ML BT X 1 VIAL X 16ML / Λ.Τ.: 572,61 € VEGZELMA C/S.SOL.IN 25MG/ML BT X 1 VIAL X 4ML / Λ.Τ.: 161,00 €



BIANEX A.E.
ΕΙΣΟΔΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEX A.E. - Έδρα: Οδός Βαρυμπίστης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά,
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία, Τηλ.: 210 8009111 • Fax: 210 8071573
E-mail: mailbox@bianex.gr • WEBSITE: www.bianex.gr • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδémου 113,
562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης • Τηλ.: 2310 861683
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

 **HEALTHCARE
CELLTRION**

Παρακαλείται να γίνει το φάρμακο πιο ασφαλές και
Αποφάσεις
ΟΔΕΣ οι αναμενόμενες ενέργειες για
ΟΔΕ το φάρμακο
Συμπληρώνοντας την «ΚΕΤΡΟΝ ΚΑΡΤΑ»

BE-25006-VEG-4/2025

// Διοργάνωση

Εταιρεία Μελέτης και Εφαρμογής Εξατομικευμένων
Αντινεοπλασματικών Θεραπειών Δυτικής Ελλάδας

// Υπό την Αιγίδα

Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου
Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας
Metropolitan General

// Ημερομηνία

23-24 Ιανουαρίου 2026

// Χώρος διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Corali
6^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αγρινίου-Αντιρρίου
Τ.Κ. 30100, Αγρίνιο
Τηλ.: 26410 50885

// Εγγραφές

Η εγγραφή και η παρακολούθηση επιτρέπεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να πιστοποιήσουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα (όπως η ταυτότητα ιατρικού ή φαρμακευτικού συλλόγου, νοσηλευτική ή φοιτητική ταυτότητα).

// Οδηγίες παρακολούθησης με φυσική παρουσία

Όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία θα πρέπει να προσέλθουν στον χώρο διεξαγωγής για την εγγραφή τους ή να πραγματοποιήσουν προεγγραφή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.events.gr. Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό barcode που θα πρέπει να σκανάρουν κατά την είσοδο και έξοδο τους, στην αίθουσα.

// Οδηγίες διαδικτυακής παρακολούθησης

Η Επιστημονική εκδήλωση θα προβάλλεται ταυτόχρονα διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας www.livemed.gr. Εάν είστε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο Livemed (πατήστε στο πεδίο Register / Εγγραφή).



Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών.



Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε από το μενού την κατηγορία Live, το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο Go Live ή Go Virtual.



Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγεται από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την «Αίθουσα Συνεδριάσεων».



Viloxidon®

Oxycodone

πόσιμο διάλυμα οξυκωδόνης



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
επιφύλαξε
ΟΜΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΑΑ το φάρμακο
συμπληρώνοντας την "ΚΥΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Vita Longa

Σημείωση: Εφόσον επιθυμείτε να παραλάβετε πιστοποιητικό, είναι απαραίτητο μετά τη σύνδεσή σας στο Livemed να μεταβείτε στην εικονική «Γραμματεία Συνεδρίου» και να ολοκληρώσετε την «Εγγραφή» σας στην επιστημονική εκδήλωση πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο, ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος παρακολούθησης.

// Παραλαβή πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, μετά το πέρας των εργασιών της Διημερίδας σε όσους συνέδρους έχουν εγγραφεί και παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης. Σημείωση: Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα για λήψη έως 12 μήνες από τη λήξη της εκδήλωσης.

Η εκδήλωση καλύπτεται φωτογραφικά, βιντεοσκοπείται και προβάλλεται σε ζωντανή μετάδοση.

// Γραμματεία Διημερίδας



Events & Travel Solutions

Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη, **Τηλ.:** 210 98 80 032

Website: www.events.gr • **E-mail:** ets@events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η Ε.Τ.Σ. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr.



// Χορηγοί

AMGEN

ariti®
next to human

astellas

AstraZeneca

BAYER
Bayer

BIANEE
BIOMEDICAL PHARMACEUTICALS
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Bristol Myers Squibb

Daiichi-Sankyo

ELPEN

FARAN
ONCOLOGY

Galenica

Genekor
Committed to Biotechnological Innovation

GENESIS
pharma

GSK

innovis
Future health today

IPSEN

Johnson&Johnson

Lavipharm

Lilly
ΦΑΡΜΑΣΕΥΣ

MERCK

METROPOLITAN
GENERAL

MSD

Pierre Fabre
FARMACA S.A.

PharmaZac

RAFARM


Roche

SERVIER
moved by you

teva

VitaLonga
PHARMACEUTICAL COMPANY

WinMedica



.....
E.T.S. Events & Travel Solutions (2026) ®
.....

