

Σε συνεργασία με:

Ε' Παθολογική – Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Υγεία»

Α' Παθολογική – Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

2^η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Οι Σημαντικότερες Εξελίξεις στην Ογκολογία



Επιστημονικό
Πρόγραμμα

28 Ιανουαρίου
2026

Απευθείας μετάδοση
www.livemed.gr

WEB
ONLY



Η πρώτη και μοναδική νεότερη ορμονική θεραπεία που έχει εγκριθεί τόσο για τον mHSPC όσο και για τον pmHSPC με BCR υψηλού κινδύνου * 1-4

Δράστε αστραπιαία με XTANDITM στον HSPC!*

Όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα.⁵⁻⁷

Ανεξάρτητα από το αν οι ασθενείς με HSPC έχουν ήδη ή βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν μεταστάσεις.⁵⁻⁷

HSPC: ορμονοεξαρτώμετος καρκίνος του προστάτη, pmHSPC: μη μεταστατικός ορμονοεξαρτώμετος καρκίνος του προστάτη, mHSPC: μεταστατικός ορμονοεξαρτώμετος καρκίνος του προστάτη, BCR: βιοχημική υποτροπή

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Βιβλιογραφικές αναφορές:

1. ΠΩΠ Ενζαλουταμίδης. 2. ΠΩΠ Αμπερατρονός. 3. ΠΩΠ Απαλουταμίδης. 4. ΠΩΠ Ντορλουταμίδης. 5. Armstrong AJ et al. Eur Urol 2023;84(2):229–241. 6. Freedland SJ et al. N Engl J Med 2023;389(16):1453–1465. 7. Armstrong AJ et al. J Clin Oncol 2022;40(15):1616–1622.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Για την ένταση ΠΩΠ παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας:
Ελλάδα, Astellas Pharmaceuticals AEBE, Τηλ: +30 210 8189900

Xtandi Ελλάδα: Κουτί x 112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία - 40 mg /TAB - Νοσοκομειακή τιμή: €2.254,60, Λιανική τιμή με ΦΠΑ: €2.724,48

*Στον HSPC, το XTANDITM ενδείκνυται για ασθενείς με mHSPC και με pmHSPC με BCR υψηλού κινδύνου που είναι ακατάλληλοι για ακτινοθεραπεία διάστασης.¹

Οι συνηθέστερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι εξασθένιση κόπωση, εξόφλη, υπέρταση, κατάθλιψη και πτώσεις¹

XTA/ADV 1/07.2025

Σκανάρετε εδώ για την ΠΩΠ



Astellas Pharmaceuticals A.E.B.E.
Λεωφόρος Κηφισίας 7 & Νεαπόλεως 2,
15123 Μαρούσι
Τηλ. 210 8189 900, Fax: 216 8008 998
www.astellas.com/gr



Χαιρετισμός

Αγαπητοί φίλοι,

Η χρονιά που μόλις ολοκληρώθηκε συνοδεύτηκε από έντονη κινητικότητα στην Παγκόσμια Ογκολογική κοινότητα σε ερευνητικό και κλινικό επίπεδο. Το εύρος αυτών των ερευνητικών πρωτοβουλιών και των αντίστοιχων επιστημονικών ανακοινώσεων, είναι τόσο εκτεταμένο και διαρκές που χρήζει προσεκτικής διαβάθμισης και αναλυτικής αρχειοθέτησης.

Η επιστημονική μας προσπάθεια, στα πρώτα της γενέθλια, στοχεύει στην ουσιαστική ανασκόπηση των σημαντικότερων ανακοινώσεων του προηγούμενου έτους και μία δεύτερη ματιά των επιμέρους χαρακτηριστικών τους με δημιουργικό σχολιασμό από τους πλέον έμπειρους συναδέλφους στον κάθε τομέα.

Με ιδιαίτερη χαρά και ταυτόχρονη τιμή σας προσκαλούμε στη Διαδικτυακή Ετήσια Ανασκόπησή μας και ευελπιστούμε στην ενεργή συμμετοχή όλων σας.

Με εκτίμηση,

Οι Πρόεδροι του Συνεδρίου

Κωνσταντίνος
Τσιγαρίδας

Παθολόγος - Ογκολόγος,
Αναπληρωτής Διευθυντής,
Ε' Παθολογική - Ογκολογική
Κλινική, Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία»

Αλέξανδρος
Τζοβάρας

PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος,
Επιμελητής Α', Α' Παθολογική-
Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α.
«Ο Άγιος Σάββας»

Ιωάννης
Κωτσαντής

Παθολόγος - Ογκολόγος,
Επίκουρος Καθηγητής
Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,
Β' Π.Π.Κ., Π.Γ.Ν. «Αττικόν»



ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

- Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 300 mg δαρολουταμίδης.
- Έκδοχο με γνωστή δράση: κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 186 mg μονοϋδρικής λακτόζης

Λιανική τιμή: 3031.95 €



Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας:
Bayer AG 51368, Leverkusen, Γερμανία

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αγησιλάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα
Τηλ: 210 6187500, Αρ. ΓΕΜΗ: 000299101000

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης
Τηλ: +30 210 6187742, Φαξ: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που θα βρείτε σαράννοντας το QRC ή ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/nubeqa-epar-product-information_el.pdf, Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: Ιούλιος 2025

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται
ιατρική συνταγή
ΟΛΕΣ τής ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

PP-NUB-GR-0117-1
09.2025



Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΤΕΤΑΡΤΗ

28 Ιανουαρίου

2026

16:00 - 17:00

Καρκίνος Πνεύμονα

Προεδρείο: **Σ. Αγγελάκη, Ε. Γεωργιαννάκης**

16:00 - 16:15

Στοχεύουσες θεραπείες στον NSCLC

Α. Πανταζόπουλος

16:15 - 16:30

Νεότερος αλγόριθμος ανοσοθεραπείας στον NSCLC

Γ. Νίντος

16:30 - 16:45

Εξελίξεις στη θεραπεία του SCLC

Γ. Αρδαβάνης Λουκέρης

16:45 - 17:00

Σχολιασμός: **Μ. Νικολάου**

17:00 - 18:00

Καρκίνος Μαστού

Προεδρείο: **Δ. Κατσώχη, Α. Στριμπάκος, Δ. Τρυφωνόπουλος**

17:00 - 17:25

Highlights from ASCO

Μ. Αναστασίου

17:25 - 17:50

Highlights from SA Breast Cancer

Χ. Νασιάδη

17:50 - 18:00

Σχολιασμός: **Β. Ραμφίδης**

18:00 - 19:00

Καρκίνος Γαστρεντερικού

Προεδρείο: **Κ. Τσιγαρίδας, Γ. Τσιώτος**

18:00 - 18:15

Ανοσοθεραπεία στο ανώτερο πεπτικό

Χ. Αυγερινού

18:15 - 18:30

Νεότερα δεδομένα στο χολαγγειοκαρκίνωμα

Μ. Γιαννακάκου

18:30 - 18:45

Καρκίνος ορθού

Χ. Μάρκελλος

18:45 - 19:00

Σχολιασμός: **Π. Κατσαούνης**

19:00 - 20:00

Νεοπλασίες Ουροποιητικού

Προεδρείο: **Χ. Κομνηνός, D.Mauri, Μ. Τσιατάς**

19:00 - 19:15

Οι νεότερες εξελίξεις στον καρκίνο του προστάτη

Π. Βλαχοστέργιος

19:15 - 19:30

Συνδυασμοί IO - Tki στον καρκίνο νεφρού

Ε. Λιανός

19:30 - 19:45

Practice changing δεδομένα στον καρκίνο ουροδόχου κύστης

Ε. Κωστούρος

19:45 - 20:00

Σχολιασμός: **Μ. Τσιατάς**

Checkmate 649:

Το OPDIVO® σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία συνδυασμού με βάση φθοριοπυριμιδίνη και πλατίνα ενδείκνυται για τη θεραπεία πρώτης γραμμής ενήλικων ασθενών με HER2-αρνητικό, προχωρημένο ή μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του στομάχου, της γαστροοισοφαγικής συμβολής ή του οισοφάγου, των οποίων οι όγκοι εκφράζουν το PD-L1 με συνδυασμένη θετική βαθμολογία (CPS) ≥ 5 .¹

OPDIVO®
(nivolumab)



FOLFOX ή CapeOx

με δεδομένα 5ετίας²

Q2W

Q3W

Απόλυτα συγχρονισμένη χορήγηση OPDIVO®:

Q2W με FOLFOX ή Q3W με CapeOx για την 1^η γραμμή θεραπείας των αδενοκαρκινωμάτων uGI με PD-L1 CPS ≥ 5

Η μελέτη CheckMate 649 είναι μία τυχαioποιημένη, πολυκεντρική, ανοιχτής επιτήρησης, φάσης 3 μελέτη που αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της θεραπείας με βάση το OPDIVO® σε ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα του ανώτερου πεπτικού.

1. OPDIVO. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος. 05/2025 2. Janjigian Y et al. JCO. 2025;43(4 suppl):398

Στο συγκεντρωτικό σύνολο δεδομένων του nivolumab 240 mg χορηγούμενου κάθε 2 εβδομάδες ή 360 mg χορηγούμενου κάθε 3 εβδομάδες σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία σε όλους τους τύπους όγκων (n = 1.800), με ελάχιστη παρακολούθηση που κυμαίνονταν από 7,4 έως 23,6 μήνες ή κατόπιν 3 κύκλων θεραπείας για εξαιρέσιμο NSCLC, οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ($\geq 10\%$) ήταν ναυτία (48%), κόπωση (40%), περιφερική νευροπάθεια (33%), μειωμένη όρεξη (31%), δυσκοιλιότητα (31%), διάρροια (28%), έμετος (24%), εξάνθημα (19%), κοιλιακό άλγος (18%), στοματίτιδα (18%), μυοσκελετικός πόνος (18%), πυρετός (16%), βήχας (13%), οίδημα (συμπεριλαμβανομένου του περιφερικού οιδήματος) (12%) και κνησμός (11%). Η επίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών βαθμού 3-5 ήταν 69% για το nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, ενώ το 1,2% των θανατηφόρων ανεπιθύμητων συμβάντων αποδόθηκε στο nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία. Η διάμεση διάρκεια της θεραπείας ήταν 6,14 μήνες (95% CI: 5,78, 6,60) για το nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία. Για τον εξαιρέσιμο NSCLC, ενενήντα τρία τοις εκατό (93%) των ασθενών έλαβαν 3 κύκλους θεραπείας με nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΛΛΑΔΑ: OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BtX1 VIAL x 4ML A.T.: € 462,27, OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BtX1 VIAL x 10ML A.T.: € 1.120,50, OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BtX1 VIAL x 12ML A.T.: € 1.372,68, OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BtX1 VIAL x 24ML A.T.: € 2.642,75 Σύμφωνα με το Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης της 4ης Ιανουαρίου 2025.

ΚΥΠΡΟΣ: OPDIVO CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 10MG/ML, PACK WITH 1 VIAL X 4ML SOLUTION A.T.: € 574,35, OPDIVO CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 10MG/ML, PACK WITH 1 VIAL X 10ML SOLUTION A.T.: € 1.307,65, OPDIVO CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 10MG/ML, PACK WITH 1 VIAL X 24ML SOLUTION A.T.: € 3.140,33. Σύμφωνα με τον Ενιαίο Τιμοκατάλογο με ισχύ από 1ης Φεβρουαρίου 2024.

Τρόπος διάθεσης ("BLUE BOX") των φαρμακευτικών προϊόντων OPDIVO®: Ελλάδα: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία. **Αριθμός άδειας κυκλοφορίας:** OPDIVO: 43128/02-10-2015, **Κύπρος:** Με ιατρική συνταγή.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:

Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χαλαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040337. Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitrinikarta.gr>

Κύπρος: Φαρμακοεπικοινωνία Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία.

Τηλ: +357 22608607, Φαξ: + 357 22608669. Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ» www.kitrinikarta.gr www.kitrinikarta.gov.cy

Bristol-Myers Squibb A.E.
Αττικής 49-53 & Προποντιδός 2,
Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική
ΤΘ 63893 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική
Τηλ: 210 6074300 & 210 6074400,
Φαξ 210 6074333
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

Πριν τη συνταγογράφηση και για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες, συμβουλευθείτε την ισχύουσα Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που περιλαμβάνεται στο παρόν, σαρώνοντας τον παρακάτω QR code.
Ημερομηνία Αναθεώρησης Κειμένου 05/2025.





Συμμετέχοντες

Mauri Davide	Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκης
Αγγελάκη Σοφία	Καθηγήτρια Παθολογικής Ογκολογίας, Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η., Εργαστήριο Μεταφραστικής Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αναστασίου Μαρία	MD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης, Ογκολογικό Τμήμα, Β' Π.Π.Κ., Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Αρδαβάνης Λουκέρης Γεράσιμος	Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Αυγερινού Χρυσάνθη	Παθολόγος Ογκολόγος, Επικουρική Ιατρός, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Βλαχοστέργιος Παναγιώτης	MD, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Cornell, ΗΠΑ, Επιμελητής Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, «Ιασώ» Θεσσαλίας
Γεωργιαννάκης Εμμανουήλ	Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής, Τμήμα Ελάχιστα Επεμβατικής Θωρακοχειρουργικής, Metropolitan Hospital
Γιαννακάκου Μαρία	Ειδικευόμενη Ογκολογίας, Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Κατσαούνης Παναγιώτης	MD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Ζ' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan General»
Κατσώχη Δέσποινα	MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Νοσοκομείο «Υγεία», Διδάκτωρ Πανεπιστημίου RWTH Aachen Γερμανίας, Πρόεδρος ΑΚΟΣ
Κομνηνός Χρήστος	MD, MSc, PhD, FEBU, Διευθυντής, Κέντρο Αναπλαστικής και Προηγμένης Χειρουργικής Ουρολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Κωστούρος Ευθύμιος	Παθολόγος Ογκολόγος, Γ' Παθολογική Κλινική, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Λιανός Ευάγγελος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Μάρκελλος Χρήστος	Παθολόγος Ογκολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

mPFS IMPROVEMENT WITH ENHERTU VS CHEMOTHERAPY AFTER 1 OR 2 LINES OF ET^{1,2} IN HR+/ HER2-LOW AND HER2-ULTRALOW mBC¹



▼ Το φάρμακο τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενος ανεπιθύμητος ενέργειας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +302132040337, Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitirinkarta.gr>

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ¹

Καρκίνος του μαστού

• HER2-Θετικός καρκίνος του μαστού

Το Enhertu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό HER2-θετικό καρκίνου του μαστού που έχουν λάβει ένα ή περισσότερα προηγούμενα σχήματα βασισμένα σε ανγωγή έναντι του HER2

• Χαμηλής έκφρασης HER2 και εξαιρετικά χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνος του μαστού

Το Enhertu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό:

- θετικό στον ορμονικό υποδοχέα (HR), χαμηλής έκφρασης HER2 ή εξαιρετικά χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνου του μαστού που έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία σε μεταστατική κατάσταση και δεν θεωρούνται κατάλληλες για ενδοκρινική θεραπεία ως επόμενη γραμμή θεραπείας
- χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνου του μαστού που έχουν λάβει προηγούμενη χημειοθεραπεία σε μεταστατική κατάσταση ή έχουν παρουσιάσει υποτροπή της νόσου κατά τη διάρκεια ή εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση της επικυρωμένης χημειοθεραπείας

Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (MMKP)

Το Enhertu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο MMKP των οποίων ο καρκίνος έχει μια ενεργοποιητική μετάλλαξη του HER2 (ERBB2) και οι οποίοι χρήζουν συστηματικής θεραπείας μετά από χημειοθεραπεία με βάση την πλατινία, με ή χωρίς αναστολέρα.

Καρκίνος του στομάχου.

Το Enhertu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο HER2-θετικό αδενοκαρκίνωμα του στομάχου ή της γαστροοισοφαγικής συμβολής (ΓΟΣ) που έχουν λάβει ένα προηγούμενο σχήμα βασισμένο στην τραστοζουμπηπ

Σύννοψη του προφίλ ασφαλείας Enhertu 5,4 mg/kg (κλινικές μελέτες σε πολλαπλούς τύπους όγκων)¹.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ναυτία (71,1%), κόπωση (55,3%), έμετος (37,3%), αλμπενία (36,1%), αναμία (35,9%), ουδετεροπενία (35,1%), δυσκοιλιότητα (31,7%), μειωμένη όρεξη (30,6%), διάρροια (30,1%), αυξημένες τρανσαμινάσες (26,6%), μυοσκελετικό άλγος (23,6%), θρομβοπενία (23,1%) και λευκοπενία (21,5%).

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 3 ή 4 σύμφωνα με τα Κοινά Κριτήρια Ορολογίας για Ανεπιθύμητες Ενέργειες του Εθνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ (NCI-CTCAE v5.0) ήταν ουδετεροπενία (18,0%), αναμία (10,5%), κόπωση (7,8%), λευκοπενία (6,0%), θρομβοπενία (5,4%), ναυτία (4,9%), λεμφοπενία (3,9%), υποκαλιαιμία (3,8%), αυξημένες τρανσαμινάσες (3,5%), διάρροια (2,5%), έμετος (2,4%), μειωμένη όρεξη (1,8%), πνευμονία (1,3%) και μειωμένο κλάσμα εξώθησης (1,0%). Ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 5 παρουσιάστηκαν στο 1,4% των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της ΔΠΠ/πνευμονιτιδας (1,1%).

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις¹

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Enhertu σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχουν τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Το Enhertu δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι γυναίκες δεν πρέπει να θηλάζουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Enhertu ή για 7 μήνες μετά την τελευταία δόση. Επίσης οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία θα πρέπει να προτρέπονται να χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντιοίληψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για τουλάχιστον 7 μήνες μετά την τελευταία δόση του Enhertu.

Προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή¹

Το Enhertu είναι εμετογόνο, πράγμα που περιλαμβάνει όψιμη ναυτία ή/και έμετο. Πριν από κάθε δόση του Enhertu, οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή με ένα συνδυαστικό σχήμα δύο ή τριών φαρμακευτικών προϊόντων (π.χ. δεξαμεθαζόνη με ανταγωνιστή των υποδοχέων 5-HT₃ ή/και με ανταγωνιστή των υποδοχέων NK1, καθώς και με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα, όπως ενδείκνυται) για την πρόληψη της ναυτίας και του εμέτου που προκαλούνται από τη χημειοθεραπεία

Χονδρική Τιμή: 1596,15€, Νοσοκομειακή Τιμή: 1435,13€, Λιανική Τιμή: 1755,37€.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ¹: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία. **Δοσολογία Καρκίνος του μαστού** Η συνιστώμενη δόση του Enhertu είναι 5,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενα με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. **Καρκίνος του στομάχου** Η συνιστώμενη δόση του Enhertu είναι 5,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενα με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. Η αρχική δόση θα πρέπει να χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση διάρκειας 90 λεπτών. Εάν η προηγούμενη έγχυση ήταν καλά ανεκτή, οι επόμενες δόσεις του Enhertu μπορούν να χορηγηθούν με εγχύσεις διάρκειας 30 λεπτών. Ο ρυθμός έγχυσης του Enhertu θα πρέπει να επιβραδύνεται ή να διακόπτεται προσωρινά εάν ο ασθενής εμφανίσει συμπτώματα σχετιζόμενα με την έγχυση. Σε περίπτωση αντιδράσεων σοβαρής μορφής στην έγχυση, το Enhertu θα πρέπει να διακόπτεται οριστικά.

Βιβλιογραφία: 1. Enhertu Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Μάρτιος 2025 2. Bardia A et al. N Engl J Med. 2024;391(22):2110-22.

Για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Daiichi Sankyo ή στην Astra Zeneca ή σκανάρετε το QR code



https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/enherthu-epar-product-information_el.pdf



Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Daiichi Sankyo Europe GmbH
Υπεύθυνος Συν-πρώθησης: Daiichi Sankyo Greece
Daiichi Sankyo Greece, Κηφισίας 299, Κηφισιά, 14561, Αθήνα,
Τηλ: 2104448037
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 175572301000, www.daiichi-sankyo.gr



Τοπικός Αντιπρόσωπος του ΚΑΚ :
AstraZeneca A.E
Αγριαλάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ: 2106871500
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 00063891000, www.astrazeneca.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
www.kitirinkarta.gr
www.kitirinkarta.gov.cy

2^η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Οι Σημαντικότερες
Εξελίξεις στην Ογκολογία



Νασιάδη Χρυσάνθη

Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Γ.Α.Ο.Ν.Α.
«Ο Άγιος Σάββας»

Νικολάου Μιχαήλ

MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Α'
Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Νίντος Γεώργιος

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Παθολογικής Ογκολογίας,
Ε' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Υγεία»

Πανταζόπουλος Αναστάσιος

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Β' Π.Π.Κ.,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Ραμφίδης Βασίλειος

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική,
251 Γ.Ν.Α.

Στριμπάκος Αλέξιος

MRCp, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Ε'
Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Υγεία»

Τρυφωνόπουλος Δημήτριος

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Β' Παθολογική
Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Τσιατάς Μαρίνος

MD, PhD, BSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Τσιγαρίδας Κωνσταντίνος

Παθολόγος Ογκολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής, Ε'
Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Υγεία»

Τσιώτος Γρηγόριος

Διευθυντής, Α' Χειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ»,
Instructor of Surgery Mayo Clinic, Assistant Professor
of Surgery, University of Missouri, Πρόεδρος Ελληνικού
Ινστιτούτου Παγκρέατος

ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΤΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΟΧΙ ΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΠΗ

Σε HR+, HER2- ασθενείς με πρώιμο καρκίνο του μαστού, θετικού λεμφαδένες και υψηλού κινδύνου* για υποτροπή **Μόνο το Verzenios έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τη συνολική επιβίωση** και προσφέρει μακροχρόνια προστασία από την υποτροπή με 2 χρόνια θεραπείας συνδυασμού, ώστε να μπορείτε να της προσφέρετε ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες.^{†,1-4}

*Ο EBC υψηλού κινδύνου στην Κοόρτη 1 ορίζεται με βάση την παρουσία ασθενών με ≥ 4 θετικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες ή 1-3 θετικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες και όγκους ≥ 5 cm, ιστολογικού βαθμού 3, ή και τα δύο.⁴

[†]Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντικό όφελος στη συνολική επιβίωση (OS) στον πληθυσμό ITT. Μετά από ρυθμιστική διαβούλευση κατά την πρωταρχική ανάλυση IDFS, το σχέδιο ανάλυσης OS τροποποιήθηκε ώστε να αυξηθούν τα τελικά συμβάντα από 390 σε 650 για να εξασφαλιστεί ≥ 5 χρόνια παρακολούθησης. Το Verzenios έχει εγκριθεί για την Κοόρτη 1 (91% του ITT). Η ανάλυση OS σε αυτήν την υποομάδα δεν είχε στατιστική ισχύ και δεν ήταν ελεγχόμενη ως προς το επίπεδο άλφα.^{1,2}

EBC=πρώιμος καρκίνος του μαστού, MBC=μεταστατικός καρκίνος του μαστού, HER2= υποδοχέας 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, HR= ορμονικός υποδοχέας, IDFS=επιβίωση χωρίς διηθητική νόσο, ITT=πληθυσμός πρόθεσης προς θεραπεία, OS=συνολική επιβίωση.

Βιβλιογραφία: 1. Johnston, S., et. al. (2025). Overall survival with abemaciclib in early breast cancer. *Annals of Oncology*, 2. Rastogi P et al. *J Clin Oncol*. 2024;42(9):987-93, 3. Hortobagyi GN et al. *Ann Oncol*. 2025;36(2):149-57, 4. Verzenios. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Ενδείξεις: Πρώιμος καρκίνος μαστού: Ως επικουρική θεραπεία σε ενήλικες ασθενείς με HR+, HER2- EBC, με θετικούς λεμφαδένες και υψηλό κίνδυνο υποτροπής, σε συνδυασμό με ενδοκρινική θεραπεία. Τοπικά προχωρημένος ή μεταστατικός καρκίνος μαστού: Σε γυναίκες με HR+, HER2- MBC, σε συνδυασμό με αναστολέα αρωματάσης ή φουλβεστράντη, ως αρχική ενδοκρινική θεραπεία ή μετά από προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή.

ΜΟΡΦΕΣ / ΤΙΜΕΣ: VERZENIOS F.C.TAB 50, 100 και 150MG/TAB BTx28 δισκία σε BLISTERS PCTFE/PE/PVC/Alu. Χ.Τ.: 1.132,36€, Λ.Τ.: 1.260,32€, Ν.Τ.: 1.018,12€

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ: Περιορισμός: Αποζημιώνεται για τις ενδείξεις του πρώιμου καρκίνου του μαστού και του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου του μαστού – Ποσοστό αποζημίωσης: 100%.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος σκανάροντας τον κωδικό QR



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

15^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά,

ΤΗΛ.: 210 6294600, FAX.: 2106294610

www.lilly.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα





Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Διοργάνωση:

Ελληνική Οργάνωση Πρόληψης και Εκπαίδευσης για τον Καρκίνο (ΕΟΠΕΓΚ)

Σε συνεργασία με:

Ε' Παθολογική – Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Υγεία»

Α' Παθολογική – Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Εγγραφή / Συμμετοχή:

Η εγγραφή στην Ημερίδα είναι δωρεάν και η παρακολούθηση επιτρέπεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας, καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Οδηγίες παρακολούθησης:

Η Ημερίδα θα αναμεταδοθεί διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας www.livemed.gr.

Εάν είστε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού στο **Livemed**, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία (πατήστε στο πεδίο **Register / Εγγραφή**).

Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο **Livemed**, χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε από το μενού την κατηγορία **Live**, την εκδήλωση που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο **Go Live ή Go Virtual**. Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την **«Αίθουσα Συνεδριάσεων»**.

Ερωτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέσω του πεδίου που βρίσκεται κάτω από το βίντεο, κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης.

Παραλαβή Πιστοποιητικού:

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, μετά το πέρας των εργασιών της Ημερίδας. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης.

Σημείωση: Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα για λήψη έως 12 μήνες από τη λήξη της εκδήλωσης.

Γραμματεία Ημερίδας:



Events & Travel Solutions

Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη • Τηλ.: 210 98 80 032

Website: www.events.gr • E-mail: ets@events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η Ε.Τ.Σ. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr.

Το **PHESGO**[®] συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του **PERJETA**[®], **Herceptin**[®] σε μια ένεση υποδόριας μορφής, **σταθερού συνδυασμού που μπορεί να χορηγηθεί μέσα σε 5 λεπτά.**¹⁻⁴

Οι ασθενείς με **HER2+** καρκίνο του μαστού αφιερώνουν έως 100 ώρες κάθε χρόνο για την θεραπεία τους.^{1,2}



PHESGO[®]

PERTUZUMAB-TRASTUZUMAB

Go there

Πληροφορίες για την ασφάλεια: Για Επαγγελματίες Υγείας

Οι πιο συχνές ADRs (≥30%) που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με PHESGO ή ενδοφλέβια περτουζουμάμπη σε συνδυασμό με τραστουζουμάμπη και χημειοθεραπεία ήταν η αλωπεκία, η διάρροια, η ναυτία, η αναμία, η εξασθένιση και η αρθραλγία. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως παραπεμφθείτε στην ΠΧΠ του φαρμάκου που παρατίθεται κάτωθεν.

Πληροφορίες για την κύηση: Για Επαγγελματίες Υγείας

Εάν μία ασθενής μείνει έγκυος ενώ λαμβάνει PHESGO, ή εντός 7 μηνών μετά την τελευταία δόση του PHESGO, παρακαλούμε να αναφέρετε αμέσως την εγκυμοσύνη στην τοπική Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (HELLAS) ΑΕ στα παρακάτω στοιχεία.

Επιπρόσθετες πληροφορίες θα ζητηθούν κατά τη διάρκεια μίας εγκυμοσύνης με έκθεση στο PHESGO και κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου ζωής του βρέφους. Αυτό θα δώσει στη Roche τη δυνατότητα να κατανοήσει καλύτερα την ασφάλεια του PHESGO και να παρέχει κατάλληλες πληροφορίες στις υγειονομικές αρχές, στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και στους ασθενείς. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στην ΠΧΠ του PHESGO.

Βιβλιογραφία

1. PERJETA Summary of Product Characteristics. 2. Herceptin Summary of Product Characteristics. 3. PHESGO Summary of Product Characteristics. 4. Tan AR, et al. Lancet Oncol 2021;22:85–97.

PHESGO Τρόπος διάθεσης:

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Phesgo 1200mg/600mg 1 VIALx15ML Ελλάδα: Ν.Τ: 4.276,31 € Α.Τ: 5.142,34 €	Phesgo 1200mg/600mg 1 VIALx15ML Κύπρος: ΜΑΤ: 7.140,83 €
Phesgo 600mg/600mg 1 VIALx10ML Ελλάδα: Ν.Τ: 2.721,03€ Α.Τ: 3.272,08 €	Phesgo 600mg/600mg 1 VIALx10ML Κύπρος: ΜΑΤ: 4.206,20 €

Ελλάδα: ROCHE (Hellas) A.E.

Αλαμάνας 4 & Δελφών, 151 25 Μαρούσι, Αττική, Τηλ.: 210 6166100,
email: hellas.medinfo@roche.com,
800 111 93 00 (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)

Κύπρος: Γ.Α. Σταμάτης & Σία Λτδ. : Τηλ: +357 - 22 257200

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και

Αναφέρετε:

**ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα**

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για την
ΠΧΠ
σκανάρετε
εδώ



2^η ΕΤΗΣΙΑ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Οι Σημαντικότερες
Εξελίξεις στην Ογκολογία



Χορηγοί



SANDOZ



Akynzeo[®]

netupitant/palonosetron

Ένα καψάκιο περιέχει 300 mg netupitant και 0,5 mg palonosetron



Αθήνα: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 14564, τηλ.: 210 5281700
Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης τηλ: 210 5281700
e-mail: pv@galenica.gr • www.galenica.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοήστε.
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Συμβουλευτείτε
την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος
Akynzeo[®] SmPC



HELSINN
Building quality cancer care together

Διανέμεται κατόπιν άδειας
της Helsinn Healthcare S.A, Ελβετία

