

Οργάνωση:

Διεπιστημονική Εταιρεία Έρευνας
και Θεραπείας του Καρκίνου

Σε συνεργασία:

Παθολογική-Ογκολογική Κλινική,
Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

5^ο Συνέδριο

Navigate to the future treatments

30 – 31
Ιανουαρίου
2026

Ξενοδοχείο
Golden Age
Αθήνα

Υπό την αιγίδα

ΕΟΠΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ
ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Θα χορηγηθούν 14,5 Μόρια Συνεχιζόμενης
Ιατρικής Εκπαίδευσης (ECMECs)

Επιστημονικό
Πρόγραμμα

Checkmate 649:

Το OPDIVO® σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία συνδυασμού με βάση φθοριοπυριμιδίνη και πλατίνα ενδείκνυται για τη θεραπεία πρώτης γραμμής ενήλικων ασθενών με HER2-αρνητικό, προχωρημένο ή μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του στομάχου, της γαστροοισοφαγικής συμβολής ή του οισοφάγου, των οποίων οι όγκοι εκφράζουν το PD-L1 με συνδυασμένη θετική βαθμολογία (CPS) ≥ 5 .¹

OPDIVO®
(nivolumab)



FOLFOX ή CapeOx

με δεδομένα 5ετίας²

Q2W

Q3W

Απόλυτα συγχρονισμένη χορήγηση OPDIVO®:

Q2W με FOLFOX ή Q3W με CapeOx για την 1^η γραμμή θεραπείας των αδενοκαρκινωμάτων uGI με PD-L1 CPS ≥ 5

Η μελέτη CheckMate 649 είναι μία τυχαioποιημένη, πολυκεντρική, ανοιχτής επιτήρησης, φάσης 3 μελέτη που αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της θεραπείας με βάση το OPDIVO® σε ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα του ανώτερου πεπτικού.

1. OPDIVO. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος. 05/2025 2. Janjigian Y et al. JCO. 2025;43(4 suppl):398

Στο συγκεντρωτικό σύνολο δεδομένων του nivolumab 240 mg χορηγούμενου κάθε 2 εβδομάδες ή 360 mg χορηγούμενου κάθε 3 εβδομάδες σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία σε όλους τους τύπους όγκων (n = 1.800), με ελάχιστη παρακολούθηση που κυμαίνονταν από 7,4 έως 23,6 μήνες ή κατόπιν 3 κύκλων θεραπείας για εξαιρέσιμο NSCLC, οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ($\geq 10\%$) ήταν ναυτία (48%), κόπωση (40%), περιφερική νευροπάθεια (33%), μειωμένη όρεξη (31%), δυσκοιλιότητα (31%), διάρροια (28%), έμετος (24%), εξάνθημα (19%), κοιλιακό άλγος (18%), στοματίτιδα (18%), μυοσκελετικός πόνος (18%), πυρετός (16%), βήχας (13%), οίδημα (συμπεριλαμβανομένου του περιφερικού οιδήματος) (12%) και κνησμός (11%). Η επίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών βαθμού 3-5 ήταν 69% για το nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, ενώ το 1,2% των θανατηφόρων ανεπιθύμητων συμβάντων αποδόθηκε στο nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία. Η διάμεση διάρκεια της θεραπείας ήταν 6,14 μήνες (95% CI: 5,78, 6,60) για το nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία. Για τον εξαιρέσιμο NSCLC, ενενήντα τρία τοις εκατό (93%) των ασθενών έλαβαν 3 κύκλους θεραπείας με nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΛΛΑΔΑ: OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BtX1 VIAL x 4ML A.T.: € 462,27, OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BtX1 VIAL x 10ML A.T.: € 1.120,50, OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BtX1 VIAL x 12ML A.T.: € 1.372,68, OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BtX1 VIAL x 24ML A.T.: € 2.642,75 Σύμφωνα με το Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης της 4ης Ιανουαρίου 2025.

ΚΥΠΡΟΣ: OPDIVO CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 10MG/ML, PACK WITH 1 VIAL X 4ML SOLUTION A.T.: € 574,35, OPDIVO CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 10MG/ML, PACK WITH 1 VIAL X 10ML SOLUTION A.T.: € 1.307,65, OPDIVO CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 10MG/ML, PACK WITH 1 VIAL X 24ML SOLUTION A.T.: € 3.140,33. Σύμφωνα με τον Έναιο Τιμοκατάλογο με ισχύ από 1ης Φεβρουαρίου 2024.

Τρόπος διάθεσης ("BLUE BOX") των φαρμακευτικών προϊόντων OPDIVO®: Ελλάδα: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία. **Αριθμός άδειας κυκλοφορίας:** OPDIVO: 43128/02-10-2015, **Κύπρος:** Με ιατρική συνταγή.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:

Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χαλαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040337. Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitrinikarta.gr>

Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Τηλ: +357 22608607, Φαξ: + 357 22608669. Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ» www.kitrinikarta.gr www.kitrinikarta.gov.cy

Bristol-Myers Squibb A.E.
Αττικής 49-53 & Προποντιδός 2,
Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική
ΤΘ 63893 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική
Τηλ: 210 6074300 & 210 6074400,
Φαξ 210 6074333
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

Πριν τη συνταγογράφηση και για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες, συμβουλευθείτε την ισχύουσα Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που περιλαμβάνεται στο παρόν, σαρώνοντας τον παρακάτω QR code.
Ημερομηνία Αναθεώρησης Κειμένου 05/2025.





5^ο Συνέδριο

Navigate to the future treatments

Χαιρετισμός

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στην 5η Επιστημονική Συνάντηση με τίτλο **«Navigate to the Future Treatments»**, όπου η αναδρομή του περσινού συνεδρίου μας ωθεί στο να συνεχίσουμε και φέτος με το ίδιο ζήλο, στις 30-31 Ιανουαρίου 2026.

Στόχος της Επιστημονικής Συνάντησης και φέτος είναι να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενημέρωση για τις νεότερες εξελίξεις στην πρόληψη και στη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου, καθώς να δώσει και έναυσμα για εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και επιστημονική συζήτηση πάνω στα τελευταία δεδομένα της ογκολογικής έρευνας. Αυτό που παρατηρείται καθημερινά στην ιατρική κοινότητα είναι οι νέες προκλήσεις που συνεχίζει να καλείται και να αντιμετωπίζει ο ιατρικός κλάδος καθώς και στον συνεχή τρόπο διαχείρισης των ογκολογικών ασθενών.

Οι ομιλητές διαθέτουν σημαντική κλινική εμπειρία στον τομέα τους και η συμμετοχή τους μαζί με τους προέδρους των στρογγυλών τραπεζών θα βοηθήσουν να γίνει η προσέγγιση των θεμάτων με κριτική σκέψη, ενσωματώνοντας τις νέες γνώσεις στην καθημερινή ιατρική πρακτική.

Θα είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για όλους μας να είστε μαζί μας για γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών στη Συνάντηση μας, γνωρίζοντας ότι η επιστημονική συνεργασία οδηγεί σε καινοτομία και πρόοδο.

Οι Πρόεδροι της Συνάντησης

Ελένη Ρες

Παθολόγος Ογκολόγος, MD, PhD
Διευθύντρια Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής
Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Στέλλα Μαρία Κυβέλου

MD, PhD, MSc, Επεμβατική Καρδιολόγος,
Επιμελήτρια Α' Καρδιολογίας,
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΤΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΟΧΙ ΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΠΗ

Σε HR+, HER2- ασθενείς με πρώιμο καρκίνο του μαστού, θετικούς λεμφαδένες και υψηλού κινδύνου* για υποτροπή **Μόνο το Verzenios έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τη συνολική επιβίωση** και προσφέρει μακροχρόνια προστασία από την υποτροπή με 2 χρόνια θεραπείας συνδυασμού, ώστε να μπορείτε να της προσφέρετε ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες.^{†,1-4}

*Ο EBC υψηλού κινδύνου στην Κοόρτη 1 ορίζεται με βάση την παρουσία ασθενών με ≥ 4 θετικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες ή 1-3 θετικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες και όγκους ≥ 5 cm, ιστολογικού βαθμού 3, ή και τα δύο.⁴

[†]Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντικό όφελος στη συνολική επιβίωση (OS) στον πληθυσμό ITT. Μετά από ρυθμιστική διαβούλευση κατά την πρωταρχική ανάλυση IDFS, το σχέδιο ανάλυσης OS τροποποιήθηκε ώστε να αυξηθούν τα τελικά συμβάντα από 390 σε 650 για να εξασφαλιστεί ≥ 5 χρόνια παρακολούθησης. Το Verzenios έχει εγκριθεί για την Κοόρτη 1 (91% του ITT). Η ανάλυση OS σε αυτήν την υποομάδα δεν είχε στατιστική ισχύ και δεν ήταν ελεγχόμενη ως προς το επίπεδο άλφα.^{1,2}

EBC=πρώιμος καρκίνος του μαστού, MBC=μεταστατικός καρκίνος του μαστού, HER2= υποδοχέας 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, HR= ορμονικός υποδοχέας, IDFS=επιβίωση χωρίς διηθητική νόσο, ITT=πληθυσμός πρόθεσης προς θεραπεία, OS=συνολική επιβίωση.

Βιβλιογραφία: 1. Johnston, S., et. al. (2025). Overall survival with abemaciclib in early breast cancer. *Annals of Oncology*, 2. Rastogi P et al. *J Clin Oncol*. 2024;42(9):987-93, 3. Hortobagyi GN et al. *Ann Oncol*. 2025;36(2):149-57, 4. Verzenios. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Ενδείξεις: Πρώιμος καρκίνος μαστού: Ως επικουρική θεραπεία σε ενήλικες ασθενείς με HR+, HER2- EBC, με θετικούς λεμφαδένες και υψηλό κίνδυνο υποτροπής, σε συνδυασμό με ενδοκρινική θεραπεία. Τοπικά προχωρημένος ή μεταστατικός καρκίνος μαστού: Σε γυναίκες με HR+, HER2- MBC, σε συνδυασμό με αναστολέα αρωματάσης ή φουλβεστράντη, ως αρχική ενδοκρινική θεραπεία ή μετά από προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή.

ΜΟΡΦΕΣ / ΤΙΜΕΣ: VERZENIOS F.C.TAB 50, 100 και 150MG/TAB BTx28 δισκία σε BLISTERS PCTFE/PE/PVC/Alu. Χ.Τ.: 1.132,36€, Λ.Τ.: 1.260,32€, Ν.Τ.: 1.018,12€
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ: Περιορισμός: Αποζημιώνεται για τις ενδείξεις του πρώιμου καρκίνου του μαστού και του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου του μαστού – Ποσοστό αποζημίωσης: 100%.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος σκανάροντας τον κωδικό QR



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά,
ΤΗΛ.: 210 6294600, FAX.: 2106294610
www.lilly.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα





5^ο Συνέδριο

Navigate to the future treatments

Επιτροπές

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδροι: Ελένη Ρες

Στέλλα Μαρία Κυβέλου

Μέλη: Γεράσιμος Αραβαντινός
Γεωργία Ζαφείρη
Δήμητρα Λαμπροπούλου
Γαλάτεια Λιούτα

Μαρία Πιτέρη
Ιωσήφ Σγουρός
Βασιλική Τζούδα
Έλλη-Σοφία Τριποδάκη

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδροι: Ελένη Ρες

Στέλλα Μαρία Κυβέλου

Μέλη: Γεράσιμος Αραβαντινός
Βασίλειος Γεωργούλιας
Μαρία Γιαννακάκου
Ελένη Γκόγκα
Σταματίνα Δεμίρη
Αρετή Δημητριάδου
Ρουμπίνη Ζακοπούλου
Ευαγγελία Καβούρη
Χαράλαμπος Καραχάλιος
Πάρις Κοσμίδης
Ασπασία Λιανού
Βασίλειος Μπαρμπούνης
Δημήτριος Μπαφαλούκος
Θάλεια-Ελευθερία Μπουσού

Μαρία Μπριστογιάννη
Μαρία Παναγιωτούνη
Πάυλος Παπακώστας
Δημήτριος Πεκτασίδης
Μαρία Πιτέρη
Ευαγγελία Πλιάκου
Κυριακή Πλοιαρχοπούλου
Επαμεινώνδας Σαμαντάς
Ιωσήφ Σγουρός
Γεώργιος Σταμούλης
Βασιλική Τζούδα
Έλλη-Σοφία Τριποδάκη
Πέτρος Ψαραύτης

Υπερβαίνοντας τον Φόβο του Τρυπήματος



Για πλήρεις
συνταγογραφικές
πληροφορίες
συμβουλευτείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος

Νοσοκομειακή Τιμή

PELGRAZ INJ.SOL 6MG/0.6ML (10MG/ML) 1 PF. SYR με προστατευτικό ασφαλείας x 0.6 ML +1 τολύπιο με ανόπνευμα 301,93€
PELGRAZ INJ.SOL 6MG/0.6ML (10MG/ML) 1 προγεμισμένος εγκυτάρης +1 τολύπιο με ανόπνευμα 301,93€

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται, σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού

Τοπικός Αντιπρόσωπος

WinMedica

Για περισσότερες πληροφορίες:
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Αγασιλίου 6-8, Μαρούσι 151 23
Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827
info@winmedica.gr
www.winmedica.gr

Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας
Accord Healthcare S.L.U.

accord
We make it better

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανταρτές
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»





5^ο Συνέδριο

Navigate to the future treatments

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

30 Ιανουαρίου

2026

08:45 - 09:00 Προσέλευση - Εγγραφές

09:00 - 10:30 **Στρογγυλό τραπέζι 1**

Νοσηλευτική - Ψυχοσωματική ογκολογία

Προεδρείο: **Χ. Κουλουκούρα, Μ. Ντούλα, Αικ. Παπαγιαννοπούλου**

09:00 - 09:25 Διασφαλίζοντας την ποιότητα στη φροντίδα των ατόμων με καρκίνο.
Ο διακριτός νοσηλευτικός ρόλος.

Θ. Παππά

09:25 - 09:50 Prehabilitation (προ-αποκατάσταση) σε ασθενείς με καρκίνο.

Μ. Μπλέτσα

09:50 - 10:15 Φροντιστές ογκολογικών ασθενών. Συννοσηρότητα.

Β. Παντελή

10:15 - 10:30 Συζήτηση - Σχολιασμός

10:30 - 12:30 **Στρογγυλό τραπέζι 2**

Παρουσίαση κλινικών περιστατικών

Προεδρείο: **Β. Τζούδα, Γ. Σταμούλης**

10:30 - 11:00 Περιστατικό 1.

Γ. Λαζαρίδου

11:00 - 11:30 Περιστατικό 2.

Β. Καμπόσου

11:30 - 12:00 Περιστατικό 3.

Α. Μαυράκης

12:00 - 12:30 Συζήτηση - Σχολιασμός

12:30 - 13:00 **Διάλειμμα καφέ**

13:00 - 14:30 **Στρογγυλό τραπέζι 3**

Καρκίνος ουροποιητικού

Προεδρείο: **Α. Κουμαριανού, Θ. Φλώρος**

13:00 - 13:20 Πρώιμος καρκίνος νεφρού και νεότερα δεδομένα.

Γ. Λαϊνάκης

13:20 - 13:40 1^η γραμμή θεραπείας στο μεταστατικό καρκίνο νεφρού και νεότερα δεδομένα.

Ρ. Ζακοπούλου

13:40 - 14:00 Μεταστατικός ουροθηλιακός καρκίνος και νεότερα δεδομένα.

Σ. Ταλαγάνη

14:00 - 14:20 1^η γραμμή θεραπείας στον ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη και νεότερα δεδομένα.

Ε. Μαραγκούλη

14:20 - 14:30 Συζήτηση - Σχολιασμός

ENHERTU ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 Ή 2 ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ^{1,2}

IN HR+ /HER2-LOW AND
HER2-ULTRALOW mBC¹



▼ Το φάρμακο τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενος ανεπιθύμητος ενέργειας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +302132040337, Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitirinkarta.gr>

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ¹

Καρκίνος του μαστού

• HER2-Θετικός καρκίνος του μαστού

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό HER2-θετικό καρκίνου του μαστού που έχουν λάβει ένα ή περισσότερα προηγούμενα σχήματα βασισμένα σε αναστολή του HER2

• Χαμηλής έκφρασης HER2 και εξαιρετικά χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνος του μαστού

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό:

- θετικό στον ορμονικό υποδοχέα (HR), χαμηλής έκφρασης HER2 ή εξαιρετικά χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνου του μαστού που έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία σε μεταστατική κατάσταση και δεν θεωρούνται κατάλληλες για ενδοκρινική θεραπεία ως επόμενη γραμμή θεραπείας
- χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνου του μαστού που έχουν λάβει προηγούμενη χημειοθεραπεία σε μεταστατική κατάσταση ή έχουν παρουσιάσει υποτροπή της νόσου κατά τη διάρκεια ή εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση της επικουρικής χημειοθεραπείας

Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (MMKP)

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο MMKP των οποίων ο καρκίνος έχει μια ενεργοποιητική μετάλλαξη του HER2 (ERBB2) και οι οποίοι χρήζουν συστηματικής θεραπείας μετά από χημειοθεραπεία με βάση την πλατινία, με ή χωρίς αναστολέα.

Καρκίνος του στομάχου

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο HER2-θετικό αδενοκαρκίνωμα του στομάχου ή της γαστροοισοφαγικής συμβολής (ΓΟΣ) που έχουν λάβει ένα προηγούμενο σχήμα βασισμένο στην τραστοζουμπηπ

Σύννοψη του προφίλ ασφαλείας Enherthu 5,4 mg/kg (κλινικές μελέτες σε πολλαπλούς τύπους όγκων)¹

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ναυτία (71,1%), κόπωση (55,3%), έμετος (37,3%), αλωπεκία (36,1%), αναμία (35,9%), ουδετεροπενία (35,1%), δυσκοιλιότητα (31,7%), μειωμένη όρεξη (30,6%), διάρροια (30,1%), αυξημένες τρανσαμινάσες (26,6%), μυοσκελετικό άλγος (23,6%), θρομβοπενία (23,1%) και λευκοπενία (21,5%).

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 3 ή 4 σύμφωνα με τα Κοινά Κριτήρια Ορολογίας για Ανεπιθύμητες Ενέργειες του Εθνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ (NCI-CTCAE v5.0) ήταν ουδετεροπενία (18,0%), αναμία (10,5%), κόπωση (7,8%), λευκοπενία (6,0%), θρομβοπενία (5,4%), ναυτία (4,9%), λεμφοπενία (3,9%), υποκαλιαιμία (3,8%), αυξημένες τρανσαμινάσες (3,5%), διάρροια (2,5%), έμετος (2,4%), μειωμένη όρεξη (1,8%), πνευμονία (1,3%) και μειωμένο κλάσμα εξώθησης (1,0%). Ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 5 παρουσιάστηκαν στο 1,4% των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της ΔΠΠ/πνευμονιτιδας (1,1%).

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις¹

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Enherthu σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχουν τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Το Enherthu δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι γυναίκες δεν πρέπει να θηλάζουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Enherthu ή για 7 μήνες μετά την τελευταία δόση. Επίσης οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία θα πρέπει να προτρέπονται να χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντιοίληψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για τουλάχιστον 7 μήνες μετά την τελευταία δόση του Enherthu.

Προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή¹

- Το Enherthu είναι εμετογόνο, πράγμα που περιλαμβάνει όψιμη ναυτία ή/και έμετο. Πριν από κάθε δόση του Enherthu, οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή με ένα συνδυαστικό σχήμα δύο ή τριών φαρμακευτικών προϊόντων (π.χ. δεξαμεθαζόνη με ανταγωνιστή των υποδοχέων 5-HT₃ ή/και με ανταγωνιστή των υποδοχέων NK1, καθώς και με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα, όπως ενδεικνύονται) για την πρόληψη της ναυτίας και του εμέτου που προκαλούνται από τη χημειοθεραπεία

Χονδρική Τιμή: 1596,15€, Νοσοκομειακή Τιμή: 1435,13€, Αναμική Τιμή: 1755,37€.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ¹: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία. **Δοσολογία Καρκίνος του μαστού** Η συνιστώμενη δόση του Enherthu είναι 5,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενη με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. **Καρκίνος του στομάχου** Η συνιστώμενη δόση του Enherthu είναι 5,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενη με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. Η αρχική δόση θα πρέπει να χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση διάρκειας 90 λεπτών. Εάν η προηγούμενη έγχυση ήταν καλά ανεκτή, οι επόμενες δόσεις του Enherthu μπορούν να χορηγηθούν με εγχύσεις διάρκειας 30 λεπτών. Ο ρυθμός έγχυσης του Enherthu θα πρέπει να επιβραδύνεται ή να διακόπτεται προσωρινά εάν ο ασθενής εμφανίσει συμπτώματα σχετιζόμενα με την έγχυση. Σε περίπτωση αντιδράσεων σοβαρής μορφής στην έγχυση, το Enherthu θα πρέπει να διακόπτεται οριστικά.

Βιβλιογραφία: 1. Enherthu Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Μάρτιος 2025 2. Bardia A et al. N Engl J Med. 2024;391(22):2110-22.



Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Daiichi Sankyo Europe GmbH
Υπεύθυνος Συν-πρώθησης: Daiichi Sankyo Greece
Daiichi Sankyo Greece, Κηφισίας 299, Κηφισιά, 14561, Αθήνα,
Τηλ: 2104448037
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 175572301000, www.daiichi-sankyo.gr



Τοπικός Αντιπρόσωπος του ΚΑΚ :
AstraZeneca A.E
Αγριαλάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ: 2106871500
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 00063891000, www.astrazeneca.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
www.kitirinkarta.gr
www.kitirinkarta.gov.cy

Για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Daiichi Sankyo ή στην Astra Zeneca ή σκανάρετε το QR code



https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/enherthu-epar-product-information_el.pdf



5^ο Συνέδριο

Navigate to the future treatments

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

30 Ιανουαρίου

2026

14:30 - 15:45 **Στρογγυλό τραπέζι 4**

Γυναικολογικός καρκίνος

Προεδρείο: **Δ. Πεκτασίδης, Γ. Αραβαντινός, Χ. Πανόπουλος**

14:30 - 15:00 Νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις στον καρκίνο τραχήλου μήτρας.

Δ. Τιμπλαλέξη

15:00 - 15:30 Νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις στον καρκίνο ωοθηκών.

Α. Καραδήμου

15:30 - 15:45 Συζήτηση - Σχολιασμός

15:45 - 17:00 **Μεσημβρινή διακοπή - Ελαφρύ γεύμα**

17:00 - 19:00 **Στρογγυλό τραπέζι 5**

Καρκίνος πνεύμονα

Προεδρείο: **Β. Γεωργούλιας, Ε. Σαμαντάς**

17:00 - 17:25 Προεγχειρητική και περιεγχειρητική θεραπεία στον πρώιμο καρκίνο του πνεύμονα.

Β. Τζούδα

17:25 - 17:50 Νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις στον SCLC.

Α. Λιανού

17:50 - 18:15 Νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις των ADCs στον καρκίνο του πνεύμονα.

Λ. Γκαρραλέα

18:15 - 18:40 ΜΜΚΠ με οδηγούς μεταλλάξεις.

Α. Δημητριάδου

18:40 - 19:00 Συζήτηση

19:00 - 19:45 **Δορυφορικές διαλέξεις**

Προεδρείο: **Ε. Ρες, Β. Τζούδα**

19:00 - 19:20 Καλύπτοντας το κενό με τον διπλό ανοσοαποκλεισμό στους ασθενείς με μεταστατικό ΜΜΚΠ και χαμηλή έκφραση PD-L1.

Σ. Γκούρα

sponsored by  Bristol Myers Squibb

19:20 - 19:40 Ανοσοθεραπεία ως πρώτη γραμμή μονοθεραπεία στον ΜΜΚΠ: δεδομένα σε ειδικούς πληθυσμούς ασθενών.

Ι. Τουρκαντώνης

sponsored by 

19:40 - 19:45 Συζήτηση



Προχωρημένο NSCLC



- Το LIBTAYO® σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση πρώτης γραμμής του NSCLC σε ενήλικες ασθενείς που εκφράζουν PD-L1 (σε $\geq 1\%$ των νεοπλασματικών κυττάρων), χωρίς ανωμαλίες EGFR, ALK ή ROS1, οι οποίοι έχουν: - Τοπικά προχωρημένο NSCLC, οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για οριστική χημειοακτινοθεραπεία, ή Μεταστατικό NSCLC¹

- Το LIBTAYO® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση πρώτης γραμμής του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (NSCLC) σε ενήλικες ασθενείς που εκφράζουν PD-L1 (σε $\geq 50\%$ των νεοπλασματικών κυττάρων), χωρίς ανωμαλίες EGFR, ALK ή ROS1, οι οποίοι έχουν: - Τοπικά προχωρημένο NSCLC, οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για οριστική χημειοακτινοθεραπεία, ή Μεταστατικό NSCLC¹

Προχωρημένο CSCC



- Το LIBTAYO® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του μεταστατικού ή τοπικά προχωρημένου πλακώδους καρκινώματος του δέρματος (mCSCC ή laCSCC) σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν εμφανίσει εξέλιξη της νόσου ή έχουν χειρουργική επέμβαση ή ακτινοθεραπεία, που έχουν στόχο την ίαση.¹

Προχωρημένο BCC



- Το LIBTAYO® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού βασικοκυτταρικού καρκινώματος (laBCC ή mBCC) σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν εμφανίσει εξέλιξη της νόσου ή έχουν δυσανοχή σε αναστολείς του μονοπατιού Hedgehog (HHI).¹

Προχωρημένος Καρκίνος Τραχήλου της Μήτρας



- Το LIBTAYO® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του υποτροπιάζοντος ή μεταστατικού καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε ενήλικες ασθενείς που παρουσιάζουν εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά από χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα.¹

NSCLC=Non Small Cell Lung Cancer, μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα, **EGFR**=υποδοχέας του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, **ALK**=κίνηση του αναπλαστικού λεμφώματος, **ROS1**=ROS πρωτο-ογκογονίδιο 1, υποδοχέας τυροσινικής κίνησης, **CSCC**=cutaneous squamous cell carcinoma, Πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος, **BCC**=basal cell carcinoma, βασικοκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος.

Μπορεί να εμφανιστούν ανοσομεσολαβούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες με το cemiplimab. Οι περισσότερες από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών, υποχώρησαν μετά από την έναρξη κατάλληλης ιατρικής θεραπείας ή τη διακοπή του cemiplimab.¹

Τρόπος Διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.

Ενδεικτική τιμή (N.T.): Φιαλίδιο 350mg/ 7ml 4.302,41€

1. Περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος LIBTAYO®

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από την Γένεσις Φάρμα Α.Ε.

- ▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



Για την ΠΧΠ σκανάρετε τον κωδικό QR



5^ο Συνέδριο

Navigate to the future treatments

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ **30** Ιανουαρίου

2026

19:45 - 20:30 Τελετή Έναρξης

Προεδρείο: **Ε. Ρες, Σ. Μ. Κυβέλου, Μ. Πιπέρη**

19:45 - 20:00 Χαιρετισμοί

20:00 - 20:30 Η ηθική αξία της επιστήμης.

Β. Μπαρμπούνης

ΣΑΒΒΑΤΟ **31** Ιανουαρίου

2026

09:30 - 11:00 Στρογγυλό τραπέζι 6

Μελάνωμα

Προεδρείο: **Ε. Γκόγκα, Δ. Μπαφαλούκος, Α. Λασκαράκης**

09:30 - 09:55 Επικουρική - εισαγωγική θεραπεία μελάνωματος.

Γ. Ζαφείρη

09:55 - 10:20 Ποια η βέλτιστη θεραπεία στο μεταστατικό μελάνωμα.

Χ. Καραχάλιος

10:20 - 10:45 Που βρισκόμαστε πλέον με τα mRNA εμβόλια.

Μ. Παναγιωτούνη

10:45 - 11:00 Συζήτηση

11:00 - 12:30 Στρογγυλό τραπέζι 7

Καρκίνος πεπτικού

Προεδρείο: **Α. Αρδαβάνης, Π. Παπακώστας, Ι. Σγουρός**

11:00 - 11:20 Νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις στο μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος.

Π. Ψαραύτης

11:20 - 11:40 Νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις στον HCC.

Ε. Καβούρη

11:40 - 12:00 Νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις στη μεταστατική νόσο παχέος εντέρου.

Θ.Ε. Μπουσού

12:00 - 12:20 Νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις στον καρκίνο οισοφάγου-στομάχου.

Γ. Αρδαβάνης-Λουκέρης

12:20 - 12:30 Συζήτηση

12:30 - 13:00 Διάλειμμα καφέ

DON'T MAKE THEM WAIT.

Start strong with CABOMETYX® + Nivolumab.



60% of aRCC patients don't reach 2L*2-4



67,6m FU results continue to support Cabometyx® - Nivolumab as a Standard of Care for previously untreated aRCC patients¹

Keep time on their side⁵

*Across three real-world studies, only 35-45% of patients received 2L²⁻⁴ References: 1. Motzer R, et al. Abstract 439. Presented at ASCO GU 2025. 2. Shah N, et al. Eur Urol. 2023;49:110-118. 3. Malik A, et al. Poster 19. Presented at IKCS 2023. 4. Lai G-S, et al. PLoS One. 2023;18(11):e0294039. 5. Bournon MT, et al. Abstract 362, Presented at ASCO GU 2024.

IPSEN MON. ΕΠΕ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 9843324
E-mail: ipsenepe@ipsen.com
www.ipsen.com/greece

Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930

ΔΤΦ: 02/01/2026

CABOMETYX F.C.TAB 20MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€
CABOMETYX F.C.TAB 40MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€
CABOMETYX F.C.TAB 60MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€



Περλήψη Χαρακτηριστικών
Προϊόντος CABOMETYX®
Ημ. αναθεώρησης κειμένου,
24 Οκτωβρίου 2025

**CABOMETYX®**
(cabozantinib) tablets

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπεληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

 **IPSEN**



5^ο Συνέδριο

Navigate to the future treatments

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΣΑΒΒΑΤΟ

31 Ιανουαρίου

2026

13:00 - 14:30 **Στρογγυλό τραπέζι 8**

Καρκίνος μαστού (I)

Προεδρείο: **Σ. Δεμίρη, Ε. Γαλάνη, Α. Χριστοπούλου**

13:00 - 13:25 Νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις στον πρώιμο HR(+), HER2(-) καρκίνο του μαστού.

Ε. Τριποδάκη

13:25 - 13:50 Νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις στον πρώιμο τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού.

Ευ. Πλιάκου

13:50 - 14:15 Νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις στον πρώιμο HER2(+) καρκίνο του μαστού.

Αικ. Κοτσώρη

14:15 - 14:30 Συζήτηση

14:30 - 16:00 **Στρογγυλό τραπέζι 9**

Καρκίνος μαστού (II)

Προεδρείο: **Κ. Πλοιαρχοπούλου, Ζ. Σαριδάκη, Ν. Τσουκαλάς**

14:30 - 14:55 Εξελίσξεις στην 1η γραμμή θεραπείας στον ορμονοανθεκτικό καρκίνο του μαστού.

Μ. Γιαννακάκου

14:55 - 15:20 Νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις στο μεταστατικό τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού.

Μ. Σκόνδρα

15:20 - 15:45 Νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις στο μεταστατικό HER2(+) καρκίνο του μαστού.

Μ. Θεοχάρη

15:45 - 16:00 Συζήτηση

16:00 - 16:15 **Λήξη - Συμπεράσματα**

LUMYKRAS®
(sotorasib)

LUMYKRAS®[▼]: Στοχεύοντας τη μετάλλαξη KRASG12C στον προχωρημένο ΜΜΚΠ

Για ασθενείς με προχωρημένο ΜΜΚΠ και τη μετάλλαξη KRASG12C που έχουν λάβει 1 προηγούμενη γραμμή συστηματικής θεραπείας¹

Το LUMYKRAS®[▼] ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) με μετάλλαξη KRASG12C και οι οποίοι παρουσίασαν εξέλιξη της νόσου μετά από τουλάχιστον μία προηγούμενη γραμμή συστηματικής θεραπείας.

*Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Συντμήσεις

ΜΜΚΠ = μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα, KRAS = Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog

Παραπομπές

1. Lumykras ΠΧΠ

ΠΧΠ

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής. Το προϊόν δεν είναι τιμολογημένο στην Ελλάδα, αναφέρεται ενδεικτική τιμή 5.828 €

Βεβαιώστε ότι είναι το φάρμακο που αγοράζετε και Αμερικής
ΟΛΕΣ οι αναγραφόμενες ενδείξεις και ΔΔΑ το φάρμακο
συμπεριλαμβάνονται στη "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρεται κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το ελληνικό σύστημα
αποστολής στη Υπηρεσία Αναφοράσεων Φαρμάκων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
(ΕΟΦ) Τηλ: +30 2103432337 με τη μέθοδο της Κλήσης Κλήσης, Ηλεκτρονικά και στην
αдреса του ΕΟΦ, www.eof.gr, www.klinikaefo.gr για έντυπο ή ηλεκτρονική σελίδα
Επικοινωνήστε στην AMGEN Ελλάς, Φαρμακεία Ε.Π.Ε. Τηλ: +30 2103447000

GRC-511-0624-80002

AMGEN

AMGEN Hellas, Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, Κτίριο C
151 24 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα, +302103447000

ONCE-DAILY ORAL

LUMYKRAS®
(sotorasib)



5^ο Συνέδριο

Navigate to the future treatments

Συμμετέχοντες

Αραβαντινός Γεράσιμος	MD, PhD, Διευθυντής, Παθολόγος Ογκολόγος, «Ευρωκλινική» Αθηνών
Αρδαβάνης Αλέξανδρος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής-Επιστημονικός Υπεύθυνος, Α΄ Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Αρδαβάνης-Λουκέρης Γεράσιμος	Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Α΄ Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Γαλάνη Ελένη	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια, Β΄ Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital
Γεωργούλιας Βασίλειος	Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Γιαννακάκου Μαρία	Ειδικευόμενη Ογκολογίας, Α΄ Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Γκαραλέα Λυδία	Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Γκόγκα Ελένη	Παθολόγος Ογκολόγος, Καθηγήτρια Παθολογίας Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Α΄ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Γκούρα Στεφάνια	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια, Β΄ Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital
Δεμίρη Σταματίνα	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια, Γ΄ Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan General», π. Διευθύντρια, Β΄ Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Πρόεδρος Ε.Ε.Ν.Ο.
Δημητριάδου Αρετή	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Ζακοπούλου Ρουμπίνη	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Ζαφείρη Γεωργία	Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Θεοχάρη Μαρία	Παθολόγος Ογκολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Καβούρη Ευαγγελία	Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Καμπόσου Βασιλική	Ειδικευόμενη Παθολογίας, Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»



Akynzeo®

netupitant/palonosetron

Ένα καψάκιο περιέχει 300 mg netupitant και 0,5 mg palonosetron

06.2024/AKYNZE0/adv 01

 **Galenica α.ε.**

ΑΘΗΝΑ: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 145 64, τηλ.: 210 5281700
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Χάλκης 8, Πυλαία 555 35, τηλ.: 2310 540478
Επιστημονικό Τμήμα τηλ.: 210 5281731
Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης τηλ.: 210 5281805
www.galenica.gr

 **HELSINN**
Building quality cancer care together

Διανέμεται κατόπιν αδείας της Helsinn Healthcare S.A, Ελβετία

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Περαιτέρω πληροφορίες περιλαμβάνονται στη
συνοπτική Περιγραφή Χαρακτηριστικών Προϊόντος



5^ο Συνέδριο

Navigate to the future treatments

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ

Καραδήμου Αλεξάνδρα

Παθολόγος Ογκολόγος, Αν. Διευθύντρια, ΣΤ' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan General»

Καραχάλιος Χαράλαμπος

Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Κοτσώρη Αικατερίνη

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια, ΣΤ' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan General»

Κουλουκούρα Χρυσούλα

Νοσηλεύτρια, MSc, Προϊσταμένη Ημερήσιας Νοσηλείας, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Κουμαριανού Άννα

MD, PhD, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Παθολόγος Ογκολόγος, Αιματολογική-Ογκολογική Μονάδα, Δ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Κυβέλου Μαρία

MD, PhD, MSc, Επεμβατική Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Α' Καρδιολογίας, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Λαζαρίδου Γαλήνη

Ειδικευόμενη Παθολογίας, Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Λαϊνάκης Γεώργιος

Παθολόγος Ογκολόγος, Metropolitan Hospital

Λασκαράκης Απόστολος

Παθολόγος Ογκολόγος MD, MSc, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα και Κέντρο Κλινικών Μελετών, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Λιανού Ασπασία

Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Μαραγκούλη Ελένη

Παθολόγος Ογκολόγος, Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Τρικάλων

Μαυράκης Αλέξιος

Ειδικευόμενος Ογκολογίας, Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Μπαρμπούνης Βασίλειος

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Ε' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Ιασώ»

Μπαφαλούκος Δημήτριος

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δ. Αττικής, Διευθυντής, Α' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital

Μπλέτσα Μαρία

MSc, PhDc, Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Μπουσού Θάλεια Ελευθερία

Ειδικευόμενη, Παθολογικής Ογκολογίας, Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Ντούλα Βαλσάμω

Νοσηλεύτρια Msc, Ημερήσιας Νοσηλείας, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Παναγιωτούνη Μαρία

Ειδικευόμενη, Παθολογικής Ογκολογίας, Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

ΟΥΑΒΑΣ[®]

bevacizumab

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.
Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή έναρξη θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Λιανική τιμή σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών 12/2023

ΟΥΑΒΑΣ C/S.SOL.IN 25MG/ML 1 VIAL x 4 ML 231,91 €

ΟΥΑΒΑΣ C/S.SOL.IN 25MG/ML VIAL x 16 ML 810,88 €

*Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου δελτίου τιμών, θα ισχύουν οι νεότερες τιμές.



DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21^ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας, Κρυσνέρι 145 68, Αττική
t +30 210 81 61 802, f +30 210 81 61 587, info@demo.gr
www.demo.gr

Always >> Forward



KAK: STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel, Germany

Αναζητήστε την ΠΧΠ
από εκπρόσωπο της
εταιρείας ή σαρώνοντας
τον QR κωδικό.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



5^ο Συνέδριο

Navigate to the future treatments

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ

Πανόπουλος Χρήστος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, «Ευρωκλινική» Αθηνών
Παντελή Βασιλική	ΤΕ Νοσηλεύτρια, MSc, ΠΕ Ψυχολόγος, Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Παπαγιαννοπούλου Αικατερίνη	Διευθύντρια, Νοσηλευτική Υπηρεσία, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι», ΠΕ Μεταπτυχιακό Διδακτορικό
Παπακώστας Παύλος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Β' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan General»
Παππά Θεοδώρα	Bsc, Msc, Προϊσταμένη, Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Πεκτασίδης Δημήτριος	Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής, Γ' Ογκολογικό Τμήμα, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Πιτέρη Μαρία	MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Αν. Διευθύντρια Ακτινοχειρουργικής, «Ιατροπόλις», Επιστημονικός Συνεργάτης, Νοσοκομείο «Υγεία»
Πλιάκου Ευαγγελία	Παθολόγος Ογκολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός ΠΝ, MD, MSc, MPH, PhDc, Νοσοκομείο «Metropolitan General»
Πλοιαρχοπούλου Κυριακή	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια, Γ' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan General»
Ρες Ελένη	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια, Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Σαμαντάς Επαμεινώνδας	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Β' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital
Σαριδάκη Ζένια	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια, Α' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital, Αθήνα, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Ογκολογικό Τμήμα, «Ασκληπιός ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ», Ηράκλειο Κρήτης
Σγουρός Ιωσήφ	Παθ. Ογκολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνος, Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Σκόνδρα Μαρία	MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center, Κλινική «Ρέα»
Σταμούλης Γεώργιος	Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Γ' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Ταλαγάνη Σοφία	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητρία, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»



onivyde®
pegylated liposomal irinotecan

Σχεδιάστηκε για να κάνει τη διαφορά ως 1^η γραμμής θεραπεία στον μεταστατικό παγκρεατικό καρκίνο

mOS **11.1** μήνες

mPFS **7.4** μήνες

ORR **41.8** %



Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάρετε τον κωδικό QR.

Για την έντυπη μορφή της ΠΧΠ, παρακαλείσθε να απευθύνεστε στον τοπικό Αντιπρόσωπο του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας

Τρόπος Διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή.
Μόνο για Νοσοκομειακή Χρήση.

Onivyde sol.in 4.3mg/ml VL 10ml: Α.Τ. €903,07 Ν.Τ. €722,65
(Σε περίπτωση τροποποίησης του Δ.Τ. ισχύουν οι νεότερες τιμές)

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα Φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

1. Onivyde® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος.
2. Wainberg ZA et al. Lancet. 2023;S0140-6736(23)01366-1.

SERVIER 
moved by you

SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ.
Φραγκοκλησιάς 7, 15125 Μαρούσι. Τηλ 210 9391000, www.servier.gr



5^ο Συνέδριο

Navigate to the future treatments

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ

Τζούδα Βασιλική

Παθολόγος Ογκολόγος, Επικουρική Ιατρός, Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Τιμπλαλέξη Δέσποινα

MD, PhD, BiolD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Δ' Ογκολογική Κλινική & Μονάδα Κλινικών Μελετών, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

Τουρκαντώνης Ιωάννης

MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Β', Β' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Τριποδάκη Έλλη Σοφία

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Τσουκαλάς Νικόλαος

MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, MSc Βιοπληροφορική, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, 417 Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., Επιστημονικός Συνεργάτης, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

Φλώρος Θεοφάνης

Παθολόγος Ογκολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός, Διευθυντής, Ε' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan General», Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Χριστοπούλου Αθηνά

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια και Υπεύθυνη, Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν. Πατρών «Άγιος Ανδρέας»

Ψαραύτης Πέτρος

Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»



5^ο Συνέδριο

Navigate to the future treatments

Γενικές Πληροφορίες

Οργάνωση:

Διεπιστημονική Εταιρεία Έρευνας και Θεραπείας του Καρκίνου

Σε συνεργασία:

Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Υπό την αιγίδα:

Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.)

Ημερομηνία διεξαγωγής:

30-31 Ιανουαρίου 2026

Τόπος διεξαγωγής:

Ξενοδοχείο Golden Age

Μιχαλακοπούλου 57, Αθήνα 115 28

Εγγραφές:

Η εγγραφή στο συνέδριο είναι δωρεάν και η παρακολούθηση επιτρέπεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας, καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να πιστοποιήσουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα (όπως η ταυτότητα ιατρικού ή φαρμακευτικού συλλόγου, νοσηλευτική ή φοιτητική ταυτότητα).

Οδηγίες φυσικής παρακολούθησης:

Όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία θα πρέπει να έχουν κάνει προεγγραφή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.events.gr. Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό barcode που θα πρέπει να σκανάρουν κατά την είσοδο και έξοδο τους στην αίθουσα.

Οδηγίες διαδικτυακής παρακολούθησης:

Εάν είσαστε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο www.livemed.gr (πατήστε στο πεδίο Register/Εγγραφή). Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε την κατηγορία Live και το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο Go Live ή Go Virtual. Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την «Αίθουσα Συνεδριάσεων». Εάν σας ενδιαφέρει να παραλάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο Συνέδριο μέσω της Εικονικής Γραμματείας, πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο «Εγγραφή», ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος.



5^ο Συνέδριο

Navigate to the future treatments

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ

Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης:

Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν 14,5 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ECMECs).

Παραλαβή Πιστοποιητικού:

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα σταλεί μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου σε όσους συνέδρους έχουν κάνει εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του συνεδρίου. Ο αριθμός Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ECMECs), θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης που θα καταγραφεί στην πλατφόρμα Livemed για όσους έχουν διαδικτυακή παρουσία και στο σύστημα καταμέτρησης στην είσοδο της αίθουσας για όσους έχουν φυσική παρουσία.

Σημείωση: Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα για λήψη έως 12 μήνες από τη λήξη της εκδήλωσης.

Γραμματεία:



Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σμύρνη

- Τηλ.: 210 98 80 032
- Website: www.events.gr
- E-mail: ets@events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η Ε.Τ.Σ. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr (πολιτική απορρήτου).



5^ο Συνέδριο Navigate to the future treatments

Χορηγοί

AMGEN

ariti[®]
next to health

AstraZeneca

BIANEE A.E.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΑΘΕΙΑ ΥΠΕΡΒΑΡΔΙΑΣΜΟΥ

 Bristol Myers Squibb


Daiichi-Sankyo

 **DEMO ABEE**
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ELPEN

 **FARAN**
ONCOLOGY

 **Galenica**
For People. For Science. For Life.

 **genepharma**

 **GENESIS**
pharma

 **innovis**
Future health today

 **INTEGRIS**
PHARMA

 **IPSEN**

Johnson & Johnson

 **Lavipharm**


LEO

 **Lilly**
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

MERCK

 **MSD**

 **Pfizer**
Oncology


Pierre Fabre
FARMAKA S.A.

 **Roche**

SANDOZ

SERVIER
moved by you

VitaLonga
PHARMACEUTICAL COMPANY

WinMedica

Letrafem®

Δισκία λετροζόλης

2.5 mg

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα
πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ARITI A.E. ΑΘΗΝΑ: Λεωφ. Τατοΐου 52,
13677 Αχαρνές
Τηλ.: 210 8002650 - Fax: 210 6207503
www.ariti.gr - info@ariti.gr

ariti®

στη λα
στον άνθρωπο

KEYTRUDA®

(pembrolizumab) for Infusion 100mg



Για την πλήρη περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην MSD ΑΦΕΕ, Αγίου Δημητρίου 63, 174 56, Άλιμος. Τηλ.: 210 9897 300, Αρ. ΓΕΜΗ 121808101000, www.msd.gr, email: dpoc.greece@msd.com

KEYTRUDA C/S.SOL.IN 25MG/ML BTx1 VIALx4ML:
2.481,70€ (Χ.Τ) 2.702,95€ (Λ.Τ) 2.231,33€ (Ν.Τ)

Copyright ©2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

[illegible]



5^ο Συνέδριο

Navigate to the future treatments

30-31 | Ιανουαρίου | 2026

Ξενοδοχείο Golden Age - ΑΘΗΝΑ

