

Οργάνωση:

ΕΔΕΜΣΕΘ - Ελληνική & Διεθνής Εταιρεία Μοριακά Στοχευμένων & Εξατομικευμένων Θεραπειών

Σε συνεργασία με την:

Ογκολογική Κλινική Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Υπό την αιγίδα:

- ΕΟΠΕ • Ιατρική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης • Ιατρικός Σύλλογος Έβρου
- Ιατρικός Σύλλογος Ροδόπης • Ιατρικός Σύλλογος Ξάνθης

Πανελλήνιο Συνέδριο

Σύγχρονα Θέματα Ογκολογίας

13-15

Μαρτίου

20

26

Ξενοδοχείο

Ramada Plaza Thraki, Αλεξανδρούπολη

Θα χορηγηθούν 15 Μόρια Συνεχιζόμενης
Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


What science can do

Κλινική καινοτομία

Οι ψηφιακές τεχνολογίες δημιουργούν πρωτόγνωρες ευκαιρίες συλλογής δεδομένων από τους ασθενείς σε πραγματικό χρόνο.

Στην AstraZeneca αναπτύσσουμε τις ψηφιακές μας δυνατότητες σε όλο το φάσμα της Έρευνας και Ανάπτυξης, για να ανακαλύψουμε καλύτερους τρόπους τροφοδότησης των κλινικών μας μελετών με επικαιροποιημένη γνώση και να βοηθήσουμε τους ασθενείς στην πρόληψη, τη διαχείριση και τη θεραπεία της ασθένειάς τους.





Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας καλωσορίζω και φέτος στο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας της Κλινικής μας «Σύγχρονα Θέματα Ογκολογίας» που διοργανώνεται στην ιστορική πόλη της Αλεξανδρούπολης και της Θράκης μας: της Γης του Ορφέα και του Δημόκριτου, του Λεύκιππου και του Αντισθένη, του Πρωταγόρα και του Εκαταίου, όλων αυτών των Φιλοσόφων που αθροιστικά τόσους αιώνες πριν κατέδειξαν αυτό που και σήμερα είναι το ζητούμενο και διακύβευμα στην Θεραπευτική του Καρκίνου:

«Η Ολιστική προσέγγιση της ασθένειας με τον ασθενή στο επίκεντρο και την ανάγκη συνεργασίας όλων των ειδικοτήτων για την καταπολέμηση του.»

Φιλοδοξούμε το συνέδριο μας να αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία να αναλύσουμε από κοντά τα νέα δεδομένα στην ογκολογία που αλλάζουν καθημερινά το θεραπευτικό τοπίο της, να ανταλλάξουμε γνώσεις και εμπειρίες πάντα με κριτική σκοπιά στην ανάλυση των νέων δεδομένων.

Για μια ακόμη χρονιά θα ανταλλάξουμε ιδέες και γνώσεις τόσο με επιστήμονες της Βασικής Έρευνας από τον χώρο της Βιολογίας αλλά και όλων των ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση του Ογκολογικού ασθενούς.

Οι εξελίξεις στον χώρο της Ογκολογίας τρέχουν, και οφείλουμε να τις παρακολουθούμε και να τις ενσωματώνουμε στην κλινική μας πράξη πάντα με κριτήριο τόσο την ολική επιβίωση όσο και την ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα των ασθενών μας.

Με αυτές τις σκέψεις, σας προσκαλώ να απολαύσετε τόσο τις εργασίες του συνεδρίου μας όσο και την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής μας.

Με εκτίμηση,

Δημήτριος Ν. Ματθαίος

Αν. Καθηγητής Ογκολογίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης



ALIMTA PD.C.SO.IN. 500mg/VIAL BTx1 VIAL
CYRAMZA CS.SOL.INF 10MG/ML BTx2 VIALx10ML
VERZENIOS F.C.TAB 50, 100 και 150MG/TAB BTx28 δισκία σε BLISTERS PCTFE/PE/PVC/Alu
RETSEVMO F.C. CAP 40 και 80MG/CAP BTx56 σκληρά καψάκια σε BLISTERS PCTFE/PE/PVC/Alu

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών κάθε Προϊόντος είναι στη διάθεσή σας.
Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή στον υπερασύνδεσμο
<https://www.lilly.gr/landing-pages/spcs-oncology> ή σκανάρετε τον κωδικό QR



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15° χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά,
ΤΗΛ.: 210 6294600, **FAX.:** 2106294610
Για παραγγελίες: ΤΗΛ.: 210 6294629, **e-mail:** orders@lilly.gr, www.lilly.gr

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα



Επιτροπές

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

Δ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

Γ. ΣΑΜΕΛΗΣ

Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή:

Β. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ

Κ. ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ

Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Π. ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ

Α. ΓΑΛΑΝΗΣ

Γ.Ρ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Κ. ΓΚΟΥΔΗ

Α. ΓΡΑΨΑ

Σ. ΔΑΠΔΑΠΗ

Α. ΔΕΛΗΜΥΤΗΣ

Σ. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ

Α. ΖΑΜΠΙΤΟΓΛΟΥ

Α. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Α. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

Μ. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ

Γ. ΚΑΡΑΤΙΔΗΣ

Ζ. ΚΑΤΣΑΡΑ

Θ. ΚΕΚΕΣ

Δ. ΚΙΟΥΣΗ

Α. ΚΟΤΙΝΗ

Τ. ΚΟΥΚΑΚΗ

Σ. ΚΟΥΡΟΥΜΙΧΑΚΗ

Π. ΚΟΥΤΟΥΚΟΓΛΟΥ

Δ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ

Μ. ΚΟΦΦΑ

Ε. ΛΙΑΝΙΔΟΥ

Λ. ΛΟΥΠΟΣ

Γ. ΛΥΠΑΣ

Α. ΜΑΡΚΟΥ

Ι. ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΥ

Ε. ΜΑΡΤΟΝ

Δ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ

Σ. ΜΠΑΚΑ

Ι. ΜΠΑΛΓΚΟΥΡΑΝΙΔΟΥ

Ε. ΜΠΙΖΙΩΤΑ

Ε. ΜΠΟΓΑΤΣΑ

Κ. ΝΕΑΝΙΔΗΣ

Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Α. ΠΑΠΠΑ

Κ. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ

Γ. ΣΑΜΕΛΗΣ

Ε. ΣΑΡΑΪΝΤΑΡΗ

Β. ΣΕΚΕΡΤΖΗ

Ε. ΣΙΤΣΑΝΛΗ

Α. ΤΟΛΙΚΑ

Ε. ΤΟΜΠΑΙΔΟΥ

Γ. ΤΡΥΨΙΑΝΗΣ

Β. ΤΣΑΛΚΑΝΗΣ

Θ. ΤΣΙΟΥΔΑ

Β. ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ

Β. ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ

Α. ΧΑΤΖΑΚΗ

Π. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Χ. ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ

DON'T MAKE THEM WAIT.

Start strong with CABOMETYX® + Nivolumab.



60% of aRCC patients don't reach 2L*2-4



67,6m FU results continue to support Cabometyx® - Nivolumab as a Standard of Care for previously untreated aRCC patients¹

Keep time on their side⁵

*Across three real-world studies, only 35-45% of patients received 2L²⁻⁴ **References:** 1. Motzer R, et al. Abstract 439. Presented at ASCO GU 2025. 2. Shah N, et al. Eur Urol. 2023;49:110-118. 3. Malik A, et al. Poster 19. Presented at IKCS 2023. 4. Lai G-S, et al. PLoS One. 2023;18(11):e0294039. 5. Bournon MT, et al. Abstract 362, Presented at ASCO GU 2024.

IPSEN MON. ΕΠΕ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 9843324

E-mail: ipsenepe@ipsen.com

www.ipsen.com/greece

Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπτησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930

ΔΤΦ: 02/01/2026

CABOMETYX F.C.TAB 20MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€

CABOMETYX F.C.TAB 40MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€

CABOMETYX F.C.TAB 60MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€




Περίληψη Χαρακτηριστικών
Προϊόντος CABOMETYX®
Ημ. αναθεώρησης κειμένου,
24 Οκτωβρίου 2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

**CABOMETYX®**
(cabozantinib) tablets

10 CABO-A/MAR 2025

 **IPSEN**




Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026

12:00-12:30	Προσέλευση - Εγγραφές	
12:30-13:45	Στρογγυλή Τραπέζι Ερευνητικές δραστηριότητες Τμημάτων Μοριακής Βιολογίας και Ιατρικής ΔΠΘ	
	Προεδρείο: Κ. Αναγνωστόπουλος, Μ. Κόφφα, Μ. Λαμπροπούλου, Χ. Ζώης	
12:30-12:45	HURP-Driven mitotic dysregulation and metastatic behavior in aggressive breast cancer cells	Χ. Ευσταθίου
12:45-13:00	Μελέτη του προφίλ μεθυλίωσης των γονιδίων PDL-1 και PD1 στο ctDNA πλάσματος ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα που λαμβάνουν ανοσοθεραπεία	Λ. Λούπος
13:00-13:15	Κλινική μελέτη χορήγησης προβιοτικών σε ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοθεραπεία για συμπαγή νεοπλάσματα	Κ. Νεανίδης
13:15-13:30	Precision targeting of the endolysosomal network to enhance Liposomal therapeutic response in cancer	Φ. Αντωνιάδης
13:30-13:45	Ερωτήσεις-Συζήτηση	
13:45-14:45	Στρογγυλή Τραπέζι Η φωνή των ασθενών	
	Προεδρείο: Θ. Κωνσταντινίδης, Ε. Μανωλόπουλος, Δ. Ματθαίος	
13:45-14:00	Ο ογκολογικός ασθενής στο επίκεντρο. Ανάγκες και προτάσεις	Ε. Ντελιοπούλου
13:00-14:00	Προτάσεις και δράσεις της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας	Ν. Δημάσης
14:15-14:45	Σχολιασμός - Σύλλογοι Καρκινοπαθών	
	Χ. Παλαιολόγου , Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φίλων Ν. Έβρου "Συνεχίζω"	
	Ε. Ορφανού , Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών & Σπανίων Παθήσεων Ν. Εβρου «Μαζί για Ζωή»	
	Ρ. Κοκκινάκη , Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φίλων Ν. Ροδόπης "Δύναμη Ψυχής"	
	Θ. Ροκκά , Πρόεδρος Παραρτήματος Έβρου Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας	
14:45-15:30	Μεσημβρινή Διακοπή	

ALYMSYS[®]

Bevacizumab



Alymsys.02.05/2025



Πριν την
συνταγογράφηση
συμβουλευτείτε
την Περίληψη
Χαρακτηριστικών
Προϊόντος

Τοπικός Αντιπρόσωπος

WinMedica

Για περισσότερες πληροφορίες:
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Αγνισιλάου 6-8, Μαρούσι 151 23
Τηλ.: 210 7488821, Fax: 210 7488827
info@winmedica.gr
www.winmedica.gr

Κάτοχος Άδειας
Κυκλοφορίας

mAbxience
From lab to life

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για ενδοφλέβια χρήση μετά από αραίωση
Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή:
Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση.
Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους
επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενος ανεπιθύμητος ενέργειες.

Νοσοκομειακές Τιμές:

ALYMSYS C/S SOLIN 25MG/ML VIAL X 16 ML: 586,28 €
ALYMSYS C/S SOLIN 25MG/ML VIAL X 4 ML: 150,24 €

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026

15:30-16:30

Στρογγυλό Τραπέζι

Μοριακή Βιολογία

Προεδρείο: **Ι. Μαρουλάκου, Α. Παππά**

15:30-15:45

Υγρή βιοψία, εφαρμογές και προοπτικές

Ι. Μπαλγκουρανίδου

15:45-16:00

Αυξάνοντας τον πήχη της ακρίβειας και αποτελεσματικότητας του μοριακού ελέγχου στα συμπαγή νεοπλάσματα

Ε. Παπαδοπούλου

16:00-16:15

Κατευθυντήριες οδηγίες μέσω AI

Δ. Ματθαίος

16:15-16:30

Ερωτήσεις-Συζήτηση

16:30-17:45

Στρογγυλό Τραπέζι

Υποστηρικτική Αγωγή

Προεδρείο: **Γ. Σαμέλης, Θ. Ψαλτοπούλου**

16:30-16:50

Κλινικές επιβιωσάντων καρκίνου

Κ. Κалаϊτζή

16:50-17:10

Ο ρόλος της άσκησης

Α. Φιλίππου

17:10-17:30

Το μέλλον της κατοίκον φροντίδας του ογκολογικού ασθενούς

Μ. Νικολάου

17:30-17:45

Ερωτήσεις-Συζήτηση

17:45-18:00

Διάλειμμα Καφέ

18:00-19:15

Στρογγυλό Τραπέζι

Ακτινοβιολογία-Πυρηνική Ιατρική-Ακτινοθεραπεία

Προεδρείο: **Π. Βαλσαμάκη, Σ. Δευτεραίος, Α. Ζησιμόπουλος**

18:00-18:20

Theranostics

Π. Βαλσαμάκη

18:20-18:40

Η τεχνητή νοημοσύνη στην Ακτινοθεραπεία

Μ. Παντελιάδου

18:40-19:00

Η τεχνητή νοημοσύνη στην Ακτινολογία

Σ. Δευτεραίος

19:00-19:15

Ερωτήσεις-Συζήτηση

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΑ: ως μονοθεραπεία για ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαθέσιμες τυπικές θεραπείες¹

 **Fruzaqla®** ▼
(fruquintinib) capsules

Επαναπροσδιορίστε την επιβίωση

Η πρώτη στοχευμένη θεραπεία στον mCRC ανεξαρτήτως μεταλλάξεων^{1,3}

Το FRUZAQLA ενδείκνυται:

Το FRUZAQLA ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία του μεταστατικού ορθοκολικού καρκίνου (mCRC) σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαθέσιμες τυπικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της χημειοθεραπείας με βάση την φθοριοπυριμιδίνη, την οξαλιπλατίνη και την ιρινοτεκάνη, παράγοντες αντι-VEGF και παράγοντες αντι-EGFR, και οι οποίοι έχουν παρουσιάσει πρόοδο νόσου ή είχαν δυσανεξία σε θεραπεία είτε με τριφλουριδίνη/τιπιρασίλη είτε με μεγεροραφενίμπη.

Βιβλιογραφικές παραπομπές:

1. FRUZAQLA®. Περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος.
2. Dasari A, Lonardi S, Garcia-Carbonero R, et al; FRESCO-2 Study Investigators. Fruquintinib versus placebo in patients with refractory metastatic colorectal cancer (FRESCO-2): an international, multicentre, randomised, double-blind, phase 3 study. Lancet. 2023;402(10395):41-53.
3. Li J, Qin S, Xu R, et al. Effect of fruquintinib vs placebo on overall survival in patients with previously treated metastatic colorectal cancer: the FRESCO randomized clinical trial. JAMA. 2018;319(24):2486-2496.

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

FRUZAQLA Tabs, 5 mg/Tab, BT x 21: Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού 5.652,21€
FRUZAQLA Tabs, 1 mg/Tab, BT x 21: Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού 1.420,15€

Ενδεικτική τιμή πώλησης/συσκευασία [με βάση την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τους κανόνες τιμολόγησης και ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους (on patent)].

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ΕΔΩ.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.


Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Κάτοχος άδειας Κυκλοφορίας
Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland
Τοπικός Αντιπρόσωπος Takeda Ελλάς Α.Ε.
Green Plaza, Κτίριο Β, Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, 151 24 Μαρούσι
Τηλ. κέντρο: 2106387800, Fax: 2106387801, www.takeda.gr

Πριν από τη συνταγογράφηση του
FRUZAQLA, συμβουλευτείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος (ΠΧΠ), η οποία είναι
διαθέσιμη μέσω του κώδικα QR.



EXA/GR/FRZ/0006, 01/25



Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026

19:15-21:30

Στρογγυλή Τραπέζι

Καρκίνος Ήπατος-Πεπτικού

Προεδρείο: **Κ. Αμαραντίδης, Μ. Καραμούζης, Κ. Μιμίδης**

19:15-19:35

Νεότερα δεδομένα στον ηπατοκυτταρικό καρκίνο και καρκίνο χοληφόρων

Μ. Καραμούζης

19:35-19:55

Ο θεραπευτικός αλγόριθμος στον οισοφαγογαστρικό καρκίνο, πρώιμη και μεταστατική νόσος

Κ. Λόγα

19:55-20:15

Συνδυασμοί ανοσοθεραπείας στη διαχείριση του καρκίνου παχέος εντέρου

Ε.Ι. Μπογατσά

20:15-20:45

Η διαχείριση των HER2- καρκινωμάτων ανώτερου γαστρεντερικού σωλήνα με ανοσοθεραπεία στην προχωρημένη νόσο

Γ. Ράλλης

sponsored by  Bristol Myers Squibb

20:45-21:05

Ηπατικές μεταστάσεις. Χειρουργική προσέγγιση

Μ. Καρανίκας

21:05-21:30

Ερωτήσεις-Συζήτηση

Υπερβαίνοντας τον Φόβο του Τρυπήματος



Pelgraz.01.05/2025



Για πλήρεις
συναγογραφικές
πληροφορίες
συμβουλευτείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος

Νοσοκομειακή Τιμή

PELGRAZ INJ.SOL 6MG/0.6ML (10MG/ML) 1 PF. SYR με προστατευτικό ασφαλείας x 0.6 ML+1 τολύπιο με οινόπνευμα 301,93€

PELGRAZ INJ.SOL 6MG/0.6ML (10MG/ML) 1 προγεμισμένος εγχυτήρας+1 τολύπιο με οινόπνευμα 301,93€

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται, σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού

Τοπικός Αντιπρόσωπος

WinMedica

Για περισσότερες πληροφορίες:
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Αγροσιλάου 6-8, Μαρούσι 151 23
Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827
info@winmedica.gr
www.winmedica.gr

Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας
Accord Healthcare S.L.U.


accord

We make it better

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοферете:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΥΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Orlik G, Vlahal V, Gorniewska-Matracak J. Poster Board 071: Can Fear Of Injection Be Managed By Autoclaved Injections? Internet: Survey With Healthcare Professionals About Neutropenic Patients. European Journal of Oncology Pharmacy, October 2018; Vol. 1 Issue 3: 5-11 p.65



Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

09:00-10:35

Στρογγυλό Τραπέζι

Εξελιξίσεις στον Καρκίνο του Μαστού

Προεδρείο: **Κ. Αμαραντίδης, Ε. Ευφραιμίδου, Ε. Λάλλα, Μ. Τόλια**

09:00-09:15

Νεότερα δεδομένα από τα τελευταία ESMO, ASCO και SABCS

Χρ. Κουκουτζέλη

09:15-09:30

Πώς διαμορφώνεται ο θεραπευτικός αλγόριθμος στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού

Π. Καραδαγλής

09:30-09:45

Anti-HER2 θεραπεία στον μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Νεότερα δεδομένα

Α. Φωταρέλλη

09:45-10:15

Εξελιξίσεις στη θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με ορμονοανθεκτικό καρκίνο μαστού και PIK3CA μετάλλαξη

Ε. Καραμητρούσης

sponsored by



10:15-10:30

Ακτινοβολία μασχάλης στο επικουρικό setting. Νεότερα δεδομένα

Ξ. Βακάλης

10:30-10:35

Ερωτήσεις-Συζήτηση

10:35-12:00

Στρογγυλό Τραπέζι

Γυναικοποιογικός Καρκίνος

Προεδρείο: **Ε. Κοντομανώλης, Μ. Κουκουράκης, Β. Κουλουλίας, Π. Τσικούρας**

10:35-10:55

Νεότερα δεδομένα στην χρήση των PARP αναστολέων στον καρκίνο των ωοθηκών

Α. Καντζιούρα

10:55-11:15

Μοριακή κατηγοριοποίηση του καρκίνου του ενδομητρίου και θεραπευτικές προοπτικές

Ν. Καποδίστριας

11:15-11:35

Η θέση του Tisotumab Vedotin και νέων μορίων στον μεταστατικό καρκίνο του τραχήλου μήτρας. Νεότερα δεδομένα

Ε. Λιανός

11:35-11:55

Τι άλλαξε στην ακτινοθεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του ενδομητρίου και τραχήλου της μήτρας

Α. Ζυγογιάννη

11:55-12:00

Ερωτήσεις-Συζήτηση

12:00-12:15

Διάλειμμα Καφέ

HALT PROGRESSION WITH PRECISION¹



In patients with grade 2 mIDH1/2
astrocytoma and oligodendroglioma^{1,2}

SERVIER 
moved by you

SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ.

Φραγκοκλυσίας 7, 15125 Μαρούσι.

Τηλ 210 9391000, www.servier.gr



Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος, ανατρέξτε στις τελευταίες
σελίδες του προγράμματος ή σκανάρετε
τον κωδικό QR code

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα Φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»


1. Mellingshoff IK et al. Eng/ Med. 2023;389:589-601.

2. VORANIGO®. Summary of Product Characteristics. 2025

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση

Voranigo® F.C TAB 40 mg/tab BTx30 Ενδεικτική Λ.Τ €19.973,00

 **Vorango**®
vorasidenib tablets



Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

12:15-14:15

Στρογγυλό Τραπέζι

Ουρογεννητικός Καρκίνος

Προεδρείο: **Χ. Καλαϊτζής, Ε. Μαραγκούλη, Α. Μπάμιας, Γ. Τσακαλδήμης**

12:15-12:45

Νεότερα δεδομένα στη θεραπεία αντιμετώπισης των ασθενών 1^{ης} γραμμής του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου του ουροθηλίου

Ν. Πισταμαλτζιάν

sponsored by  **MSD**

12:45-13:05

Επιλογή ασθενών για μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία σε ασθενείς με καρκίνο προστάτη

Μ. Τριχάς

13:05-13:25

Νεότερα δεδομένα στη διαχείριση του μεταστατικού ορμονοάντχου καρκίνου του προστάτη

Π. Βλαχοστέργιος

13:25-13:55

Οι σύγχρονες προκλήσεις στη θεραπευτική προσέγγιση του μεταστατικού καρκίνου του νεφρού μετά την επικουρική θεραπεία

Ρ. Ζακοπούλου

sponsored by  **IPSEN**

13:55-14:15

Πως διαμορφώνεται το τοπίο στον ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη

Δ. Νάση

14:15-14:45

Μεσημβρινή Διακοπή

Algotra®

ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ

37,5 mg υδροχλωρικής τραμαδόλης & 325 mg παρακεταμόλης


anaBIOsis
pharmaceuticals

Sancuso®

διαδερμικό έμπλαστρο γρανισετρόνης

PecFent®

ΡΙΝΙΚΟ ΕΚΝΕΦΩΜΑ ΚΙΤΡΙΚΗΣ ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗΣ



Abstral®

ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΑ ΔΙΣΚΙΑ ΚΙΤΡΙΚΗΣ ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗΣ

Algotra
manufactured by



K.A.K.



Πρωτοπόροι στην παρηγορική φροντίδα

ΠΧΠ Abstral



ΠΧΠ Pecfent



ΠΧΠ Sancuso



ΠΧΠ Algotra




anaBIOsis
pharmaceuticals

Αθήνα: Παράπλευρος Α. Κύμης 3-7, 14122, Νέο Ηράκλειο, Αττικής, τηλ: 210 271 1020, V: 210 271 2001
Θεσ/νίκη: 12ο χλμ Θεσσαλονίκης-Ν.Μουδανίων, 57001, Θεσ/νίκη, τηλ: 2310 489360, fax 2310 489396
email: info@anabiosis.gr • site: www.anabiosis.gr, AP: ΓΕΜΗ: 4124201000

Περαιτέρω πληροφορίες
διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

anaBIOsis/SupportiveCare/reminder/09.2025



Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

14:45-16:20

Στρογγυλό Τραπέζι

Καρκίνος Πνεύμονα

Προεδρείο: **Σ. Αγγελάκη, Σ. Ανευλαβής, Π. Ζαρογουλίδης, Θ. Τσιούδα**

14:45-15:15

Αξιολογώντας τα μακροχρόνια δεδομένα στον μεταστατικό ΜΜΚΠ με στόχο την επιβίωση

Θ. Φλώρος

sponsored by



15:15-15:45

Ενδυναμώνοντας τον ρολό της ανοσοθεραπείας πρώτης γραμμής στο ΜΜΚΠ

Ι. Κοραντζής

sponsored by



15:45-16:15

Η ανοσο-ογκολογική στόχευση του DLL3 στο μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα

Ε. Μπιζιώτα

sponsored by



16:15-16:20

Ερωτήσεις - Συζήτηση

16:20-17:30

Στρογγυλό Τραπέζι

Εξελιξεις στην Επικουρική Θεραπεία. Ανοσοθεραπεία και Εξελιξεις στην Επικουρική Θεραπεία

Προεδρείο: **Ν. Κεντεποζίδης, Α. Κούτρας, Ε. Χρηστακίδης**

16:20-16:40

Επικουρική θεραπεία καρκίνου πνεύμονα

Γ. Ρίζος

16:40-17:00

Επικουρική θεραπεία καρκίνου νεφρού και ουροδόχου κύστης

Π. Κουτουκόγλου

17:00-17:20

Θεραπευτικές επιλογές σε ασθενείς υψηλού κινδύνου καρκίνου μαστού

Γ. Λύπας

17:20-17:30

Ερωτήσεις - Συζήτηση

Το BRAFTOVI® (encorafenib) σε συνδυασμό με MEKTOVI® (binimetinib)
ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο μη
μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα με μετάλλαξη BRAF^{V600E1,2}

ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ από την πρώτη γραμμή θεραπείας¹⁻³

Στοχευτικός συνδυασμός με ουσιαστικά οφέλη³



BRAFTOVI® + MEKTOVI®
(encorafenib) (binimetinib)



BRAFTOVI®
Περίληψη
Χαρακτηριστικών Προϊόντος



MEKTOVI®
Περίληψη
Χαρακτηριστικών Προϊόντος

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε τις Περίληψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

Βιβλιογραφία

1. BRAFTOVI® Summary of Product Characteristics. Pierre Fabre Médicament, September 2025. 2. MEKTOVI® Summary of Product Characteristics. Pierre Fabre Médicament, September 2025. 3. Johnson, M.L. et al. 2025. Updated overall survival analysis from the Phase II PHAROS study of encorafenib plus binimetinib in patients with BRAF V600E-mutant metastatic non-small cell lung cancer. Journal of Clinical Oncology, 43(35), pp. 3706–3713. doi:10.1200/JCO-25-0202.

Σύνοψη προφίλ ασφάλειας: Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες (>25%) που εμφανίστηκαν σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με BRAFTOVI χορηγούμενο με MEKTOVI ήταν κόπωση, ναυτία, διάρροια, έμετος, κοιλιακό άλγος, μυοπάθεια/μυϊκές διαταραχές και αρθραλγία^{1,2}.

Για το BRAFTOVI®:

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση: 75 mg σκληρά καψάκια. Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 75 mg encorafenib.

Νοσοκομειακή τιμή (CAPS 75MG): € 909,38, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%.

Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Για το MEKTOVI®:

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 15 mg binimetinib.

Νοσοκομειακή τιμή (TABS 15MG): €1.443,04, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%.

Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.


© 2026 Pierre Fabre, με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Το BRAFTOVI® είναι εμπορικό σήμα της Array Biopharma Inc., θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Pfizer Inc. Το MEKTOVI® είναι εμπορικό σήμα της Array Biopharma Inc., θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Pfizer Inc.

Βασίστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Pierre Fabre

Αγιοσπύλου 6-8, 151 23 Μαρούσι
Τηλ.: 210 7234582



Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

17:30-18:30

Lectures

Chair: **D. Mavroudis, K. Chatzaki**

17:30-17:50

New promising therapeutic targets and molecules in Prostate Cancer Research

E. Antonarakis

17:50-18:10

New treatment strategies in bladder cancer research

P. Grivas

18:10-18:30

Optimizing Oncology Clinical trials in the era of AI

P. Msaouel

18:30-18:45

Διάλειμμα Καφέ

18:45-19:05

Διάλεξη

Καινοτομία στην ογκολογία

Προεδρείο: **A. Γαλάνης, I. Κοτσιανίδης, E. Τιμοθεάδου**

Αξιοποιώντας το μικροβίωμα στη θεραπευτική των συμπαγών όγκων **K. Νεανίδης**

19:05-20:20

The need of Balkan Society of Medical Oncology

Chair: **S. Baka, D. Matthaios**

19:05-19:25

Bulgaria **J. Arabadjiev**

19:25-19:45

Romania **G.Kacsó**

19:45-20:05

Slovakia **M. Chovanec**

20:05-20:20

Turkey **Y. Ürün**

20:20-21:00

Τελετή Έναρξης

20:20-20:30


Χαιρετισμοί

20:30-21:00

Η Θράκη στο σταυροδρόμι της ιστορίας

A. Γιαννακίδου

Revolutionizing Precision Medicine:
Simultaneous
FFPET & PLASMA Testing
for Comprehensive Molecular Profiling



Designed to give the physician a thorough outlook on treatment options related to:

- » Targeted therapy
- » Immunotherapy
- » Chemotherapy

Why Choose Simultaneous Tissue and Liquid Biopsy Testing?

- » Faster turnaround time, enabling patients to receive timely the preferred treatment.
- » Increased diagnostic accuracy by enhanced sensitivity of mutation detection, hence reducing false negative results.



Genekor

Committed to Biotechnological Innovation

Letrafem®

Δισκία λετροζόλης

2.5 mg

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα
πιο ασφαλή και αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ARITI A.E. ΑΘΗΝΑ: Λεωφ. Τατοΐου 52,
13677 Αχαρνές
Τηλ.: 210 8002650 - Fax: 210 6207503
www.ariti.gr - info@ariti.gr

ariti®

Σηλα
στον άνθρωπο

innohep[®]

tinzaparin sodium



Χορηγείται με ιατρική συνταγή.
Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες επικοινωνήστε
με την LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

Για το ισχύον δελτίο τιμών
των φαρμάκων της LEO Pharma
σκανάρετε εδώ




LEO Pharmaceutical Hellas S.A
Παπανικολή 22Α, 15232, Χαλάνδρι
Τηλ: 212 222 5000
contact@leo-pharma.com
αφ. ΓΕΜΗ 117058301000



Advancing the care of
patients with thrombosis

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

© LEO Pharma copyright - GR_inn_adv_Nov_2024- MAT-71106.
All LEO Pharma trademarks mentioned belong to the LEO Pharma Group.



Κατάλογος Ομιλητών Προέδρων

Antonarakis Emmanuel	Clark Endowed Professor of Medicine and Director of Genitourinary Oncology, Division of Hematology/Oncology and Transplantation, University of Minnesota, Associate Director for Translational Research, Masonic Cancer Center
Arabadjiev Jeli azko	MD, PhD, MPH, Associate Professor in Oncology, Board Member and Mission Ambassador to Romania, Bulgaria and Lithuania for the EU Mission on Cancer at European Commission, President of Bulgarian Scientific Society of Immuno-oncology
Chovanec Michal	MD, PhD, Associate Professor, 2nd Department of Oncology, Comenius University Bratislava, Slovakia
Grivas Petros	MD PhD, Professor, Department of Medicine, Division of Hematology Oncology, Clinical Director, Genitourinary Cancers Program, University of Washington, Professor, Clinical Research Division, Fred Hutchinson Cancer Center
Kacso Gabriel	Professor of Radiation Oncology, Iuliu Hatieganu Medical, University Cluj
Msaouel Pavlos	MD, PhD, Associate Professor, Department of Translational Molecular Pathology, Division of Pathology and Laboratory Medicine, Associate Professor, Department of Genitourinary Medical Oncology, Division of Cancer Medicine, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, Regular Member, UT Houston Graduate School of Biomedical Sciences, Houston, Texas
Ürün Yüksel	Professor of Medical Oncology, Department of Medical Oncology, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey
Αγγελάκη Σοφία	Καθηγήτρια Παθολογικής Ογκολογίας, Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η., Εργαστήριο Μεταφραστικής Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αμανατίδου Μαρία	Νοσηλεύτρια, RN, MSc (HSM), PhD©, Επικεφαλής Επιθεωρητής ΣΔΠ (QMLA), Συντονίστρια Χειρουργικής Ειδικότητας 4 ^η Υ.ΠΕ., Γραφείο Διεύθυνσης Ν.Υ., Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης - Γραφείο Εκπαίδευσης
Αμαραντίδης Κυριάκος	MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος	Καθηγητής, Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ανευλαβής Σταύρος	Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Αντωνιάδης Φίλιππος	MSc, Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογία, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βακάλης Ξενοφών	Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων-Εργαζομένων Ακτινοθεραπείας, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΟΥΑΒΑΣ[®]

bevacizumab

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.
Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή έναρξη θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Λιανική τιμή σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών 12/2023

ΟΥΑΒΑΣ C/S.SOL.IN 25MG/ML 1 VIAL x 4 ML 231,91 €

ΟΥΑΒΑΣ C/S.SOL.IN 25MG/ML VIAL x 16 ML 810,88 €

*Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου δελτίου τιμών, θα ισχύουν οι νεότερες τιμές.

ΟΥΑΒΑΣ/497/1 06/2024



DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21^ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας, Κρυσσένρι 145 68, Αττική
t +30 210 81 61 802, f +30 210 81 61 587, info@demo.gr
www.demo.gr

Always >> Forward



KAK: STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel, Germany

Αναζητήστε την ΠΧΠ
από εκπρόσωπο της
εταιρείας ή σαρώνοντας
τον QR κωδικό.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Βαλασαμάκη Πιπίτσα

Πυρηνική Ιατρός, MD, PhD, Επίκουρη Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής, Διευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής-Μονάδας Ποζιτρονικής Απεικόνισης, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Βλαχοστέργιος Παναγιώτης

MD, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Cornell, ΗΠΑ - Επιμελητής, Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Ιαώ» Θεσσαλίας

Γαζούλη Ιωάννα

Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια, Α' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital

Γαλάνης Αλέξιος

Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Γεωργιάδου Αναστασία

Νοσηλεύτρια MSc, PhD(c), Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Γιακουστίδης Δημήτριος

MD, PhD, Χειρουργός, Καθηγητής Χειρουργικής, Α.Π.Θ., Διευθυντής, Ε' Χειρουργική Κλινική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Γιαννακίδου Αγγελική

Ιδρύτρια και Πρόεδρος του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης

**Γιατρομανωλάκη
Αλεξάνδρα**

Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομίας, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δευτεραίος Σάββας

Καθηγητής Ακτινολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Διευθυντής Τμήματος Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Δημάσης Νικόλαος

MD, PhD, Χειρουργός Ουρολόγος – Ογκολόγος, τ. Διευθυντής Ουρολογικού - Ογκολογικού Τμήματος, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

Ευσταθίου Χρήστος

Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ευφραϊμίδου Ελένη

MD, MSc, PhD, Breast Surg. Sp., Καθηγήτρια Χειρουργικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Διευθύντρια, Α' Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, Επ. Υπ. Μονάδος Μαστού & Χειρουργικής Μαστού

Ζακοπούλου Ρουμπίνη

Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Ζαρογουλίδης Πάυλος

Ειδικός Επεμβατικός Πνευμονολόγος, Βιοκλινική Θεσσαλονίκης, Γενική Κλινική «Euromedica»

Ζησιμόπουλος Αθανάσιος

Ομότιμος Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, τ. Διευθυντής, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Ζυγογιάννη Άννα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν.Α. «Αρεταίειο»

Ζώης Χρήστος

Επίκουρος Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης



ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

- Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 300 mg δαρολουταμίδης.
- Έκδοχο με γνωστή δράση: κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 186 mg μονοϋδρικής λακτόζης

Λιανική τιμή: 3031.95 €



Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας:
Bayer AG 51368, Leverkusen, Γερμανία

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
Bayer Ελλάς ABEE, Αghισιάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα
Τηλ: 210 6187500, Αρ. ΓΕΜΗ: 000299101000

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης
Τηλ: +30 210 6187742, Φαξ: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που θα βρείτε σαρώνοντας το QRC ή ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/nubeqa-epar-product-information_el.pdf, Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: Ιούλιος 2025

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται
ιατρική συνταγή
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

PP-NUB-GR-0117-1
09.2025

Θεολογίδου Ειρήνη	Νοσηλεύτρια MSc, Υπεύθυνη Μ.Μ.Α., Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Μέλος Επιτροπής του Επιστημονικού Τομέα Ογκολογικής Νοσηλευτικής, Ε.Ν.Ε., Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. ΕΣΥ- ΕΒΡΟΥ
Καλαϊτζή Καλλιόπη	MD, MSc, PhD, Ιατρός Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, Lifestyle Medicine & Culinary Coaching, Ιδρύτρια και Επιστημονική Υπεύθυνη «The Longevity & well-being clinic», Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικών»
Καλαϊτζής Χρήστος	Καθηγητής Ουρολογίας, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Καντζιούρα Αρετή	MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Γ' Ογκολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Καποδίστριας Νικόλαος	PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Κέρκυρας «Αγία Ειρήνη»
Καραβασίλη Αναστασία	Νοσηλεύτρια, Αν. Προϊσταμένη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας - Χ.Μ.Θ. Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Καραγιαννάκης Αναστάσιος	MD, MSc, PhD, Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Διευθυντής, Β' Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Καραδαγλής Πασχάλης	Παθολόγος Ογκολόγος, Κλινική «Άγιος Λουκάς»
Καραμητρούσης Ευάγγελος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Καραμούζης Μιχαήλ	Παθολόγος-Ογκολόγος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος Δ.Σ., Ινστιτούτο Μοριακής Ιατρικής και Βιοϊατρικής Έρευνας
Καρανίκας Μιχαήλ	MD, MSc, PhD, FACS. Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής, Α' Πανεπιστημιακή Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κεντεποζίδης Νικόλαος	Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, MSc, Διευθυντής, Δ' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan General
Κοκκινάκη Ροδιανή	Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φίλων Νομού Ροδόπης «Δύναμη Ψυχής»
Κοντομανώλης Εμμανουήλ	Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Κοραντζής Ιπποκράτης	Παθολόγος Ογκολόγος, Δ' Ογκολογική Κλινική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
Κοτσιανίδης Ιωάννης	Καθηγητής Αιματολογίας, Διευθυντής, Αιματολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Κουκάκη Τριανταφυλλιά	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β' Πανεπιστημιακής Ογκολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης



SHE IS RESILIENT
SHE IS READY
SHE IS HERE

Το ELAHERE ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με θετικό στον υποδοχέα άλφα του φολικού οξέος (FRA), ανθεκτικό στην πλατίνα, υψηλής κακοήθειας, ορώδη επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών, καρκίνο των σαλπίγγων ή πρωτοπαθή καρκίνο του περιτοναίου που έχουν λάβει ένα έως τρία προηγούμενα συστηματικά θεραπευτικά σχήματα.^{1,2}

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

1. ELAHERE®, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 08/2025.
2. Moore KN, Angelergues A, Konecny GE, et al. Mirvetuximab soravtansine in FRA-positive, platinum-resistant ovarian cancer. N Engl J Med. 2023;389(23):2162-2174. doi:10.1056/NEJMoa2309169.

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλέπε παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε

**ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

ELAHERE C/S.SOL.IN 5MG/ML 1 VIAL (GLASS) X 20ML
Π.Λ.Τ: 3.221,74 €



Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος πατήστε εδώ, ή σκανάρτε το QR code.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Τηλ.: 214 4165555 • greekmedinfo@abbvie.com

abbvie

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την AbbVie με σκοπό τη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων με επαγγελματίες υγείας υπόκεινται στη Δήλωση Απορρήτου της AbbVie της χώρας διαμονής του επαγγελματία υγείας. Οι Παγκόσμιες Δηλώσεις Απορρήτου της AbbVie είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://www.abbvie.gr/privacy.html>, καθέμία από τις οποίες περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της AbbVie για Επαγγελματίες Υγείας, τον σχετικό Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδομένων της AbbVie και τον τρόπο με τον οποίο οι Επαγγελματίες Υγείας μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σχετικά με την ιδιωτικότητα των δεδομένων τους.

Κουκουράκης Μιχαήλ	Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Διευθυντής, Κλινική Ακτινοθεραπευτική Ογκολογίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Αντιπρόεδρος Ιατρικού Τμήματος Δ.Π.Θ.
Κουκουτζέλη Χρυσάνθη	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια, Β΄ Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Κουλουλίας Βασίλειος	Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Εργαστηρίου Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικών»
Κουμαριανού Άννα	MD, PhD, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Παθολόγος - Ογκολόγος, Αιματολογική-Ογκολογική Μονάδα, Δ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικών»
Κουτουκόγλου Πρόδρομος	MD, MSc, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής, Ογκολογική Κλινική, 424 Γ.Σ.Ν.Ε
Κούτρας Άγγελος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος, Π.Γ.Ν. Πατρών
Κόφφα Μαρία	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κυτταρικής Βιολογίας, Εργαστήριο Μοριακής Κυτταρικής Βιολογίας, Κυτταρικού Κύκλου και Πρωτεομικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κωνσταντινίδης Θεόδωρος	Ειδικός Ιατρός Εργασίας και Περιβάλλοντος, Καθηγητής Ιατρικής, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας, Διευθυντής Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Λάλλα Ευθαλία	Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Λαμπροπούλου Μαρία	Καθηγήτρια Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Διευθύντρια Μορφολογικού/Κλινικοεργαστηριακού Τομέα, Τμήματος Ιατρικής, Διευθύντρια Εργαστηρίων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης & Π.Γ.Ν.Α. Αλεξανδρούπολης
Λιανός Ευάγγελος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Παθολογικό - Ογκολογικό Τμήμα, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»
Λόγα Κωνσταντία	Παθολόγος-Ογκολόγος, Πανεπιστημιακή Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Λούπος Λεντιόνα	Μοριακή Βιολόγος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Λύπας Γεώργιος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Τμήματος Γενετικής Ογκολογίας, Νοσοκομείο «Υγεία»
Μανομενίδης Γεώργιος	Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μανωλόπουλος Ευάγγελος	Καθηγητής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, τ. Πρόεδρος ΕΟΦ
Μαραγκούλη Ελένη	Παθολόγος - Ογκολόγος, Α΄ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Τρικάλων
Μαρουλάκου Ιωάννα	Καθηγήτρια Γενετικής, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

OPDIVO
(nivolumab)

INJECTION FOR INTRAVENOUS USE 10 mg/mL



YERVOY
(ipilimumab)

Injection for intravenous infusion 5mg/mL

KRAZATI
(adagrasib) 200 mg
TABLETS



 **Bristol Myers Squibb**[®]

Bristol - Myers Squibb A.E.

Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική

ΤΘ 63889 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική

Τηλ. 210 6074 300 & 210 6074 400, Fax: 210 6074 333, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
www.kitrinikarta.gr
www.kitrinikarta.gov.cy

O-ONCO 466-GR-2600001/February 2026

Ματθαίος Δημήτριος	Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Ογκολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Μαυρουδής Δημήτριος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μεντεσίδου Βαϊά	Medical Oncologist, Research Fellow, Department of Medical Oncology, Gustave Roussy, Villejuif, France
Μιμίδης Κωνσταντίνος	Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας, Α' Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μοσχούρης Ιπποκράτης	Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας - Επεμβατική Ακτινολογία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μπάκα Σοφία	Παθολόγος Ογκολόγος, Αν. Καθηγήτρια Μοριακής Ιατρικής Α.Π.Θ., Διευθύντρια Κλινικής Μοριακής Ιατρικής, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Μπαλκουρανίδου Ιωάννα	Βιολόγος, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Ογκολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μπάμιας Αριστοτέλης	Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική (τ. Δ/ντης), Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Επιστ. Συνεργάτης, Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία», Αντιπρόεδρος Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ)
Μπιζιώτα Ειρήνη	MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Μπογατσά Ευαγγελία - Ιωάννα	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Νάση Δέσποινα	Παθολόγος Ογκολόγος Επιμελήτρια Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Αναργυροί»
Νεανίδης Κωνσταντίνος	MD, MSc, Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική, 424 Γ.Σ.Ν.Ε.
Νικολάου Μιχαήλ	MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Α' Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Ντελιοπούλου Ελένη	Υπεύθυνη Τέχνης & Πολιτισμού ΕΛΛΟΚ-Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, Επίτιμη Πρόεδρος Άλμα Ζωής Θεσσαλονίκης
Ντόλιος Πασχάλης	Πνευμονολόγος, Αλεξανδρούπολη
Ορφανού Εύη	Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών & Σπανίων Παθήσεων Νομού Έβρου «Μαζί για Ζωή»
Παλαιολόγου Χριστίνα	Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φίλων Ν. Έβρου «ΣυνεχίζΩ», Ψυχολόγος με εξειδίκευση στην Ψυχοκοινωνική Ογκολογία
Παντελιάδου Μαριάνθη	Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης, Νοσοκομείο «Ιασώ», Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ Χαλανδρίου
Παπαδοπούλου Ειρήνη	PhD, International Laboratory Director, Genekor Medical S.A

ENHERTU ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 Ή 2 ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ^{1,2}

IN HR+ /HER2-LOW AND
HER2-ULTRALOW mBC¹

 **ENHERTU**[®] ▼
trastuzumab deruxtecan

▼ Το φάρμακο τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +302132040337, Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kittrinkarta.gr>

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ¹

Καρκίνος του μαστού

• HER2-Θετικός καρκίνος του μαστού

Το EnherTu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό HER2-Θετικό καρκίνο του μαστού που έχουν λάβει ένα ή περισσότερα προηγούμενα σχήματα βασισμένα σε αγωγή έναντι του HER2

• Χαμηλής έκφρασης HER2 και εξαιρετικά χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνος του μαστού

Το EnherTu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό:

- Θετικό στον ορμονικό υποδοχέα (HR), χαμηλής έκφρασης HER2 ή εξαιρετικά χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνο του μαστού που έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία σε μεταστατική κατάσταση και δεν θεωρούνται κατάλληλες για ενδοκρινική θεραπεία ως επόμενη γραμμή θεραπείας
- χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνο του μαστού που έχουν λάβει προηγούμενη χημειοθεραπεία σε μεταστατική κατάσταση ή έχουν παρουσιάσει υποτροπή της νόσου κατά τη διάρκεια ή εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση της επικουρικής χημειοθεραπείας

Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (ΜΜΚΠ)

Το EnherTu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο ΜΜΚΠ των οποίων ο καρκίνος έχει μια ενεργοποιητική μετάλλαξη του HER2 (ERBB2) και οι οποίοι χρήζουν συστηματικής θεραπείας μετά από χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα, με ή χωρίς ανοσοθεραπεία.

Καρκίνος του στομάχου.

Το EnherTu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο HER2-Θετικό αδενοκαρκίνωμα του στομάχου ή της γαστροοισοφαγικής συμβολής (ΓΟΣ) που έχουν λάβει ένα προηγούμενο σχήμα βασισμένο στην τρασουζουμπτή

Σύννοση του προφίλ ασφαλείας EnherTu 5,4 mg/kg (κλινικές μελέτες σε πολλαπλούς τύπους όγκων)¹.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ναυτία (71,1%), κόπωση (55,3%), έμετος (37,3%), αλμπεκία (36,1%), αναμία (35,9%), ουδετεροπενία (35,1%), δυσκοιλιότητα (31,7%), μειωμένη όρεξη (30,6%), διάρροια (30,1%), αυξημένες τρανσαμινάσες (26,6%), μυοσκελετικό άλγος (23,6%), θρομβοπενία (23,1%) και λευκοπενία (21,5%).

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 3 ή 4 σύμφωνα με τα Κοινά Κριτήρια Ορολογίας για Ανεπιθύμητες Ενέργειες του Εθνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ (NCI-CTCAE v5.0) ήταν ουδετεροπενία (18,0%), αναμία (10,5%), κόπωση (7,8%), λευκοπενία (6,0%), θρομβοπενία (5,4%), ναυτία (4,9%), λεμφοπενία (3,9%), υποκαλιαιμία (3,8%), αυξημένες τρανσαμινάσες (3,5%), διάρροια (2,5%), έμετος (2,4%), μειωμένη όρεξη (1,8%), πνευμονία (1,3%) και μειωμένο κλάσμα εξώθησης (1,0%). Ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 5 παρουσιάστηκαν στο 1,4% των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της ΔΠΠ/πνευμονιτιδας (1,1%).

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις¹

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του EnherTu σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχουν τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Το EnherTu δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι γυναίκες δεν πρέπει να θηλάζουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με EnherTu ή για 7 μήνες μετά την τελευταία δόση. Επίσης οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία θα πρέπει να προτρέπονται να χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντισύλληψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για τουλάχιστον 7 μήνες μετά την τελευταία δόση του EnherTu.

Προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή¹

- Το EnherTu είναι εμετογόνο, πράγμα που περιλαμβάνει όψιμη ναυτία ή/και έμετο. Πριν από κάθε δόση του EnherTu, οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή με ένα συνδυαστικό σχήμα δύο ή τριών φαρμακευτικών προϊόντων (π.χ. δεξαμεθαζόνη με ανταγωνιστή των υποδοχέων 5-HT₃ ή/και με ανταγωνιστή των υποδοχέων NK1, καθώς και με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα, όπως ενδείκνυται) για την πρόληψη της ναυτίας και του εμέτου που προκαλούνται από τη χημειοθεραπεία

Χονδρική Τιμή: 1596,15€, Νοσοκομειακή Τιμή: 1435,13€, Λιανική Τιμή: 1755,37€.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΔΕΞΗΣ¹: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία. **Δοσολογία Καρκίνος του μαστού** Η συνιστώμενη δόση του EnherTu είναι 5,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενα με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. **ΜΜΚΠ** Η συνιστώμενη δόση του EnherTu είναι 5,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενα με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. **Καρκίνος του στομάχου** Η συνιστώμενη δόση του EnherTu είναι 6,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενα με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. Η αρχική δόση θα πρέπει να χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση διάρκειας 90 λεπτών. Εάν η προηγούμενη έγχυση ήταν καλά ανεκτή, οι επόμενες δόσεις του EnherTu μπορούν να χορηγηθούν με ενδοφλέβια έγχυση διάρκειας 30 λεπτών. Ο ρυθμός έγχυσης του EnherTu θα πρέπει να επιβραδύνεται ή να διακόπτεται προσωρινά εάν ο ασθενής εμφανίσει συμπτώματα σχετιζόμενα με την έγχυση. Σε περίπτωση αντιδράσεων σοβαρής μορφής στην έγχυση, το EnherTu θα πρέπει να διακόπτεται οριστικά.

Βιβλιογραφία: 1.EnherTu Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Μάρτιος 2025 2.Bardia A et al. NEngl JMed. 2024;391(22):2110-22.

 **Daiichi-Sankyo**

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Daiichi Sankyo Europe GmbH
Υπεύθυνος Συν-προώθησης: Daiichi Sankyo Greece
Daiichi Sankyo Greece, Κηφισίας 299, Κηφισία, 14561, Αθήνα,
Τηλ: 2104448037
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 175572301000, www.daiichi-sankyo.gr

 **AstraZeneca**

Τοπικός Αντιπρόσωπος του ΚΑΚ :
AstraZeneca A.E
Αγρολιάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ: 2106871500
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 00063891000, www.astrazeneca.gr


Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
www.kittrinkarta.gr
www.kittrinkarta.gov.cy

Για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Daiichi Sankyo ή στην Astra Zeneca ή σκανάρετε το QR code



https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/enherTu-epar-product-information_el.pdf

Παπαδοπούλου Χριστίνα	Νοσηλεύτρια MSc, Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Παππά Αглаΐα	PhD, Καθηγήτρια, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πετράκης Βασίλειος	MD, Msc, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Πισταμαλτζιάν Νικόλαος	Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, Επιμελητής, Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Μητέρα»
Ράλλης Γρηγόριος	MD, MSc, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
Ραφαηλίδης Πέτρος	Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική & Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Ρίζος Γεώργιος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής, Ογκολογική Κλινική, 424 Γ.Σ.Ν.Ε.
Ροκκά Θεοδώρα	Πρόεδρος Παραρτήματος Έβρου, Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
Ρωμανίδης Κωνσταντίνος	Καθηγητής Χειρουργικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Β' Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Σαμέλης Γεώργιος	Επιστημονικά Υπεύθυνος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, THERAPIS GENERAL HOSPITAL, LEFKOS STAVROS, CITY HOSPITAL ΚΑΛΑΜΑΤΑ, Πρόεδρος Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών
Σαχουλίδου Άννα	MD, PhD, Διδάσκουσα Χειρουργικής (Reader), ΑΠΠ, Ιατρική Σχολή, Α.Π.Θ., Β' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Α.Π.Θ.
Τιμοθεάδου Ελένη	Αν. Καθηγήτρια, Διευθύντρια, Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Τόλια Μαρία	Καθηγήτρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Τριχάς Μιλτιάδης	Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Νοσοκομείο «Ιασώ»
Τσακαλδήμης Γεώργιος	Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τσιάκου Ανδριανή	MD, MSc, PhD, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Α', Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός»
Τσικούρας Παναγιώτης	Καθηγητής Πανεπιστημιακής Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τσιούδα Θεοδώρα	Post -Doc Dipl., MD, MSc, PhD, Πνευμονολόγος, Διευθύντρια, Πνευμονολογικό-Ογκολογικό Τμήμα, Α.Ν.Θ «Θεαγένειο»
Τσολακίδου Βάια	Νοσηλεύτρια, Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης



Γενικές Πληροφορίες

» Διοργάνωση

ΕΔΕΜΣΕΘ - Ελληνική και Διεθνής Εταιρεία Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών

» Σε συνεργασία με

Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική, Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλεξανδρούπολη

» Ημερομηνία

13-15 Μαρτίου 2026

» Τόπος διεξαγωγής

Ξενοδοχείο RAMADA PLAZA THRAKI

4^ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Θεσσαλονίκης

68 100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ. +30 2551089100

» Εγγραφές

Η εγγραφή και η παρακολούθηση επιτρέπεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας, καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να πιστοποιήσουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα (όπως η ταυτότητα ιατρικού ή φαρμακευτικού συλλόγου, νοσηλευτική ή φοιτητική ταυτότητα).

» Οδηγίες παρακολούθησης με φυσική παρουσία

Όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία θα πρέπει να προσέλθουν στο χώρο διεξαγωγής για την εγγραφή τους ή να πραγματοποιήσουν την προεγγραφή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.events.gr. Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό barcode που θα πρέπει να σαρώνουν κατά την είσοδό τους στην αίθουσα.


» Οδηγίες διαδικτυακής παρακολούθησης

Εάν είστε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο www.livemed.gr (πατήστε στο πεδίο **Register/Εγγραφή**).

Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών.

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε την κατηγορία Live και το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο:

Go Live ή Go Virtual.



Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την «Αίθουσα Συνεδριάσεων».



Σημείωση: Εφόσον επιθυμείτε να παραλάβετε πιστοποιητικό, είναι απαραίτητο μετά τη σύνδεσή σας στο Livemed να μεταβείτε στην εικονική **«Γραμματεία Συνεδρίου»** και να ολοκληρώσετε την **«Εγγραφή»** σας στην επιστημονική εκδήλωση πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο, ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος παρακολούθησης.



» Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS.

» Παραλαβή πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου, σε όσους συμμετέχοντες έχουν εγγραφεί και παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος.

Για την παραλαβή του πιστοποιητικού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης. Ο αριθμός των Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ECMECs by the EACCME), θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης που θα καταγραφεί στο σύστημα καταμέτρησης (στην είσοδο της αίθουσας, για τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία και στην πλατφόρμα Livemed, για τους διαδικτυακούς συμμετέχοντες).

Σημείωση: Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα για λήψη έως 12 μήνες από τη λήξη της εκδήλωσης.

Η εκδήλωση καλύπτεται φωτογραφικά, βιντεοσκοπείται και προβάλλεται σε ζωντανή μετάδοση.

» Γραμματεία Συνεδρίου



Events & Travel Solutions

Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη, Τηλ.: 210 98 80 032

Website: www.events.gr **E-mail:** ets@events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του προγράμματος. Η Ε.Τ.Σ. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

Πανελλήνιο Συνέδριο
Σύγχρονα Θέματα Ογκολογίας

13-15
Μαρτίου
20
26

Ξενοδοχείο
Ramada Plaza Thraci, Αλεξανδρούπολη

Xorhnoi

abbvie

AMGEN

anaBIOsis

ariti®
ηρότο το κώπο

astellas

AstraZeneca

BAYER

BIANEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΣΤΑΡΑΚΑ ΤΟΥ ΟΜΟΤΙ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ

biokon
MEDICAL & BIOTECH
PRODUCTS LTD

Bristol Myers Squibb

Daiichi-Sankyo

DEMO
ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

FARAN
ONCOLOGY

Galenica

Genekor
Committed to Biotechnological Innovation

GENESIS
pharma

GILEAD
Oncology

GSK

INTEGRIS
PHARMA

IPSEN

Johnson&Johnson

KARYO
MOLECULAR BIOTECHNOLOGY LABORATORY

LEO

Lilly
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

MERCK

ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΟΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

MSD

NORDIGA MD
WE CARE FOR YOUR HEALTH

NUTRICIA
LIFE-TRANSFORMING NUTRITION

Pierre Fabre
FARMAKA S.A.

Pfizer
Oncology

Roche

SANDOZ

SERVIER
moved by you

Takeda | ONCOLOGY

teva

VIATRIS

WinMedica

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

- Voranigo 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
- Voranigo 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ.

Voranigo 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg βορσασιδενίμης (ως ημιδρόμικ, ημικιτρικό οξύ).
Voranigo 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 40 mg βορσασιδενίμης (ως ημιδρόμικ, ημικιτρικό οξύ). Έκδοχο με γνωστή δράση: μονοϋδρική λακτόζη.

Θεραπευτικές ενδείξεις.

Το Voranigo ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία του κυρίως μη-ενισχυόμενου στην απεικόνιση Βαθμού 2 αστροκυτώματος ή ολιγοδενδρογλιώματος, με μετάλλαξη IDH1 R132 ή IDH2 R172 σε ενήλικες και εφήβους ασθενείς ηλικίας 12 ετών και άνω και βάρους τουλάχιστον 40 kg, οι οποίοι είχαν υποβληθεί μόνο σε χειρουργική επέμβαση και δεν βρίσκονται σε άμεση ανάγκη για ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία.

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης.

Η θεραπεία πρέπει να ξεκινά υπό την επίβλεψη ιατρού με εμπειρία στη χρήση αντικαρκινικών φαρμακευτικών προϊόντων. Πριν από τη λήψη του Voranigo, οι ασθενείς πρέπει να έχουν επιβεβαιώσει μιας μετάλλαξης ισοκυτρικής αφυδρογονάσης-1 (IDH1) R132 ή ισοκυτρικής αφυδρογονάσης-2 (IDH2) R172 χρησιμοποιώντας κατάλληλη διαγνωστική εξέταση. Η παρουσία μιας μετάλλαξης IDH1 R132 ή IDH2 R172 θα πρέπει να αξιολογηθεί με *in vitro* διαγνωστικό (IVD) με σήμανση CE με τον αντίστοιχο επιδιωκόμενο σκοπό. Εάν το IVD με σήμανση CE δεν είναι διαθέσιμο, η μετάλλαξη IDH1 R132 ή IDH2 R172 θα πρέπει να αξιολογηθεί με μια εναλλακτική επικυρωμένη εξέταση.

Δοσολογία.

Η συνιστάμενη δόση του Voranigo για ενήλικες και εφήβους ηλικίας 12 ετών και άνω είναι 40 mg μία φορά ημερησίως για ασθενείς βάρους τουλάχιστον 40 kg. Δεν μπορεί να γίνει σύσταση δόσης σε ασθενείς βάρους λιγότερο από 40 kg λόγω της έλλειψης κλινικών δεδομένων σε αυτόν τον πληθυσμό. Η θεραπεία θα πρέπει να συνεχίζεται για όσο διάστημα παρατηρείται κλινικό όφελος ή έως ότου η θεραπεία να μην είναι πλέον ανεκτή από τον ασθενή.

Προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν πριν από τη χορήγηση και παρακολούθηση.

Οι γενικές εξετάσεις αίματος και οι βιοχημικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ηπατικών ενζύμων, θα πρέπει να αξιολογούνται πριν από την έναρξη της θεραπείας, κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια των πρώτων 2 μηνών και, στη συνέχεια, μία φορά τον μήνα για τα 2 πρώτα χρόνια θεραπείας και όπως ενδείκνυται κλινικά στη συνέχεια. Ορισμένοι ασθενείς μπορεί να χρειάζονται πιο συχνή και συνεχή παρακολούθηση.

Ειδικό πληθυσμό.

Ηλικιωμένοι.

Δεν συνιστάται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς ≥ 65 ετών.

Νεφρική δυσλειτουργία.

Δεν συνιστάται προσαρμογή της δόσης έναρξης σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία. Η βορσασιδενίμη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με $eGFR \leq 40 \text{ mL/min/1.73 m}^2$ ή που χρήζουν αιμοκάθαρσης.

Έκπτωση της ηπατικής λειτουργίας.

Δεν συνιστάται προσαρμογή της δόσης έναρξης σε ασθενείς με ήπια ή μέτρια (κατηγορία Α ή Β κατά Child-Pugh) έκπτωση της ηπατικής λειτουργίας. Η βορσασιδενίμη θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή έκπτωση της ηπατικής λειτουργίας και αυτός ο πληθυσμός ασθενών να παρακολουθείται στενά.

Παιδιατρικός πληθυσμός.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα κλινικά δεδομένα σε παιδιά ηλικίας 12 ετών έως < 18 ετών (βλ. παράγραφο 5.1).

Τρόπος χορήγησης.

Το Voranigo είναι για μία από στόματος χρήση. Τα δισκία θα πρέπει να λαμβάνονται μία φορά ημερησίως περίπου την ίδια ώρα κάθε ημέρα. Οι ασθενείς δεν πρέπει να καταναλώνουν

τροφή τουλάχιστον 2 ώρες πριν και 1 ώρα μετά τη λήψη του Voranigo. Τα δισκία πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα με ένα ποτήρι νερό και δεν πρέπει να κόβονται στη μέση, να θρυμματίζονται ή να μασώνται, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα που να επιβεβαιώνουν παρόμοια βιοδιαθεσιμότητα του φαρμακευτικού προϊόντος όταν το δισκίο υποστεί επεξεργασία. Ενδέχεται να απαιτηθεί διακοπή ή μείωση της δόσης, βάσει εξοπλισμένων παραμέτρων ασφάλειας και ανεκτικότητας. Συνιστώνται τροποποιήσεις της δόσης του Voranigo για τη διαχείριση της πατοτοξικότητας και άλλων ανεπιθύμητων ενεργειών βαθμού 3 ή υψηλότερου.

Αντενδείξεις.

Υπερευαίσθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση.

Ηπατοξικότητα:

Έχουν αναφερθεί αυξήσεις στα ηπατικά ένζυμα, συμπεριλαμβανομένης της αμινοτρανσφεράσης της αλανίνης (ALT) και της ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης (AST) > 3 φορές το ανώτατο φυσιολογικό όριο (ULN), με αύξηση της ολικής χοληρυθρίνης > 2 φορές το ULN σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με βορσασιδενίμη. Ηπατική ανεπάρκεια και ηπατική νέκρωση παρατηρήθηκαν σε έναν ασθενή που έλαβε θεραπεία με βορσασιδενίμη, ενώ αυτόσωνα ηπατίτιδα παρατηρήθηκε σε έναν ασθενή που έλαβε θεραπεία με βορσασιδενίμη. Τα ηπατικά ένζυμα (συμπεριλαμβανομένων των ALT, AST και γ-γλουταμυλτρανσφεράσης (GGT)) και η ολική χοληρυθρίνη πρέπει να παρακολουθούνται πριν από την έναρξη της θεραπείας, κάθε 2 εβδομάδες κατά τους πρώτους 2 μήνες της θεραπείας και στη συνέχεια μία φορά το μήνα για τα πρώτα 2 χρόνια θεραπείας, και όπως ενδείκνυται κλινικά στη συνέχεια. Εξετάστε το ενδεχόμενο εβδομαδιαίας παρακολούθησης για αυξήσεις ALT ή AST ≤ 3 φορές το ULN. Προσωρινή διακοπή, μείωση της δόσης ή οριστική διακοπή της θεραπείας με βάση τη σοβαρότητα των ανωμαλιών των ηπατικών ενζύμων.

Κίνδυνος καρκινογένεσης:

Ο κίνδυνος καρκινογένεσης στον άνθρωπο δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί, καθώς δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα αποτελέσματα μελετών καρκινογένεσης και τα μακροπρόθεσμα κλινικά δεδομένα ασφάλειας είναι ανεπαρκή.

Έκπτωση της ηπατικής λειτουργίας: Η βορσασιδενίμη πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με προϋπάρχουσα σοβαρή έκπτωση της ηπατικής λειτουργίας (κατηγορία C κατά Child-Pugh) και αυτός ο πληθυσμός ασθενών να παρακολουθείται στενά.

Νεφρική δυσλειτουργία:

Η βορσασιδενίμη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία ($eGFR \leq 40 \text{ mL/min/1.73 m}^2$) ή νεφρική δυσλειτουργία που χρήζει αιμοκάθαρσης.

Έκδοχα: Το Voranigo περιέχει λακτόζη. Το φάρμακο αυτό περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δισκίο, είναι αυτό που ονομάζουμε «ελεύθερο νατρίου».

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης.

Δεν συνιστάται: Ισχυροί αναστολείς του CYP1A2, μέτρια επαγωγείς του CYP1A2, υποστρώματα των CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, ή υποστρώματα του CYP3A4 με στενό θεραπευτικό δείκτη, ευαίσθητα υποστρώματα των CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 ή CYP3A4 χωρίς στενό θεραπευτικό δείκτη. Προφυλάξεις: υποστρώματα BCRP, ορμονικά αντισυλληπτικά

Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία.

Κύηση.

Η βορσασιδενίμη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης, καθώς και σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας που δεν χρησιμοποιούν αντισύλληψη. Θηλασμός.

Ο θηλασμός πρέπει να διακόπτεται κατά την διάρκεια της θεραπείας και για τουλάχιστον 2 μήνες μετά την τελευταία δόση.

Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία / Αντισύλληψη.

Το τεστ κύησης συνιστάται σε γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία πριν από την έναρξη της θεραπείας με τη βορσασιδενίμη. Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία και άνδρες με γυναίκες συντρόφους σε αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντισύλληψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για τουλάχιστον 2 μήνες μετά την τελευταία δόση.

Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.

Η βορσασιδενίμη δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.

Ανεπιθύμητες ενέργειες.

Περίληψη προφίλ ασφαλείας. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των μη φυσιολογικών εργαστηριακών τιμών, ήταν αυξημένη ALT (59,3%), αυξημένη AST (45,5%), αυξημένη γ-GT (37,7%), κόπωση (36,5%) και διάρροια (24,6%). Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού ≥ 3 ήταν αυξημένη ALT (9,6%), αυξημένη AST (4,2%) και αυξημένη γ-GT (3,0%). Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρθηκαν

στο 0,6% των ασθενών που έλαβαν Voranigo και συνίστανται σε αυξημένη ALT. Οριστική διακοπή της βορσασιδενίνης αναφέρθηκε στο 3,0% των ασθενών και συνίστανται σε αυξημένη ALT βαθμού ≥ 3 . Διακοπές της δόσης λόγω ανεπιθύμητης ενέργειας καταγράφηκαν στο 18,6% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με βορσασιδενίνη. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που απαιτούσαν διακοπή της δόσης ήταν η αυξημένη ALT (14,4%) και η αυξημένη AST (6,0%). Μειώσεις της δόσης της βορσασιδενίνης λόγω ανεπιθύμητης ενέργειας καταγράφηκαν στο 9,6% των ασθενών. Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια που απαιτούσε μείωση της δόσης ήταν η αυξημένη ALT (7,8%).

Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα.

Κατηγορία/οργανικό σύστημα	Συχνότητα	Ανεπιθύμητες ενέργειες
Διαταραχές του αίματος και του λεμφικού συστήματος	Πολύ συχνές	Μειωμένος αριθμός αιμοπεταλίων ^a
Μεταβολικές και διατροφικές διαταραχές	Συχνές	Υπεργλυκαιμία
		Μειωμένη όρεξη
		Υποφωσφαταιμία
Διαταραχές του νευρικού συστήματος	Πολύ συχνές	Ζάλη
Αναπνευστικές, θωρακικές διαταραχές και διαταραχές μεσοθωρακίου	Συχνές	Δύσπνοια
Γαστρεντερικές Διαταραχές	Πολύ συχνές	Διάρροια
	Συχνές	Κοιλιακό άλγος
Ηπατοχολικές διαταραχές	Πολύ συχνές	Γαστροοσφαγική παλινδρομική νόσος
		Αυξημένη αμινοτρανσφεράση της αλανίνης ^c
		Αυξημένη ασπαρτική αμινοτρανσφεράση ^c
	Συχνές	Αυξημένη γ-γλουταμυλοτρανσφεράση ^c
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις στη θέση χορήγησης	Πολύ συχνές	Κόπωση

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών.

Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιπρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς:

Ελλάδα

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040337
Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>
<http://www.kitrinikarta.gr>

Κύπρος

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Υγείας
CY-1475 Λευκωσία
Τηλ: +357 22608607
Φαξ: + 357 22608669
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.

Les Laboratoires Servier, 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex, Γαλλία.

ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.

EU/1/25/1912/001, EU/1/25/1912/002.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.

Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 17 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

09/2025

Voranigo® F.C TAB 40 mg/tab BTx30 Ενδεικτική Λ.Τ €19.973,00

Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: <https://www.ema.europa.eu>.

Ελλάδα

Για πλήρεις συντομογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.ΠΕ. Φραγκοκλησίας 7, 151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 2109391000

Κύπρος:

Για πλήρεις συντομογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από τον εκπρόσωπο του Κατάχου Άδειας Κυκλοφορίας C.A.Papaellinas Ltd, Τηλ: +357 22741741



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα Φάρμακα Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Για την πλήρη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάρετε τον κωδικό QR code

- E.T.S. Events & Travel Solutions (2026) ®

