

Διοργάνωση:



ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Σε συνεργασία με την Αιματολογική Κλινική
του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

© 2026 E.T.S. EVENTS & TRAVEL SOLUTIONS

8^ο Έτος

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο

Από το ΜΟΝΤΕΡΝΟ
ΣΤΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ:

Νεότερες εξελίξεις στη βιολογία και
θεραπεία των αιματολογικών νόσων

15-17 ΜΑΪΟΥ 2026

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Ramada PLaza THRAKI

Υπό την Αιγίδα:



Περιφέρεια
Αν. Μακεδονίας & Θράκης



ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ



ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΒΡΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ONCOLOGY



ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

- ADCETRIS (Brentuximab Vedotin) PD.CS.INF 50 mg/vial
- LIVTENCITY (maribavir) tablets 200 mg/tab
- NINLARO (ixazomib) capsules 4.0 mg/cap
- NINLARO (ixazomib) capsules 3.0 mg/cap
- NINLARO (ixazomib) capsules 2.3 mg/cap

- ADYNOVI [rurioctocog alfa pegol, human coagulation factor VIII (rDNA)] PS.INJ.SOL 500 IU/2 ml/vial
- ADYNOVI [rurioctocog alfa pegol, human coagulation factor VIII (rDNA)] PS.INJ.SOL 1000 IU/2 ml/vial
- ADYNOVI [rurioctocog alfa pegol, human coagulation factor VIII (rDNA)] PS.INJ.SOL 2000 IU/5 ml/vial

- ADVATE [octocog alfa, human coagulation factor VIII (rDNA)] PS.INJ.SOL 250 IU/5 ml/vial
- ADVATE [octocog alfa, human coagulation factor VIII (rDNA)] PS.INJ.SOL 500 IU/5 ml/vial
- ADVATE [octocog alfa, human coagulation factor VIII (rDNA)] PS.INJ.SOL 1000 IU/5 ml/vial

- ADVATE [octocog alfa, human coagulation factor VIII (rDNA)] PS.INJ.SOL 1500 IU/5 ml/vial
- ADVATE [octocog alfa, human coagulation factor VIII (rDNA)] PS.INJ.SOL 2000 IU/5 ml/vial
- ADVATE [octocog alfa, human coagulation factor VIII (rDNA)] PS.INJ.SOL 3000 IU/5 ml/vial



Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της Π.Χ.Π. για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον τοπικό αντιπρόσωπο, κατόπιν αιτήσεως, ή περιλαμβάνονται στη συνοπτική περιγραφή χαρακτηριστικών των προϊόντων, των ΦΟΧ και τις μονογραφίες των φαρμάκων

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Για Αναφορά Ανεπιθύμητης Ενέργειας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: • Τηλ. +30 210 6387 800 • email: AE.GRC@takeda.com

Τοπικός αντιπρόσωπος: Takeda Ελλάς Α.Ε.

Green Plaza, Κτίριο Β, Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, 151 24, Μαρούσι, Τηλ. κέντρο: 2106387800, Fax: 2106387801 • www.takeda.gr

Takeda & Takeda logo are trademarks of Takeda Pharmaceutical Company Limited used under license.

© Copyrights 2024 Takeda HELLAS S.A. All rights reserved. C-APROM/GR/ADCE/0046, November 2024





ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί Φίλοι και Συνάδελφοι,

Η 8^η ετήσια εκδήλωση **Αιματολογίας** επιστρέφει στην εαρινή Αλεξανδρούπολη με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που γεφυρώνει την κλινική πράξη, την έρευνα και την κοινωνία.

Φέτος, η συνομιλία ανάμεσα σε φοιτητές, νέους και έμπειρους αιματολόγους, συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων, νοσηλευτές, εκπροσώπους ασθενών και πολιτείας θα εκτείνεται από την τεχνητή νοημοσύνη ως τη ψηφιακή ιατρική του αύριο.

Διακεκριμένοι διεθνείς ομιλητές - **Luca Malcovati** (Πανεπιστήμιο Παβίας), **Amer Zeidan** (Yale), **Παναγιώτης Μπαλιάκας** (Uppsala University) και **Moshe Mittelman** (Τελ Αβίβ) - θα παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις δίπλα σε εκλεκτούς Έλληνες συναδέλφους.

Σας προσκαλούμε να γίνετε και φέτος μέρος μιας συνάντησης όπου η επιστήμη, η κλινική εμπειρία και η κοινωνία μοιράζονται γνώσεις και όραμα.

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου

Ιωάννης Κοτσιανίδης
Καθηγητής Αιματολογίας Δ.Π.Θ.
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης



ΤΟ BRUKINSA ΣΤΗ CLL

Μακροπρόθεσμα δεδομένα παρακολούθησης PFS
σε διαφορετικά θεραπευτικά στάδια της CLL

TN CLL

Μελέτη SEQUOIA²

PFS 6 ετών: **74%**⁴



Ποσοστό των ασθενών που επιβίωσαν
χωρίς εξέλιξη της νόσου
έναντι BR: 32%
(INV-assessed, χωρίς del(17p))

R/R CLL

Μελέτη ALPINE³

PFS 5 ετών: **47%**⁵



Ποσοστό των ασθενών που επιβίωσαν
χωρίς εξέλιξη της νόσου
Στην τελική ανάλυση της μελέτης στα 3 έτη για την PFS,
BRUKINSA 65,4% έναντι ibrutinib 54,4%
- η παρακολούθηση 5 ετών αφορά μόνο το σκέλος του BRUKINSA

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ: BR: bendamustine+rituximab, CLL: Chronic Lymphocytic Leukemia-Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία, INV-assessed: αξιολογημένη από τον ερευνητή, PFS: επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου.

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάροντας το QR code. Ημερομηνία Αναθεώρησης Κειμένου: Οκτώβριος 2025

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ SEQUOIA: Η SEQUOIA ήταν μια τυχαioποιημένη, ανοικτού σχεδιασμού, φάσης 3 μελέτη, σε πρωτοθεραπευμένους ασθενείς με ΧΛΛ που σύγκρινε το BRUKINSA με τον συνδυασμό Bendamustine+Rituximab. Επειδή οι ασθενείς με ΧΛΛ/ΜΛΛ των οποίων οι όγκοι παρουσιάζουν del(17p) έχουν δυσμενή πρόγνωση και μικρή ανταπόκριση στην καθιερωμένη ανοσοχημειοθεραπεία, αυτοί έλαβαν BRUKINSA σε ξεχωριστή διερευνητική ανάλυση μονού σκέλους. Στην κοορτή 1 συμμετείχαν ασθενείς χωρίς del(17p): BRUKINSA έναντι BR (n=479). Στην κοορτή 2 συμμετείχαν ασθενείς με del(17p): BRUKINSA μονού σκέλους (n=111).²

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ALPINE: Η ALPINE ήταν μια τυχαioποιημένη, ανοικτού σχεδιασμού, πολυκεντρική, φάσης 3 μελέτη σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική ΧΛΛ που είχαν λάβει ≥ 1 προηγούμενη συστηματική θεραπεία που σύγκρινε το BRUKINSA με το ibrutinib (N=652).³

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. BRUKINSA[®] Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Οκτώβριος 2025. 2. Tam CS, et al. Lancet Oncol. 2022;23(8):1031-1043. 3. Brown JR, et al. N Eng J Med. 2023;388(4):319-332. 4. Tam CS, et al. BGB-3111-304, ASH Annual Meeting, 6-9 December 2025, Abstract 2029. 5. Tam CS, et al. «Long-term extension from the Phase 3 ALPINE study: Sustained Efficacy of Zanubrutinib vs Bendamustine + Rituximab.» ASH Annual Meeting, 6-9 December 2025; Abstract 2123.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «KITPINH KAPTA»**

Α.Τ.: 4.789,58 €. *Σε περίπτωση ανακάλυψης νέου Δελτίου Τιμών, θα ισχύουν οι νεότερες.
Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Ζητείται να αναφέρονται οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς.
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων: Μεσογείων 284, GR-15562 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040337,
Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitrinikarta.gr>





ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Κοτσιανίδης Ιωάννης

Μέλη:

Αδαμόπουλος Ιωάννης

Ανδρέου Μαρίνα

Αντωνίου Μαρία-Ιωάννα

Βραχιώλιας Γεώργιος

Γιασάρη Παναγιώτα

Δαμάδογλου Αχμέτ

Δαράβαλη Λουκία

Καπούτση Έλενα

Λιάπης Κωνσταντίνος

Μαυρουδή Θεοδώρα

Μισίδου Χριστίνα

Μπεζιργιαννίδου Ζωή

Παπαδοπούλου Ζωή

Παπουτσέλης Μενέλαος

Παππούς Σωτήριος

Πουλή Μαρία

Ρουμπάκης Χριστόφορος

Σπανουδάκης Εμμανουήλ

Σταματίου Ηλιάννα

Επιστημονική Επιτροπή

Mittelman Moshe

Turgut Burhan

Αγγελοπούλου Μαρία

Αμανατίδου Μαρία

Βασιλακόπουλος Θεόδωρος

Βασιλόπουλος Γεώργιος

Βλαχάκη Ευθυμία

Γεωργουσοπούλου Βασιλική

Γιαννούλη Σταυρούλα

Ισκάς Μιχαήλ

Καϊάφα Γεωργία

Κοτσιανίδης Ιωάννης

Λεμονάκης Νικόλαος

Λιάπης Κωνσταντίνος

Μητρούλης Ιωάννης

Μπαλιάκας Παναγιώτης

Μπεζιργιαννίδου Ζωή

Πάγκαλης Γεράσιμος

Παναγιωτίδης Παναγιώτης

Παναγιωτόπουλος Εμμανουήλ

Παπαγεωργίου Σωτήριος

Παππά Βασιλική

Ρουμπάκης Χριστόφορος

Σακελλάρη Ιωάννα

Σακκά Βασιλική

Σπανουδάκης Εμμανουήλ

Συμεωνίδης Ανάργυρος

Τσαταλάς Κωνσταντίνος

Χατζηχαρίση Ευδοξία



BLENREP▼

belantamab
mafodotin



Omjjara▼

momelotinib

BLENREP - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Blenrep 70 mg κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση: Ένα φιαλίδιο κόνεως περιέχει 70 mg μπελανταμάμπης μαφοντοτίνης. Μετά την ανασύσταση με 1,4 mL ύδατος για ενέσιμα, κάθε mL διαλύματος περιέχει 50 mg μπελανταμάμπης μαφοντοτίνης. Έκδοχο με γνωστή δράση: Κάθε φιαλίδιο ανασυσταθέντος διαλύματος περιέχει 0,28 mg πολυσορβικού 80 ανά 1,4 mL διαλύματος προς αναρρόφηση. Blenrep 100 mg κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση: Ένα φιαλίδιο κόνεως περιέχει 100 mg μπελανταμάμπης μαφοντοτίνης. Μετά την ανασύσταση με 2 mL ύδατος για ενέσιμα, κάθε mL διαλύματος περιέχει 50 mg μπελανταμάμπης μαφοντοτίνης. Έκδοχο με γνωστή δράση: Κάθε φιαλίδιο ανασυσταθέντος διαλύματος περιέχει 0,4 mg πολυσορβικού 80 ανά 2 mL διαλύματος προς αναρρόφηση.

Βιβλιογραφία: 1. Blenrep (belantamab mafodotin). Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Σεπτέμβριος 2025.

Ενδεικτική Λιανική Τιμή: Blenrep 70 mg κόνις: 14.727,53 €. Blenrep 100 mg κόνις: 21.039,25 €. % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: αναμένεται.

Φαρμακευτικό προϊόν το οποίο διατίθεται με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από ιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες



Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του **BLENREP** σκανάρετε το **QR code**. Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

OMJJARA - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο Omjjara 100, 150, 200mg περιέχει μονοδρική διυδροχλωρική μομελοτινίνη που ισοδυναμεί με 100, 150, 200mg μομελοτινίνης αντίστοιχα. Έκδοχο με γνωστή δράση: 50,8, 76,1, 101,5mg μονοδρικής λακτόζης ανά δισκίο 100, 150, 200mg αντίστοιχα.

Βιβλιογραφία: 1. OMJJARA (momelotinib): Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Μάρτιος 2025

Λιανική Τιμή: 5141,54 € % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή.

Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.



Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του **OMJJARA** σκανάρετε το **QR code**. Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για περισσότερες πληροφορίες ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών απευθυνθείτε στην εταιρεία στο τηλέφωνο 2106882100.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK. ©2026 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχοι του Ομίλου GSK.

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
www.gr.gsk.com

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"





ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15 ΜΑΪΟΥ

2 0 2 6

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

08:00 - 09:00 Ομάδα Εργασίας Φοιτητών

09:00 - 10:30 Περιπτώσεις ασθενών I
Φοιτητές Ιατρικής Δ.Π.Θ.

09:00 - 09:10	1. Περίπτωση οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας σε υποτροπή	Λ. Δαράβαλη
09:10 - 09:20	2. Περίπτωση πλασματοκυτταρικής λευχαιμίας	Σ. Παππούς
09:20 - 09:30	3. Περίπτωση χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας με εκτροπή σε σύνδρομο Richter	Μ. Ανδρέου
09:30 - 09:40	4. Περίπτωση θρομβωτικής θρομβοπενικής πορφύρας με υποκείμενο λέμφωμα Hodgkin	Μ.Ι. Αντωνίου
09:40 - 10:30	Σχολιασμός - συζήτηση: Ζ. Μπεζιργιαννίδου, Β. Σακκά	

10:30 - 12:00 Περιπτώσεις ασθενών II
Φοιτητές Ιατρικής Δ.Π.Θ.

10:30 - 10:40	1. Περίπτωση οξείας μυελογενούς λευχαιμίας	Μ. Πουλή
10:40 - 10:50	2. Περίπτωση λεμφώματος υψηλής κακοήθειας στην κύηση	Θ. Μαυρουδή
10:50 - 11:00	3. Περίπτωση ασθενούς με νεόπλασμα βλαστικών πλασματοκυτταροειδών δενδριτικών κυττάρων (BPDCN)	Ε. Καπούτση
11:00 - 11:10	4. Περίπτωση λεμφώματος υψηλής κακοήθειας με συνυπάρχουσα συστηματική μαστοκυττάρωση (SM)	Ζ. Παπαδοπούλου
11:10 - 12:00	Σχολιασμός - συζήτηση: Ε. Παναγιωτόπουλος, Χ. Ρουμπάκης	

12:00 - 12:30 Μεσημβρινή διακοπή - Ελαφρύ γεύμα

12:30 - 13:00 Διάλεξη
Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία
Προεδρείο: **Μ. Αγγελοπούλου, Ι. Κοτσιανίδης**

12:30 - 12:50	Βιοδείκτες στη Χρόνια Λεμφογενή Λευχαιμία: προγνωστική και προβλεπτική αξία	Θ. Χατζηκωνσταντίνου
12:50 - 13:00	Συζήτηση	

13:00 - 13:30 Δορυφορική Διάλεξη
Προεδρείο: **Ι. Κοτσιανίδης**

Sponsored by  AstraZeneca

Προσεγγίζοντας το εξατομικευμένο μοντέλο θεραπείας στη ΧΛΛ:
ο ρόλος της διάρκειας θεραπείας στην αναστολή της BTK

Ε. Σπανουδάκης

Reblozyl®

(luspatercept)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ
RS STATUS &
ΕΠΙΠΕΔΩΝ ESA¹

REBLOZYL: Raising the Standard of Care Για τους ασθενείς με αναιμία σχετιζόμενη με LR-MDS χωρίς προηγούμενη θεραπεία με ESA^{1,2*}

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Κλινικής Πρακτικής στην Ογκολογία του National Comprehensive Cancer Network (NCCN Guidelines®):

Το REBLOZYL® συνιστάται ως θεραπεία 1ης γραμμής για την αντιμετώπιση της συμπτωματικής αναιμίας σε RS- & RS+ ασθενείς με LR-MDS και ειδικότερα συνιστάται ως η προτιμώμενη αγωγή για:

- όλους τους RS+ ασθενείς
- τους RS- ασθενείς με $200 < sEPO \leq 500^{3,**}$

* **Ευρωπαϊκή ένδειξη (EMA):** Το Reblozyl ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες για τη θεραπεία της εξαρτώμενης από μεταγγίσεις αναιμίας λόγω μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων (ΜΔΣ) με πολύ χαμηλό, χαμηλό και ενδιάμεσο κίνδυνο

** Για ασθενείς με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (MDS) πολύ χαμηλού, χαμηλού ή ενδιάμεσου κινδύνου σύμφωνα με το IPSS-R, χωρίς del(5q), με ή χωρίς άλλες κυτταρογενετικές ανωμαλίες και με ποσοστό δακτυλιοειδών σιδηροβλαστών (RS) <15% (ή RS <5% σε περίπτωση μετάλλαξης SF3B1) και επίπεδα ερυθροποιητίνης ορού (sEPO) ≤ 500 mU/mL, ή με MDS χωρίς del(5q), με ή χωρίς άλλες κυτταρογενετικές ανωμαλίες, και με RS $\geq 15\%$ (ή RS $\geq 5\%$ σε περίπτωση μετάλλαξης SF3B1).

Βιβλιογραφία: 1. REBLOZYL®, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 02/2025 2. Platzbecker U, Della Porta MG, Santini V, et al. Efficacy and safety of luspatercept versus epoetin alfa in erythropoiesis-stimulating agent-naïve, transfusion-dependent, lower-risk myelodysplastic syndromes (COMMANDS): interim analysis of a phase 3, open-label, randomised-controlled trial. Lancet. 2023;402(10399):373-385. 3. Κατευθυντήριες Οδηγίες Κλινικής Πρακτικής στην Ογκολογία του NCCN (NCCN Guidelines®) για τα Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα, Έκδοση 3.2026.. Πρόσβαση στις 23 Μαρτίου 2026. Για την πιο πρόσφατη και πλήρη έκδοση των κατευθυντήριων οδηγιών, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα NCCN.org.

Συνομογραφίες: LR-MDS: μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο χαμηλότερου κινδύνου (πολύ χαμηλού, χαμηλού ή ενδιάμεσου κινδύνου σύμφωνα με το IPSS-R), ESA: ερυθροποιητίνη, sEPO: ερυθροποιητίνη ορού, RS+: παρουσία σιδηροβλαστών, RS-: απουσία σιδηροβλαστών



Bristol-Myers Squibb A.E.
Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2,
Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική
ΤΘ 63883 - Βριλήσσια,
Τ.Κ. 152 03, Αττική
Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400,
Φαξ 210 6074333
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

Τρόπος Διάθεσης

Ελλάδα: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.
Κύπρος: Με ιατρική συνταγή.

Αρ. άδειας: 69856/30-09-2020

R-Hema 2007-GR-2600005/April 2026

Ενδείξεις:

- Το Reblozyl ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες για τη θεραπεία της εξαρτώμενης από μεταγγίσεις αναιμίας λόγω μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων (ΜΔΣ) με πολύ χαμηλό, χαμηλό και ενδιάμεσο κίνδυνο
- Το Reblozyl ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες για τη θεραπεία της αναιμίας που σχετίζεται με την εξαρτώμενη από μεταγγίσεις και τη μη εξαρτώμενη από μεταγγίσεις βήτα-θαλασσαιμία

Περίληψη προφίλ ασφάλειας για τα Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα:
Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στο φάρμακο σε ασθενείς που λαμβάνουν το Reblozyl (τουλάχιστον στο 15% των ασθενών) ήταν κόπωση, διάρροια, ναυτία, εξασθένιση, ζάλη, οίδημα περιφερικό και οσφυαλγία.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:

Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα

Τηλ: + 30 21 32040380/337, Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitirinkarta.gr>

Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία
Τηλ: +357 22608607, Φαξ: + 357 22608669, Ιστοτόπος: www.moh.gov.cy/phs

Λιανική Τιμή:

Ελλάδα: REBLOZYL® 25mg 1.161,58 €, REBLOZYL® 75mg 3.384,80 €

Κύπρος: REBLOZYL® 25mg 1.324,47 €, REBLOZYL® 75mg 3.798,49 €

Σύμφωνα με τον Ενιαίο Τιμοκατάλογο με ισχύ από 2 Φεβρουαρίου 2026

Πριν τη συνταγογράφηση και για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που διατίθεται από τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

Μπορείτε να ανατρέξετε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάροντας το QR code.



Ημερομηνία Αναθεώρησης Κεμένου: 02/2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
www.kitirinkarta.gr
www.kitirinkarta.gov.cy



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15 ΜΑΪΟΥ

2026

13:30 - 14:00

Δορυφορική Διάλεξη

Sponsored by **Swixx** BioPharma
Modern Medicines for All

Προεδρείο: **Ε. Σπανουδάκης**

Αναζητώντας την ισορροπία: αποτελεσματικότητα και ανεκτικότητα με το zanubrutinib στη ΧΛΛ

Β. Δούκα

14:00 - 14:30

Δορυφορική Διάλεξη

Sponsored by **abbvie**

Προεδρείο: **Σ. Γιαννούλη**

Θεραπευτικές στρατηγικές σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με ΟΜΛ μη επιλέξιμους για εντατική χημειοθεραπεία

Ε. Γαβριηλάκη

14:30 - 14:45

Διάλειμμα καφέ

14:45 - 15:45

Στρογγυλό Τραπέζι

Νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις στα λεμφώματα

Προεδρείο: **Θ. Βασιλακόπουλος, Σ. Παπαγεωργίου**

14:45 - 15:15

Περιπτώσεις ασθενών με λέμφωμα Hodgkin

14:45 - 14:55

Περίπτωση 1

Ξ. Γιακουμή

14:55 - 15:05

Περίπτωση 2

Ξ. Γιακουμή

15:05 - 15:15

Σχολιασμός: **Σ. Σαχανάς**

15:15 - 15:45

Περιπτώσεις ασθενών με T-λέμφωμα μη-Hodgkin

15:15 - 15:25

Περίπτωση 1

Η. Κωνσταντίνου

15:25 - 15:35

Περίπτωση 2

Ι. Ασημακόπουλος

15:35 - 15:45

Σχολιασμός: **Μ. Αγγελοπούλου**

15:45 - 16:15

Δορυφορική Διάλεξη

Sponsored by **Takeda**

Προεδρείο: **Θ. Βασιλακόπουλος**

Λέμφωμα Hodgkin προχωρημένου σταδίου: θεραπευτικές καινοτομίες που ενισχύουν την επιβίωση

Σ. Σαχανάς

16:15 - 16:45

Δορυφορική Διάλεξη

Sponsored by **Lilly**
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΑ

Προεδρείο: **Ι. Κοτσιανίδης**

Pirtobrutinib και θεραπευτική συνέχεια στην Υ/Α Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία: κρατώντας ενεργή τη στόχευση της BTK

Θ. Βασιλακόπουλος

16:45 - 17:15

Δορυφορική Διάλεξη

Sponsored by **Roche**

Προεδρείο: **Ε. Χατζηχαρίση**

DLBCL: από το R-CHOP στις νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις - στρατηγικές πρώτης και δεύτερης γραμμής

Ε. Σπανουδάκης

17:15 - 17:45

Διάλειμμα καφέ

XOSPATATM

gilteritinib 40mg tablets



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΠΡΟΪΟΝ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ -5%
XOSPATA F.C.TAB 40MG/TAB BΤx84 δισκία σε blisters (OPA/αλουμινίου/PVC/αλουμινίου)	GILTERITINIB	15.485,14 €	14.131,74 €	13.425,15 €

Περιορισμένη Ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως και περιλαμβάνονται στη συνοπτική περιγραφή χαρακτηριστικών του προϊόντος και το φύλλο οδηγιών χρήσης του φαρμάκου.

XOS/ADV1/10.2024 MAT-GR-XOS-2024-00006



Astellas Pharmaceuticals A.E.B.E.
Λ.Κηφισίας 7 & Νεαπόλεως 2
15123 Μαρούσι Αττικής
Τηλ: 210-81899900
www.astellas.com/gr



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15 ΜΑΪΟΥ

2026

17:45 - 19:20

Στρογγυλό Τραπέζι
Κλωνική αιμοποίηση και χρόνιες νόσοι
Προεδρείο: **Κ. Λιάπης, Κ. Τσαταλάς**

17:45 - 18:05

Κλωνική αιμοποίηση και σακχαρώδης διαβήτης

Β. Πετράκης

18:05 - 18:30

Καρδιαγγειακή νόσος και κλωνική αιμοποίηση

Χ. Κυμπαρίδου

18:30 - 18:50

Κλωνική αιμοποίηση και χρόνια νεφρική νόσος

Ε. Χαριτάκη

18:50 - 18:55

Σχολιασμός: **Σ. Παναγιώτσος**

18:55 - 19:15

Άνοια και μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα

Η. Σταματίου

19:15 - 19:20

Σχολιασμός: **Κ. Βαδικόλιας**

19:20 - 20:00

Κεντρική Διάλεξη
Προεδρείο: **Ι. Κοτσιανίδης**

19:20 - 19:30

Εισαγωγή: **Ε. Χατζημιχαήλ**

19:30 - 20:00

Η Αιματολογία στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σ. Χατζηχριστοφής

20:00 - 20:15

Τελετή Έναρξης - Χαιρετισμοί

20:15 - 21:30

Στρογγυλό Τραπέζι
Προκλήσεις στην ψηφιακή εποχή της ιατρικής
Προεδρείο: **Ι. Κοτσιανίδης**

Ομιλητής: **Ι. Καραγιάννης**

Panel: **Κ. Αθανασάκης, Γ. Βασιλόπουλος, Γ. Καπετανάκης, Γ. Κωτσιόπουλος**

Ο 1^{ος} εγκεκριμένος JAK1/2 & ACVR1 αναστολέας.¹

Μια θεραπεία για
τη διαχείριση της
ΣΠΛΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑΣ ή
των **ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ**
σε ασθενείς με
ΜΥΕΛΟΪΝΩΣΗ



μέτρια
έως σοβαρή
ΑΝΑΙΜΙΑ¹

Omjara ▼
mometinib

Για την Περίληψη
των Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος σκανάρετε το **QR code**.
Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη
κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.



Σύνοψη του προφίλ ασφάλειας¹:

Η ασφάλεια του Omjara αξιολογήθηκε σε τρεις τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες με δραστικό παράγοντα, πολυκεντρικές μελέτες σε ενήλικες με μυελοϊνωση (MOMENTUM, SIMPLIFY-1, και SIMPLIFY-2). Σε αυτές οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν διάρροια (23%), θρομβοπενία (21%), ναυτία (17%), κεφαλαλγία (13%), ζάλη (13%), κόπωση (12%), εξασθένιση (11%), κοιλιακό άλγος (11%) και βήχας (10%). Η πιο συχνή σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια (Βαθμού ≥ 3) ήταν η θρομβοπενία (12%).

Βιβλιογραφία

1. Omjara (mometinib) Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Μάρτιος 2025

Λιανική Τιμή: € 5141,54

% επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της Θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού/καταχώρησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK. ©2025 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούπαρχος του Ομίλου GSK

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
www.gsk.com

GSK



ΣΑΒΒΑΤΟ

16 ΜΑΪΟΥ

2026

09:00 - 10:30

Στρογγυλό Τραπέζι
Πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες
Προεδρείο: **Μ. Ισκάς, Ε. Σπανουδάκης**

09:00 - 09:20

Περίπτωση ασθενούς με αιμορραγικό MGUS

Ε. Παναγιωτόπουλος

09:20 - 09:30

Σχολιασμός: **Ε. Σπανουδάκης**

09:30 - 09:50

Περίπτωση ασθενούς με πολλαπλές εξωμυελικές εντοπίσεις (πλάσμοκυττώματα)

Ε. Κουβάτα

09:50 - 10:00

Σχολιασμός: **Ν. Γιαννακούλας**

10:00 - 10:20

Περίπτωση ασθενούς με ηπατική αμυλοείδωση

Λ. Ιγγλέζου

10:20 - 10:30

Σχολιασμός: **Ε. Καστρίτης**

10:30 - 11:00

Πολλαπλό μύελωμα 360°
Προεδρείο: **Ε. Σπανουδάκης**

Sponsored by **Johnson&Johnson**

10:30 - 10:45

Frontline Momentum: όταν η λειτουργική ίαση γίνεται στόχος

Ε. Σπανουδάκης

10:45 - 11:00

Target. Advance. Optimize: η νέα εποχή των διειδικών αντισωμάτων στην υποτροπή

Κ. Λιάπης

11:00 - 11:30

Διάλειμμα καφέ

11:30 - 13:00

Στρογγυλό Τραπέζι
Θεραπευτικές εξελίξεις στις οξείες λευχαιμίες
Προεδρείο: **Π. Παναγιωτίδης, Ι. Σακελλάρη**

11:30 - 11:50

Ενδιαφέρουσα περίπτωση ασθενούς με οξεία ΟΜΛ

Γ. Αναγνωστάκης

11:50 - 12:00

Σχολιασμός: **Χ. Ποντίκογλου**

12:00 - 12:20

Περίπτωση ασθενούς με ΟΜΛ και θεραπεία με αναστολείς IDH1

Π. Γιαννίκου

12:20 - 12:30

Σχολιασμός: **Μ. Παγώνη**

12:30 - 13:00

Νεότερα δεδομένα στην παθοβιολογία της ΟΜΛ

Α. Παπαλεξανδρή

13:00 - 13:30

Μεσημβρινή διακοπή - Ελαφρύ γεύμα

13:30 - 15:00

Στρογγυλό Τραπέζι
Ασυνήθη αιματολογικά νοσήματα
Προεδρείο: **Ε. Βλαχάκη, Γ. Καϊάφα**

13:30 - 14:00

JAK2 αναστολείς στα Ph- Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα

Λ. Μπενετάτος

14:00 - 14:30

Νεότερα θεραπευτικά δεδομένα στην aTTP

Β. Παρδάλης

14:30 - 15:00

Συστηματική μαστοκυττάρωση

Μ. Διαμαντίδης

Θεραπευτικές ενδείξεις:¹

- Παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία (PNH)
- Άτυπο αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο (aHUS)
- Γενικευμένη μυασθένεια gravis (gMG)
- Διαταραχή του φάσματος ασθeneιών της οπτικής νευρομυελίτιδας (NMOSD)

Ποιοτική & Ποσοτική σύνθεση:

ULTOMIRIS® 300 mg/3 mL: Κάθε φιαλίδιο των 3 mL περιέχει 300 mg ραβουλιζουμάμνης (100 mg/mL).

Μετά από την αραιώση, η τελική συγκέντρωση του διαλύματος προς έγχυση είναι 50 mg/mL.

ULTOMIRIS® 1.100 mg/11 mL: Κάθε φιαλίδιο των 11 mL περιέχει 1.100 mg ραβουλιζουμάμνης (100 mg/mL).

Μετά από την αραιώση, η τελική συγκέντρωση του διαλύματος προς έγχυση είναι 50 mg/mL.

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.

ULTOMIRIS® C/S.SOL.IN 1100MG/11ML BT X 1 VIAL X 11 ML N.T.: 13.872,71€, Λ.Τ.: 16.682,17€

ULTOMIRIS® C/S.SOL.IN 300MG/3ML BT X 1 VIAL X 3 ML N.T.: 3.783,47€, Λ.Τ.: 4.549,69€

Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες με τη ραβουλιζουμάμνη είναι κεφαλαλγία (30,6%), λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (21,6%), ρινοφαρυγγίτιδα (20,4%), διάρροια (18,7%), πυρεξία (17,7%), ναυτία (15%), αρθραλγία (14,4%), σπασμαλγία (13,6%), κόπωση (13,3%), κοιλιακό άλγος (12,3%), ζάλη (10,7%) και λοίμωξη ουροποιητικού συστήματος (10,7%). Οι πιο σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη (0,7%) συμπεριλαμβανομένων της σπασμικής από μηνιγγιτιδοκοκκό, της μηνιγγιτιδας από μηνιγγιτιδοκοκκό, της εγκεφαλίτιδας μηνιγγιτιδοκοκκικής, της μηνιγγιτιδοκοκκικής λοίμωξης και η διάχυτη γονοκοκκική λοίμωξη (0,2%) συμπεριλαμβανομένης της διάχυτης γονοκοκκικής λοίμωξης και της γονοκοκκικής λοίμωξης.¹

Βιβλιογραφία: 1. ULTOMIRIS® Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Σεπτέμβριος 2025



Πριν την συνταγογράφηση, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του συγκεκριμένου QR code.

Για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες του Προϊόντος, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα:
<https://medicalinformation.astrazeneca.gr/home.html>



ΣΑΒΒΑΤΟ

16 ΜΑΪΟΥ

2026

15:00 - 15:30

Δορυφορική Διάλεξη

Προεδρείο: **Σ. Παπαγεωργίου**

Ο ρόλος της RoreglFN στα Μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα με έμφαση στην PV

Sponsored by  **AOP ORPHAN**
FOCUS ON RARE DISEASES

Φ. Κλωνιζάκης, Σ. Παπαγεωργίου

15:30 - 17:30

Στρογγυλό Τραπέζι

Νεότερες εξελίξεις στα σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας

Προεδρείο: **Β. Παππά, Α. Συμεωνίδης**

15:30 - 15:50

Δεσμευτικά (traps) υποδοχέων ακτιβίνης στα ΜΔΣ

Μ. Μαλκότς

15:50 - 16:00

Σχολιασμός: **Ν.Α. Βύνιου**

16:00 - 16:20

Νεότεροι θεραπευτικοί παράγοντες στα ΧΚ-ΜΔΣ

Α. Μπούχλα

16:20 - 16:30

Σχολιασμός: **Β. Παππά**

16:30 - 16:50

Current and future strategies in CMMML

Ε. Akar

16:50 - 17:00

Commentator: **Κ. Liapis**

17:00 - 17:30

Οικογενή ΜΔΣ

Η. Πέσσαχ

17:30 - 18:00

Δορυφορική Διάλεξη

Προεδρείο: **Γ. Βασιλόπουλος**

Κλινική σημασία της παρατεταμένης απόκρισης στα LR-MDS: τι μας διδάσκουν τα μακροχρόνια αποτελέσματα

Sponsored by  **Bristol Myers Squibb**

Μ. Παπουτσέλης

18:00 - 18:15

Διάλειμμα καφέ

18:15 - 20:45

Recent progress in understanding and treating Myelodysplastic Neoplasms

Chairs: **I. Kotsianidis, B. Turgut**

18:15 - 18:45

Clonal Hematopoiesis and age-related diseases

Κ. Liapis

18:45 - 19:15

The conundrum of clinical trials in MDS

Α. Zeidan

19:15 - 19:45

Evolutionary trajectories of myelodysplastic syndromes for MDS

L. Malcovati

19:45 - 20:15

MDS 2026 - past, present and future

M. Mittelman

20:15 - 20:45

Germline predisposition and familial MDS

P. Baliakas

Time to take
time off

(V + X)*

ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ VENCLYXTO® ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΛΛ ΒΑΘΙΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ¹⁻⁶

*Η θεραπεία VEN+O ολοκληρώνεται: μετά από δώδεκα κύκλους 28 ημερών. Obinutuzumab: κύκλοι 1-6 & VENCLYXTO®: κύκλοι 1-12¹ • Η θεραπεία VEN+I ολοκληρώνεται: μετά από δεκαπέντε κύκλους 28 ημερών. Ibrutinib: κύκλοι 1-3 & VENCLYXTO®: κύκλοι 4-15² • Η θεραπεία VEN+A±O ολοκληρώνεται: μετά από δεκατέσσερις κύκλους 28 ημερών. Acalabrutinib: κύκλοι 1-2 & VENCLYXTO®: κύκλοι 3-14, ± Obinutuzumab: κύκλοι 2-7³ • Η θεραπεία VEN+R περιλαμβάνει πρόγραμμα τιτλοποίησης 5 εβδομάδων της δόσης VENCLYXTO® και έπειτα ριτιμιζάμιν κύκλοι 1-6 και VENCLYXTO® κύκλοι 1-24⁴

Τα δεδομένα αποτελεσματικότητας, ασφάλειας καθώς και τα δοσολογικά σχήματα του συνδυασμού VEN+A±O⁵ & VEN+I⁶ δεν βρίσκονται στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος VENCLYXTO® (Ιούλιος 2025). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος acalabrutinib (Αύγουστος 2025) Sweden: AstraZeneca AB και ibrutinib (Φεβρουάριος 2026), Belgium: Jansen-Cilag International NV, αντίστοιχα.

Σύνοψη προφίλ ασφαλείας: Οι πιο συχνά εμφανιζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες (≥20%) οποιοδήποτε βαθμού σε ασθενείς που έλαβαν venetoclax στις μελέτες συνδυασμού με ομπιντουζουμάμνη ή ριτιουζιμάμνη ήταν ουδετεροπενία, διάρροια, και λήιμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Στις μελέτες μονοθεραπείας, οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ουδετεροπενία/αριθμός ουδετεροφίλων μειωμένος, διάρροια, ναυτία, αναιμία, κόπωση και λήιμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Βιβλιογραφία: 1. Al-Sawaf O, et al., Venetoclax-obinutuzumab for previously untreated chronic lymphocytic leukemia: 6-year results of the randomized phase 3 CLL14 study. Blood. 2024 Oct 31. 2. Al-Sawaf O, et al.; CLL17 Trial Investigators. Fixed-Duration versus Continuous Treatment for Chronic Lymphocytic Leukemia. N Engl J Med. 2025 Dec 6. 3. Brown JR, et al.; AMPLIFY investigators; AMPLIFY Investigators. Fixed-Duration Acalabrutinib Combinations in Untreated Chronic Lymphocytic Leukemia. N Engl J Med. 2025 Feb 20. 4. Molica S The evolving role of time-limited targeted therapy in chronic lymphocytic leukemia. Expert Rev Anticancer Ther. 2020 Dec. 5. VENCLYXTO® Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Ιούλιος 2025. 6. Niemann CU, et al., Fixed-duration ibrutinib-venetoclax versus chlorambucil-obinutuzumab in previously untreated chronic lymphocytic leukaemia (GLOW): 4-year follow-up from a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2023. 7. Acalabrutinib, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (Σεπτέμβριος 2025), https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/calquence-epar-product-information_en.pdf. Sweden: AstraZeneca AB. 8. Ibrutinib, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (Φεβρουάριος 2026), https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/imbruvica-epar-product-information_en.pdf. Belgium: Jansen-Cilag International NV

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

VENCLYXTO® Τρόπος Διάθεσης:
Περιορισμένη ιατρική συνταγή.
Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Λιανικές Τιμές:

Venclyxto F.C.TAB 100MG/TAB B1x12 (BLIST 4x28)	4.768,75 €
Venclyxto F.C.TAB 100MG/TAB B1x14 (BLIST 7x2)	665,44 €
Venclyxto F.C.TAB 100MG/TAB B1x7 (BLIST 7x1)	342,61 €
Venclyxto F.C.TAB 10MG/TAB B1x14 (BLIST 7x2)	72,99 €
Venclyxto F.C.TAB 50MG/TAB B1x7 (BLIST 7x1)	176,90 €



Για την ΠΧΠ
του VENCLYXTO®
σαςρώστε εδώ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την AbbVie με σκοπό τη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων με επαγγελματίες υγείας υπόκεινται στη Δήλωση Απορρήτου της AbbVie της χώρας διαμονής του επαγγελματία υγείας. Οι Παγκόσμιες Δήλωση Απορρήτου της AbbVie είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://www.abbvie.gr/privacy.html>, καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της AbbVie για Επαγγελματίες Υγείας, τον σχετικό Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδομένων της AbbVie και τον τρόπο με τον οποίο οι Επαγγελματίες Υγείας μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σχετικά με την ιδιωτικότητα των δεδομένων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρία:

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Ελλάδα, Τηλ: +302144165555

abbvie



ΚΥΡΙΑΚΗ

17 ΜΑΪΟΥ

2026

09:00 - 10:30	Στρογγυλό Τραπέζι Σύγχρονες προσεγγίσεις στη νοσηλευτική φροντίδα Προεδρείο: Μ. Αμανατίδου, Ν. Λεμονάκης	
09:00 - 09:30	Ο ρόλος του νοσηλευτή στην ψυχική επιβάρυνση της χρόνιας νόσου: ενδυνάμωση, εκπαίδευση και ανθεκτικότητα	Γ. Μανομενίδης
09:30 - 10:00	Τεχνητή Νοημοσύνη στη νοσηλευτική φροντίδα: σύγχρονες εξελίξεις και μελλοντικοί κίνδυνοι	Δ. Κοσμίδης
10:00 - 10:30	Από την καταγραφή συμβάντων στον στρατηγικό σχεδιασμό: τεκμηρίωση, ανάλυση και δράσεις για την ασφάλεια ασθενούς	Β. Γεωργουσοπούλου
10:30 - 11:00	Διάλειμμα καφέ	
11:00 - 12:30	Στρογγυλό Τραπέζι Αιματολογική συμβουλευτική σε άλλες ειδικότητες (I) Προεδρείο: Θ. Βασιλακόπουλος, Κ. Λιάπης	
11:00 - 11:20	Πλευριτική συλλογή και παθήσεις υπεζωκότα	Φ. Δρακοπαναγιωτάκης
11:20 - 11:30	Σχολιασμός: Π. Στειρόπουλος	
11:30 - 11:50	Αιματολογικές διαταραχές στη λοίμωξη covid-19	Β. Πετράκης
11:50 - 12:00	Σχολιασμός: Π. Παναγόπουλος	
12:00 - 12:20	Εξωλεμφαδενικές εκδηλώσεις μη Hodgkin λεμφωμάτων. Περίπτωση κρυοσφαιριναϊμίας	Μ. Ντόγα
12:20 - 12:30	Σχολιασμός: Κ. Λιάπης, Δ. Παπάζογλου	
12:30 - 12:45	Διάλειμμα καφέ	
12:45 - 14:15	Στρογγυλό Τραπέζι Ο ρόλος του Αιματολόγου σε άλλες ειδικότητες (II) Προεδρείο: Ι. Μητρούλης, Ζ. Μπεζιργιαννίδου	
12:45 - 13:05	Αιματολογικές διαταραχές στην ορθοπαιδική	Α. Γκουδίνια
13:05 - 13:15	Σχολιασμός: Κ. Τιλκερίδης	
13:15 - 13:35	Κύρια αιματολογικά θέματα στην Ογκολογία	Ε.Ι. Μπογατσά
13:35 - 13:45	Σχολιασμός: Δ. Ματθαίος	
13:45 - 14:15	Ο ρόλος του PET/CT στη διάγνωση αιματολογικών νόσων	Π. Βαλσαμάκη
14:15 - 14:45	Συμπεράσματα - Λήξη Συνεδρίου	

**BESREMi®
acts at the root
of PV¹**

**Significantly
improved
event-free
survival²**

**Deep and
sustained
reduction of
Jak2V617F
allele burden³**

1. Austin RJ et al., (2020), Leukemia 34: 1075–1089
2. Kiladjian et al. EHA 2024, Abstract #5219, AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH.
3. Gisslinger et al., (2023), Leukemia 37(10):2129-2132.



Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες
συμβουλευθείτε την Ελληνική Περίληψη
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας
τον κωδικό QR ή μπορείτε να τη ζητήσετε
σε έντυπη μορφή από τον εκπρόσωπο
της εταιρείας

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Akar Emre	MD, Department of Hematology, Tekirdag Namik Kemal University, Turkey
Malcovati Luca	Professor of Hematology, Department of Molecular Medicine, University of Pavia & Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo
Mittelman Moshe	Professor of Medicine and Hematology, Chairman, Israel Cancer Association, Chairman, Scientific Board, MDS Foundation, Past Chairman, Department of Medicine, Tel Aviv Sourasky Medical Center, Past President, Israel Society of Hematology, Medical Director, Talent/CannaLean Group
Turgut Burhan	Professor of Hematology, Altinbas University Medical Faculty, Internal Medicine Department, Hematology Division
Zeidan Amer	Professor of Internal Medicine (Hematology), Yale School of Medicine
Αγγελοπούλου Μαρία	Καθηγήτρια Αιματολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Αθανασάκης Κωνσταντίνος	Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Αμανατίδου Μαρία	Νοσηλεύτρια, MSc, PhDc, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια ΣΔΠ. Συντονίστρια Χειρουργικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας 4 ^η ΥΠΕ. Γραφείο Εκπαίδευσης Ν.Υ., Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Αναγνωστάκης Γεώργιος	Ειδικευόμενος Αιματολογίας, Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου
Ανδρέου Μαρίνα	Φοιτήτρια, 5 ^ο έτος, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Αντωνίου Μαρία-Ιωάννα	Φοιτήτρια, 5 ^ο έτος, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ασημακόπουλος Ιωάννης	Αιματολόγος, Επιμελητής Β', Αιματολογική Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α «Λαϊκό»
Βαδικόλιας Κωνσταντίνος	Καθηγητής Νευρολογίας, Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Βαλσαμάκη Πιπίτσα	Επίκουρη Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ., Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Βασιλακόπουλος Θεόδωρος	Καθηγητής Αιματολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Βασιλόπουλος Γεώργιος	Καθηγητής Παθολογίας-Αιματολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Π.Γ.Ν. Λάρισας, Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

Ivor[®]
Bemiparin sodium

IvormaX[®]
Bemiparin sodium



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivor 2.500 IU antiXa/0,2 ml ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 2.500 IU (anti Factor Xa*) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα (ισοδύναμη με 12.500 IU (anti Factor Xa*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος). Η δραστηριότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστηριότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ:** IVOR 2.500 IU anti-Xa/0,2 ml BT x 2 PF.SYR Λ.Τ.: 5,83 €

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivormax 25.000 IU antiXa/0,2 ml ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 3.500 IU (anti Factor Xa*) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα (ισοδύναμη με 17.500 IU (anti Factor Xa*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος). Η δραστηριότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστηριότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ:** IVOR 3.500 IU anti-Xa/0,2 ml BT x 2 PF.SYR Λ.Τ.: 10,74 € BT x 30 PF.SYR Λ.Τ.: 120,83 €

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivormax 25.000 IU anti-Xa/ml ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 25.000 IU (anti-Factor Xa*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος. Ισοδύναμη με: 5.000 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα, 7.500 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,3 ml προγεμισμένη σύριγγα, 10.000 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,4 ml προγεμισμένη σύριγγα. * Η δραστηριότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστηριότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ:** IVORMAX 25.000 IU anti-Xa/ml, BTx2PF.SYRx0,3ML Λ.Τ.: 23,40€, IVORMAX 25.000 IU anti-Xa/ml, BTx2PF.SYRx0,4ML Λ.Τ.: 23,33€

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένες σύριγγες. (Χρωμένο ή ελαφρώς κιτρινωπό, διαυγές διάλυμα, ελεύθερο ορατών σωματιδίων). **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Προϊόν της LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A., ΙΣΠΑΝΙΑ. Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας: BIANEΞ A.E., Οδός Βαρυμύμνης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά, Τηλ. 2108009111. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** 24481/26-02-2020, 24482/26-02-2020, 24483/26-02-2020.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 06-04-2023 (Ivor), 12-07-2023 (IvormaX)

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον ΚΑΚ κατόπιν αιτήσεως.



BIANEΞ A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEΞ A.E. - Έδρα: Οδός Βαρυμύμνης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία • Τηλ.: 210 8009111 • Fax: 210 8071573
E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης • Τηλ.: 2310 861668

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



VE-24236-IVO-9/2024



Βλαχάκη Ευθυμία	Καθηγήτρια Αιματολογίας-Αιμοσφαιρινοπαθειών Α.Π.Θ., Β' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»
Βύνιου Νόρα Αθηνά	Ομότιμη Καθηγήτρια Αιματολογίας, Ιατρική ΕΚΠΑ, Ιατρικό Κέντρο Π. Φαλήρου
Γαβριηλάκη Ελένη	Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Α.Π.Θ.
Γεωργουσοπούλου Βασιλική	Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής Δ.Π.Θ., Προϊσταμένη Τομέα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Γιακουμή Ξανθή	Παθολόγος, Επιμελήτρια Αιματολογικής Κλινικής, Ιατρικό Ψυχικού
Γιαννακούλας Νικόλαος	Αναπληρωτής Καθηγητής Αιματολογίας, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Γιαννίκου Παρασκευή	Ειδικευόμενη Αιματολογίας, Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική-Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Γιαννούλη Σταυρούλα	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας, Β' Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Γκουδίνη Αντιγόνη	MD, MSc, PhD(c), Ορθοπαιδική Χειρουργική και Τραυματολογία, Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Δαράβαλη Λουκία	Φοιτήτρια, 5 ^ο έτος, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Διαμαντίδης Μιχαήλ	Αιματολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ., Επιστημονικά Υπεύθυνος, Αιματολογικό Τμήμα, Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου, Γ.Ν. Λάρισας
Δούκα Βασιλική	Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α', Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Δρακοπαναγιωτάκης Φώτιος	Επίκουρος Καθηγητής Πνευμονολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Ιγγλέζου Λυδία	Ειδικευόμενη Αιματολογίας, Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Ισκάς Μιχαήλ	Αιματολόγος, Επιμελητής Α', Αιματολογική Κλινική Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Καϊάφα Γεωργία	Αιματολόγος, Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Καπετανάκης Γεώργιος	Πρόεδρος, Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου - ΕΛΛΟΚ

Η SANDOZ στην Αιματολογία

RIXATHON®
rituximab

Lenalidomide/Sandoz

Azacitidine/Sandoz

Bortezomib/Sandoz

ZIEXTENZO®
pegfilgrastim

ZARZIO®
filgrastim

Rixathon

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση

από ιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.

RIXATHON C/S.SOL. IN 100MG/10ML VIAL (10MG/ML) 2 VIALS x 10ML: 178,06€

RIXATHON C/S.SOL. IN 500MG/50ML VIAL (10MG/ML) 1 VIAL x 50ML: 447,51€

Lenalidomide/Sandoz

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

LENALIDOMIDE/SANDOZ CAPS 5.0 MG/CAP BTx21 CAPS: 1.514,34€

LENALIDOMIDE/SANDOZ CAPS 10.0 MG/CAP BTx21 CAPS: 1.480,18€

LENALIDOMIDE/SANDOZ CAPS 15.0 MG/CAP BTx21 CAPS: 1.560,41€

LENALIDOMIDE/SANDOZ CAPS 20.0 MG/CAP BTx21 CAPS: 1.975,24€

LENALIDOMIDE/SANDOZ CAPS 25.0 MG/CAP BTx21 CAPS: 1.828,17€

Azacitidine/Sandoz

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την επίβλεψη ιατρού.

AZACITIDINE/SANDOZ PD.INJ.SUS 25MG/ML BTx1 GLASS VIALx100 MG: 117,11€.

Bortezomib/Sandoz

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση.

BORTEZOMIB/SANDOZ PD.INJ.SOL 3.5MG/VIAL BTx1 vial: 309,36€.

Ziextenzo

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

ZIEXTENZO INJ.SOL 6MG/0,6ML(10MG/ML) BTx1 PF. SYR: 218,49€

Zarzio

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

ZARZIO 30MIU/0.5ML 5LISY BI GR: 53,91€

ZARZIO 48MIU/0.5ML 5LISY BI GR: 73,05€

Νοσοκομειακές τιμές, σύμφωνα με το ανανεωμένο δελτίο τιμών Δεκεμβρίου 2025.

Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές.

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας τον παρακάτω σύνδεσμο:



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

SANDOZ

Rixathon • Ziextenzo • Zarzio
KAK: Sandoz GmbH,
Biochemiestrasse 10, A-6250
Kundl, ΑΥΣΤΡΙΑ

Lenalidomide/Sandoz • Bortezomib/Sandoz • Azacitidine/Sandoz
KAK: Sandoz Pharmaceuticals
d.d., Verovskova 57, S.I-1000,
Ljubljana, ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Τοπικός Αντιπρόσωπος:
SANDOZ HELLAS
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Φραγκοκκλησιás 7B, 151 25
Μαρούσι Τηλ: +30 216 600 5000



Καπούτση Έλενα	Φοιτήτρια, 6 ^ο έτος, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Καραγιάννης Ιωάννης	Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Η.Δ.Υ.Κ.Α. Μ.Α.Ε.
Καστρίτης Ευστάθιος	Παθολόγος Ογκολόγος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Θεραπευτική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Κλωνιζάκης Φίλιππος	Επίκουρος Καθηγητής Αιματολογίας, Β' Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»
Κοσμίδης Δημήτριος	Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κοτσιανίδης Ιωάννης	Καθηγητής Αιματολογίας Δ.Π.Θ., Διευθυντής, Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Κουβάτα Ευαγγελία	Ειδικευόμενη Αιματολογίας, Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας
Κυμπαρίδου Χρύσα	Μοριακή Βιολόγος, Εξωτερική Συνεργάτης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κωνσταντίνου Ηλιάνα	Αιματολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Αιματολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Κωτσιόπουλος Ιωάννης	Partner, Agora Partners, π. Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας
Λεμονάκης Νικόλαος	MSc, MBA, Νοσηλευτής ΤΕ, Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Ποιότητας, Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Λιάπης Κωνσταντίνος	Αναπληρωτής Καθηγητής Αιματολογίας Δ.Π.Θ., Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Μαλκότης Μπουσέ	Ειδικευόμενη Αιματολογίας, Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Μανομενίδης Γεώργιος	Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ματθαίος Δημήτριος	Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Ογκολογίας, Δ.Π.Θ., Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Μαυρουδή Θεοδώρα	Φοιτήτρια, 5 ^ο έτος, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μητρούλης Ιωάννης	Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μπαλιάκας Παναγιώτης	Associate Professor, Dept. of Immunology, Genetics and Pathology, Uppsala University, Director, Clinical Genomics Uppsala, SciLife, Uppsala University, Senior Consultant, Dept. of Clinical Genetics, Uppsala University Hospital

MAKE PRECISION MEET EFFICACY, FOR NEWLY DIAGNOSED AML PATIENTS

 **TIBSOVO®**
ivosidenib tablets 250mg

AML

For patients with newly diagnosed AML with **mIDH1 R132**, not eligible for standard induction chemotherapy, TIBSOVO® + azacitidine delivers:^{1,2}

29
Months Median
Overall Survival¹

47
% Complete
Remission¹

88
% Still in Complete
Remission at 12 Months¹



TIBSOVO® in combination with azacitidine (AZA) is indicated for the treatment of adult patients with newly diagnosed acute myeloid leukemia (AML) with an isocitrate dehydrogenase-1 (IDH1) R132 mutation who are not eligible to receive standard induction chemotherapy (IC).

¹(95% CI, 13.2-not reached) vs 7.9 months (95% CI, 4.1-11.3) with placebo (PBO) + azacitidine (AZA) (HR, 0.42; 95% CI, 0.27-0.65; P<0.0001).^{1,2} ²(95% CI, 35-59) vs 15% (95% CI, 8-25) with PBO + AZA (P<0.001).³ ³(95% CI, 67.5-96.2) vs 36% (95% CI, 5.3-70.6) with PBO + AZA.^{3,4}

AML: acute myeloid leukemia; CI: confidence interval; HR: hazard ratio; mIDH1: mutated isocitrate dehydrogenase-1.

▼ Τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση.

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.



Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάρετε τον κωδικό QR.

Για την έντυπη μορφή της ΠΧΠ, παρακαλείσθε να απευθύνεστε στον τοπικό Αντιπρόσωπο του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας

TIBSOVO® F.C. TAB 250mg/tab ΦΙΑΛΗ (HDPE) x 60 ΔΙΣΚΙΑ:
Α.Τ. 15.621,37€ - Ν.Τ. 12.990,56€
(Σε περίπτωση τροποποίησης του Δ.Τ. ισχύει η νεότερη τιμή)

1. TIBSOVO® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος. 2. Montesinos P et al. Blood Adv. 2025 Jul 24
3. Montesinos P et al. N Engl J Med. 2022;386:1519-1531

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα
πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για **ΟΛΑ** τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

SERVIER 
moved by you

SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ.
Φραγκοκλησιός 7, 15125 Μαρούσι.
Τηλ 210 9391000, www.servier.gr



Μπεζιργιαννίδου Ζωή	Αιματολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. Αιματολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Μπενετάτος Λεωνίδας	Επίκουρος Καθηγητής Αιματολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μπογατσά Ευαγγελία-Ιωάννα	Παθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Μπούχλα Ανθή	Αιματολόγος, Επιμελήτρια Β' ΕΣΥ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Ντόγα Μελίνα	Ειδικευόμενη Παθολογίας, Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Παγώνη Μαρία	Αιματολόγος, Διευθύντρια, Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Παναγιωτίδης Παναγιώτης	Ομότιμος Καθηγητής Αιματολογίας ΕΚΠΑ
Παναγιωτόπουλος Εμμανουήλ	Ειδικευόμενος Αιματολογίας, Πανεπιστημιακή Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Παναγόπουλος Περικλής	Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Αν. Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Δ.Π.Θ.
Παναγούτσος Στυλιανός	Καθηγητής Νεφρολογίας Δ.Π.Θ., Διευθυντής, Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Πρόεδρος Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας
Παπαγεωργίου Σωτήριος	Επίκουρος Καθηγητής Αιματολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Παπαδοπούλου Ζωή	Φοιτήτρια, 6 ^ο έτος, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Παπάζογλου Δημήτριος	Καθηγητής Παθολογίας, Β' Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Δ.Π.Θ., Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Παπαλεξανδρή Αποστολία	Αιματολόγος, Επιμελήτρια, Αιματολογική Κλινική - Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Παπουτσέλης Μενέλαος	Αιματολόγος, Επιμελητής Α', Πανεπιστημιακή Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Παππά Βασιλική	Καθηγήτρια Αιματολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αιματολογική Μονάδα, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Παππούς Σωτήριος	Φοιτητής, 5 ^ο έτος, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Παρδάλης Βασίλειος	MD, MSc, PhD, Αιματολόγος, Επιμελητής Α' Αιματολογικής Κλινικής, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Πέσσαχ Ηλίας	Αναπληρωτής Καθηγητής Αιματολογίας, ΔΙΠΑΕ, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Nilotinib Accord

150 mg

200 mg

ΣΚΛΗΡΑ ΚΑΨΑΚΙΑ



Νοσοκομειακές Τιμές:

NILOTINIB ACCORD CAPS 150MG/CAP BT X 112 (4 X 28 X 1) CAPS
(ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ) (ΠΟΛΥΑΓΓΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) ΣΕ BLISTER PVC/PVDC/ALU: 1.115,10 €

NILOTINIB ACCORD CAPS 200MG/CAP BT X 112 (4 X 28 X 1) CAPS
(ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ) (ΠΟΛΥΑΓΓΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) ΣΕ BLISTER PVC/PVDC/ALU: 1.486,78 €

Κάτοχος Άδειας
Κυκλοφορίας:
Accord Healthcare S.L.U.

accord

Τοπικός Αντιπρόσωπος

WinMedica

Για περισσότερες πληροφορίες:

WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Αγισσιλάου 6-8, Μαρούσι 151 23

Τηλ.: 210 7488821, Fax: 210 7488827

info@winmedica.gr, www.winmedica.gr

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΦΘΗΝΣΗΣ: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Nilotinib Accord



Πριν την
συνταγογράφηση
συμβουλευτείτε
την Περίληψη
Χαρακτηριστικών
Προϊόντος

NilotAcc.01.11/2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναγνώστετε
ΟΛΕΣ τις αναπληρωμένες ενότητες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Πετράκης Βασίλειος	Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ., Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Ποντίκογλου Χαράλαμπος	Αναπληρωτής Καθηγητής Αιματολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου
Πουλή Μαρία	Φοιτήτρια, 5 ^ο έτος, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ρουμπάκης Χριστόφορος	Αιματολόγος, Επιμελητής Β' Ε.Σ.Υ., Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Σακελλάρη Ιωάννα	Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Αιματολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Σακκά Βασιλική	Ειδικευόμενη Αιματολογίας, Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Σαχανάς Σωτήριος	Αιματολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής, Αιματολογική Κλινική, Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού
Σπανουδάκης Εμμανουήλ	Αναπληρωτής Καθηγητής Αιματολογίας Δ.Π.Θ., Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Σταματίου Ηλιάννα	Ειδικός Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Πανεπιστημιακή Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Στειρόπουλος Πασχάλης	Καθηγητής Πνευμονολογίας, Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ., Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Συμεωνίδης Ανάργυρος	Ομότιμος Καθηγητής Αιματολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Αιματολογικό Τμήμα, Ολύμπιο Θεραπευτήριο - Γενική Κλινική Πατρών
Τιλκερίδης Κωνσταντίνος	Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τσαταλάς Κωνσταντίνος	Ομότιμος Καθηγητής Αιματολογίας Α.Π.Θ.
Χαριτάκη Ευαγγελία	Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Α', Νεφρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Χατζηκωνσταντίνου Θωμάς	Αιματολόγος, Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝ.Ε.Β.), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Χατζημιχαήλ Ελευθερία	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιματολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Χατζηχαρίση Ευδοξία	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιματολογίας Α.Π.Θ., Α' Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Χατζηχριστοφής Σάββας	Καθηγητής Τεχνητής Νοσησούνης, Τμήμα Πληροφορικής, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, Πανεπιστήμιο Νεάπολις, Πάφος

ΕΠΙΛΕΞΤΕ CABLIVI ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 1

σε συνδυασμό με PEX
και ανοσοκαταστολή

ΟΙ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ISTH

ΣΥΣΤΗΝΟΥΝ ΤΟ
CABLIVI^{††}

Πορφύρα

Θρομβοπενία
Συμμετοχή οργάνων
ΜΑΗΑ

Διάγνωση
aTTP

ΑΡΧΗ

Cablivi^{††}
caplacizumab

Το Cablivi ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων και εφήβων ηλικίας 12 ετών και άνω με σωματικό βάρος τουλάχιστον 40 kg που εμφανίζουν επεισόδιο επίκτητης θρομβωτικής θρομβοπενικής πορφύρας (aTTP) σε συνδυασμό με πλάσμαφαίρεση και ανοσοκαταστολή.²

* Υποθέτοντας υψηλή πιθανότητα για aTTP (με βάση την κλινική αξιολόγηση ή ένα επίσημο εργαλείο αξιολόγησης κλινικού κινδύνου) και άμεση πρόσβαση για εξέταση της ADAMTS13[†]

†Σε συνδυασμό με PEX και ανοσοκαταστολή

Βιβλιογραφικές αναφορές:

1. Zheng XL, Vesely SK, Cataland SR, et al. ISTH guidelines for the diagnosis of thrombotic thrombocytopenic purpura. J Thromb Haemost. 2020;18(10):2486-2495. doi:10.1111/jth.15006 2. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Cablivi, ημερομηνία αναθεώρησης Νοέμβριος 2024

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση ή/και η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού. Ν.Τ. 3.101,64 €

Υπεύθυνος Κυκλοφορίας για την Ελλάδα: Sanofi-Aventis Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ

Λ. Συγγρού 348 - Κτίριο Α, 17674, Καλλιθέα, Τηλ.: +30 210 90 01 600



Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάροντας το QR code ή μπορείτε να τη ζητήσετε από την εταιρία στο τηλ.: 210 9001600 ή στο medicalinformation.greece@sanofi.com

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

sanofi



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οργάνωση:

Εταιρεία Βιοεπιστημών

Σε συνεργασία με την:

Αιματολογική Κλινική του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Υπό την Αιγίδα:

- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
- Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
- Ιατρικός Σύλλογος Έβρου

Ημερομηνία διεξαγωγής:

15 -17 Μαΐου 2026

Τόπος διεξαγωγής:

Ξενοδοχείο Ramada Plaza Thraki
4ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Θεσσαλονίκης
68 100 Αλεξανδρούπολη
Τηλ. 25510 89100

Εγγραφές:

Η εγγραφή και η παρακολούθηση επιτρέπεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας, καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να πιστοποιήσουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα (όπως η ταυτότητα ιατρικού ή φαρμακευτικού συλλόγου, νοσηλευτική ή φοιτητική ταυτότητα).

Οδηγίες Φυσικής Παρακολούθησης:

Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό badge (barcode), το οποίο θα πρέπει να σκανάρουν κατά την είσοδο και έξοδο τους στην αίθουσα.

Οδηγίες Διαδικτυακής Παρακολούθησης:

Εάν είστε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο www.livemed.gr (πατήστε στο πεδίο **Register / Εγγραφή**). Η δημιουργία λογαριασμού είναι **δωρεάν** και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο **Livemed** χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε από το μενού την κατηγορία **Live**, το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο **Go Live** ή **Go Virtual**.



Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγτε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την «**Αίθουσα Συνεδριάσεων**».



Σημείωση: Εφόσον επιθυμείτε να παραλάβετε πιστοποιητικό, είναι απαραίτητο μετά τη σύνδεσή σας στο Livemed να μεταβείτε στην εικονική «**Γραμματεία Συνεδρίου**» και να ολοκληρώσετε την «**Εγγραφή**» σας στην επιστημονική εκδήλωση πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο.



innohep[®]

tinzaparin sodium



Χορηγείται με ιατρική συνταγή.
Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες επικοινωνήστε
με την LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

Για το ισχύον δελτίο τιμών
των φαρμάκων της LEO Pharma
σκανάρετε εδώ



LEO Pharmaceutical Hellas S.A.
Παπανικολή 22Α, 15232, Χαλάνδρι
Τηλ: 212 222 5000
contact@leo-pharma.com
αρ. ΓΕΜΗ 117058301000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Advancing the care of
patients with thrombosis

© LEO Pharma copyright - GR_inn_adv_Nov_2024-MAT-71106.
All LEO Pharma trademarks mentioned belong to the LEO Pharma Group.



Παραλαβή πιστοποιητικού:

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου σε όσους συμμετέχοντες έχουν εγγραφεί και παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης.

Σημείωση: Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα για λήψη έως 12 μήνες από τη λήξη της εκδήλωσης.

Η εκδήλωση καλύπτεται φωτογραφικά, βιντεοσκοπείται και προβάλλεται σε ζωντανή μετάδοση.

Γραμματεία:



Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210 98 80 032 • Website: www.events.gr
E-mail: ets@events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η Ε.Τ.Σ. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr.

Δυο σταγόνες αίμα δεν μοιάζουν ποτέ σαν δυο σταγόνες

Κάθε σταγόνα αίμα είναι διαφορετική. Κάθε ασθενής είναι διαφορετικός.

Για το λόγο αυτό χρειάζεται μια **εξατομικευμένη προσέγγιση**.
Στη **Roche** αναπτύσσουμε **καινοτόμες θεραπευτικές επιλογές** που
προσαρμόζονται στις διαφορετικές ανάγκες των ασθενών κι έχουν
αλλάξει σημαντικά τη θεραπεία των αιματολογικών κακοηθειών.
Για **περισσότερο από 25 χρόνια** επενδύουμε στην έρευνα με
επίκεντρο όχι απλώς τον άνθρωπο, αλλά κάθε άνθρωπο.¹⁻⁵

MabThera® SC
Rituximab Subcutaneous

GAZYVARO®
obinutuzumab

POLIVY
polatuzumab vedotin

Lunsumio®
mosunetuzumab

COLUMVI®
glofitamab

1. ΠΧΠ προϊόντος MabThera® SC 2. ΠΧΠ προϊόντος Gazyvaro® 3. ΠΧΠ προϊόντος Polivy® 4. ΠΧΠ προϊόντος Lunsumio® 5. ΠΧΠ προϊόντος Columvi®

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους - κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Πρέπει να γίνεται αναφορά των ανεπιθύμητων ενεργειών. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες θα πρέπει να αναφέρονται ως εξής: Ελλάδα: στη Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (Hellas) A.E., είτε αποστέλλοντας e-mail (hellas.drugsafety@roche.com), είτε τηλεφωνικά (+30 210 6166100). Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τον Κάτοχο άδειας Κυκλοφορίας κατόπιν αίτησης.

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

Roche (Hellas) A.E.

Αλαμάνας 4 & Δελφών, 151 25 Μαρούσι, Αττική
τηλ: 210 6166100, email: hellas.medinfo@roche.com
800 111 93 00 Ελλάδα (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)

POLIVY 140mg/30mg: Κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.

140mg: N.T.: 8.243,83 € - Α.Τ.: 9.913,35 €, **30mg:** N.T.: 1.762,45 € - Α.Τ.: 2.145,36 €

Lunsumio 1mg/30mg: Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.

1mg: N.T.: 207,18 € - Α.Τ.: 273,56 €, **30mg:** N.T.: 6.218,38 € - Α.Τ.: 7.477,72 €

COLUMVI 2,5mg/10mg: Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.

2,5mg: N.T.: 751,75 € - Α.Τ.: 939,45 €, **10mg:** N.T.: 3.006,59 € - Α.Τ.: 3.615,47 €

GAZYVARO: Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.

1.000mg: N.T.: 2.221,37 € - Α.Τ.: 2.690,87 €

MabThera SC 1400mg: Διάλυμα για υποδόρια ένεση.

1400mg: N.T.: 1.235,15 € - Α.Τ.: 1.518,05 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

χορηγοί

abbio

abbvie

AOP
HEALTH

astellas

AstraZeneca

BIANEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΕΝΝΗΚΟΡΔΙΟΥ

Bristol Myers Squibb

Daiichi-Sankyo

ELPEN

FARAN
HEMATOLOGY

gene pharm

GENESIS
pharma

GSK

innovis
Future health today

INTEGRIS
PHARMA

Johnson & Johnson

LEO

Lilly
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

LYSIS
BIOTECH

MEDIA PHARM LTD.
QUALITY PHARMACEUTICALS

medica ir

RECORDATI
RARE DISEASES

Roche

SANDOZ

sanofi

SERVIER
moved by you

sobi
rare strength

Swixx BioPharma
Modern Medicines for All

Takeda

WinMedica

8^ο ΕΤΟΣ
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο
ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΤΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ:
ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ και ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ

15 -17 ΜΑΪΟΥ 2026

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ramada PLaza THRACI